




MADRAXIMOV R.M.
YAXSHIBAYEV D.S.



HISOB (CALCULUS) INTEGRALLAR



**R.M. MADRAXIMOV
D.S. YAXSHIBAYEV**

HISOB (CALCULUS) INTEGRALLAR

O'QUV QO'LLANMA

TOSHKENT-2024

UO'K: 517.91/.93(075.8)

KBK: 22.161.6ya73

Y 94

R.M.Madraximov, D.S.Yaxshibayev. Hisob (calculus) integrallar [Matn] : o'quv qo'llanma / – Toshkent: "Elnur print", 2024. – 172 b.

O'quv qo'llanma Hisob(Calculus) fanidan integrallar mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, u **60310500** – Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha); **60320400** – Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo'yicha); **60412800** – Elektron tijorat; **60610300** – Axborot xavfsizligi (sohalar bo'yicha); **60610500** – Kompyuter injiniringi ("Kompyuter injiniringi", "AT-servisi", "Multimedia texnologiyalari"); **60610600** – Dasturiy injiniring; **60610700** – Sun'iy intellekt; **60610700** – Sun'iy intellekt (Qo'shma dastur); **60610800** – Axborot texnologiyalarining dasturiy ta'minoti (Qo'shma dastur); **60610900** – Dasturlanuvchi mobil tizimlar (Qo'shma dastur); **60611000** – Telekommunikatsiya texnologiyalari ("Telekommunikatsiyalar", "Teleradioeshittirish", Mobil tizimlari); **60611100** – Televizion texnologiyalar ("Audiovizual texnologiyalar", "Telestudiya tizimlari va ilovalari"); **60611200** – Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment; **60611300** – Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta'limi; **60611400** – Pochta aloqasi texnologiyasi; **60612000** – Infokommunikatsiya injiniringi; **60612100** – Kiberxavfsizlik injiniringi; **60711500** – Mexatronika va robototexnika, yo'naliishlari talabalariga mo'ljalangan bo'lib undan amaliy mashg'ulot va mustaqil ish darslarida foydalanish mumkin.

O'quv qo'llanma Hisob(Calculus) fanining integrallar moduliga to'g'ri keladi. Unda aniqmas integral, aniq integral va ularning xossalari, xosmas integrallar, ikki va ych karrali integrallar va ularning xossalari etali darajada o'rjanilgan. Bundan tashqari har bir mavzuga doir misollar yechib kosatilgan. Amaliy mashg'ulotlarda yechiladigan misollar hamda ushbu darsda mustaqil yechish uchun misollari bilan berilgan.

R.M. Madraximov – Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti "Umumiy mamtematika" kafedrasi professor v.b.

D.S.Yaxshibayev – Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlari bo'yicha birinchi prorektor, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Taqrizchilar:

O'.N. Qalandarov - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti "Oliy matematika" kafedrasi mudiri, fizika-matematika fanlari nomzodi,dotsent.

D.Davletov - Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti "Umumiy matematika" kafedrasi dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi.

ISBN 978-9910-9613-6-4

© "Elnur print", 2024.

KIRISH

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Matematika hamma fanlarga asos. Bu fanni yaxshi bilgan bola aqli, keng tafakkurli bo'lib o'sadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab ketadi". Haqiqatdan ham matematika fani inson aqlini charxlaydi, diqqatini rivojlantiradi, ko'zlangan maqsadga erishish uchun qat'iyat va irodani tarbiyalaydi, algoritmik tarzda tartib-intizomlilikka o'rgatadi va eng muhimi mulohaza yuritishga chorlaydi hamda tafakkurni kengaytiradi. Hozirgi kunda respublikamizda ta'limga sohasida olib borilayotgan islohotlar Milliy o'quv dasturi talablari asosida o'qitishni tashkil etish, talabalar uchun zamon talabiga javob beradigan darslik, o'quv qo'llanmalar yaratish dolzarb masalaligicha qolmoqda. Ushbu o'quv qo'llanma yuqoridagi talablarni hisobga olib yaratildi. O'quv qo'llanma "Hisob(Calculus)" fanining integrallar moduliga to'g'ri keladi. Unda aniqmas integral, aniq integral va ularning xossalari, xosmas integrallar, ikki va uch karrali integrallar va ularning xossalari yetarli darajada o'rGANILGAN. Bundan tashqari har bir mavzuga doir misollar yechib ko'satilgan hamda ushbu darsda mustaqil yechish uchun misollar ham keltiriladi

O'quv qo'llanmada keltirilgan mavzular iloji boricha qat'iy va tushunarli bo'lishiga harakat qilindi hamda ko'p miqdordagi misollar bilan ta'minlandi, bu esa nazariy mazmunning ma'nosini ochishga yordam beradi.

O'quv qo'llanma kamchiliklardan holi emas albatta, shu sababli muallif uni takomillashtirishga qaratilgan fikr va mulohazalarni mamnuniyat bilan qabul qiladi va oldindan o'z minnatdorchiligini bildiradi.

I BOB. ANIQMAS INTEGRAL

1.1. Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral

Berilgan funksianing hosilasini topish differensial hisobning asosiy masalalaridan biridir. Matematik analizning geometriya, mexanika, fizika va texnikadagi masalalarga keng miqyosdagi tatbiqi teskari masalani yechishga, ya'ni berilgan $f(x)$ funksiya uchun hosilasi shu funksiyaga teng bo'lган $F(x)$ funksiyani topishga olib keladi.

Funksianing berilgan hosilasiga ko'ra uning o'zini topish masalasi integral hisobning asosiy masalalaridan biri hisoblanadi.

$y = f(x)$ funksiya $(a; b)$ intervalda aniqlangan bo'lsin.

1-ta'rif. Agar $(a; b)$ intervalda differensiallanuvchi $F(x)$ funksianig hosilasi berilgan $f(x)$ funksiyaga teng, ya'ni

$$F'(x) = f(x) \quad (\text{yoki } dF(x) = f(x)dx)$$

bo'lsa, $F(x)$ funksiyaga $(a; b)$ intervalda $f(x)$ funksianing boshlang'ich funksiyasi deyiladi

Masalan: $F(x) = x^6$ funksiya butun sonlar oqida $f(x) = 6x^5$ funksianing boshlang'ich funksiyasi bo'ladi, chunki $x \in R$ da $(x^6)' = 6x^5$;

$F(x) = \sqrt{1 - x^2}$ funksiya $(-1; 1)$ intervalda $f(x) = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$ funksianing

boshlang'ich funksiyasi bo'ladi, chunki $x \in (-1; 1)$ da $(\sqrt{1 - x^2})' = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$.

Lemma. Agar $F(x)$ va $\Phi(x)$ funksiyalar $(a; b)$ intervalda $f(x)$ funksianing boshlang'ich funksiyalari bo'lsa, u holda $F(x)$ va $\Phi(x)$ bir-biridan o'zgarmas songa farq qiladi.

Istboti. $F(x)$ va $\Phi(x)$ funksiyalar $(a; b)$ intervalda $f(x)$ funksianing boshlang'ich funksiya bo'lsin: $F'(x) = f(x)$, $\Phi'(x) = f(x)$.

U holda istalgan $x \in (a; b)$ da

$$(\Phi(x) - F(x))' = \Phi'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

bo'ladi. Bundan $\Phi(x) - F(x) = C$ yoki $\Phi(x) = F(x) + C$ kelib chiqadi, bu yerda C – ixtiyoriy o'zgarmas son.

Shunday qilib, $f(x)$ funksiya $(a; b)$ intervalda biror $F(x)$ boshlang'ich funksiyaga ega bo'lsa, uning qolgan barcha boshlang'ich funksiyalari $\{F(x) + C\}$ to'plamni tashkil qiladi.

2-ta’rif. $f(x)$ funksiyaning $(a;b)$ intervaldagи boshlang‘ich funksiyalari to‘plamiga $f(x)$ funksiyaning aniqmas integrali deyiladi va $\int f(x)dx$ kabi belgilanadi.

Shunday qilib, ta’rifga ko‘ra

$$\int f(x)dx = F(x) + C, \quad (1.1)$$

bu yerda $f(x)$ - integral ostidagi funksiya, $f(x)dx$ -integral ostidagi ifoda; x - integrallash o‘zgaruvchisi, \int - integrallash belgisi deb ataladi.

Aniqmas integralni topish, ya’ni berilgan funksiyaning boshlang‘ich funksiyalari to‘plamini aniqlash masalasi funksiyani integrallash deyiladi.

Demak, funksiyani integrallash amali funksiyani differensiallashga teskari amal bo‘ladi.

Berilgan $f(x)$ funksiya qachon boshlang‘ich funksiyaga ega bo‘ladi degan savolga quyidagi teorema javob beradi (teoremani isbotsiz keltiramiz).


1-teorema. Agar $f(x)$ funksiya $[a;b]$ kesmada uzlusiz bo‘lsa, u holda u bu kesmada uzlusiz bo‘lgan boshlang‘ich funksiyaga ega bo‘ladi.

Ko‘p hollarda $F(x)$ funksiya $f(x)$ funksiyaning boshlang‘ich funksiyasi bo‘ladigan $(a;b)$ interval ko‘rsatilmaydi. Bunday holda $(a;b)$ interval sifatida $f(x)$ funksiyaning aniqlanish sohasi tushuniladi. Shu sababli bundan keyin integral ostidagi funksiyalar uzlusiz va (1.1) formula ma’noga ega deb hisoblaymiz. Masalan, $f(x) = \frac{1}{x}$ funksiya $(-\infty; 0)$ va $(0; \infty)$ intervalda uzlusiz.

Shuning sababli uning aniqmas integrali deb

$$\int \frac{dx}{x} = \begin{cases} \ln x + C, & x > 0, \\ \ln(-x) + C, & x < 0 \end{cases} = \ln|x| + C \quad (x \neq 0)$$

funksiya tushuniladi.



parallel ko'chirish yordamida hosil qilinadi.

1.2. Aniqmas integralning xossalari

Aniqmas integral quyidagi xossalarga ega.

1°. Aniqmas integralning hosilasi integral ostidagi $f(x)$ funksiyaga teng:

$$(\int f(x)dx)' = f(x);$$

Izboti. $F(x)$ funksiya $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi, ya'ni $F'(x) = f(x)$ bo'lsin. U holda

$$\cdots (\int f(x)dx)' = (F(x) + C)' = F'(x) + 0 = f(x).$$

Bu xossa integrallashning to'g'riligini differensiallash orqali tekshirish imkonini beradi.

Masalan, $\int (3x^2 + 5)dx = x^3 + 5x + C$ to'g'ri, chunki $(x^3 + 5x + C)' = 3x^2 + 5$.

2°. Funksiya differensialining aniqmas integrali shu funksiya bilan o'zgarmas sonning yig'indisiga teng:

$$\int dF(x) = F(x) + C.$$

Izboti. $F'(x) = f(x)$ bo'lsin. U holda

$$\int dF(x) = \int F'(x)dx = \int f(x)dx = F(x) + C.$$

3°. O'zgarmas ko'paytuvchini aniqmas integral belgisidan tashqariga chiqarish mumkin:

$$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx, \quad k = \text{const}, k \neq 0.$$

Izboti. $F'(x) = f(x)$ bo'lsin. Bundan

$$\int kf(x)dx = \int kF'(x)dx = \int (kF(x))'dx = k(F(x) + C) = kF(x) + C_1 = k \int f(x)dx \quad (C_1 = kC \text{ deb olindi}).$$

Boshlang'ich funksiyaning grafigi integral egri chiziq deb ataladi.

Aniqmas integral geometrik jihatdan ixtiyoriy C o'zgarmasga bog'liq bo'lgan barcha integral egri chiziqlar to'plamini ifodalaydi. Agar $F(x)$ funksiyaning grafigi integral egri chiziqlar uni Oy o'qi bo'yicha

4". Chekli sondagi funksiyalar algebraik yig'indisining aniqmas integrali shu funksiyalar aniqmas integrallarining algebraik yig'indisiga teng:

$$\int(f(x) \pm g(x))dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx.$$

Isboti. $F'(x) = f(x)$, $G'(x) = g(x)$ bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned} \int(f(x) \pm g(x))dx &= \int(F'(x) \pm G'(x))dx = \int(F(x) \pm G(x))'dx = \int d(F(x) \pm G(x)) = \\ &= F(x) \pm G(x) + C = (F(x) + C_1) \pm (G(x) + C_2) = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx, \quad C_1 \pm C_2 = C. \end{aligned}$$

5". Agar $\int f(x)dx = F(x) + C$ bo'lsa, u holda x ning istalgan differensiallanuvchi funksiyasi $u = u(x)$ uchun $\int f(u)du = F(u) + C$ bo'ladi.

Isboti. x erkli o'zgaruvchi, $f(x)$ uzluksiz funksiya, $F(x)$ funksiya $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo'lsin. U holda $\int f(x)dx = F(x) + C$ bo'ladi.

$u = \varphi(x)$ bo'lsin, bu yerda $\varphi(x)$ - uzluksiz hosilaga ega bo'lgan funksiya.

Birinchi differensialning invariantlik xossasiga ko'ra $dF(u) = F'(u)du = f(u)du$ bo'ladi.

Bundan

$$\int f(u)du = \int d(F(u)) = F(u) + C.$$

Bu xossa integrallash formulasining invariantligi xossasi deyiladi. Demak, aniqmas integral integrallash o'zgaruvchisi erkli o'zgaruvchi yoki erkli o'zgaruvchining uzluksiz hosilaga ega bo'lgan ixtiyoriy funksiyasi bo'lishidan qat'iy nazar bir xil formula bilan topiladi.

1.3. Asosiy elementar funksiyalarning integrallar jadvali

Integrallash differensiallash amaliga teskari amal bo'lgani uchun asosiy integrallar jadvalini differensial hisobning mos formulalarini qo'llash va aniqmas integralning xossalardan foydalanish orqali hosil qilish mumkin.

Masalan, $d(\sin u) = \cos u du$ ekanidan $\int \cos u du = \int d(\sin u) = \sin u + C$.

Quyida keltiriladigan integrallar asosiy integrallar jadvali deyiladi.

Asosiy integrallar jadvalida integrallash o‘zgaruvchisi u erkli o‘zgaruvchi yoki erkli o‘zgaruvchining funksiyasi (5° xossaga ko‘ra) bo‘lishi mumkin.

Jadvalda keltirilgan formulalarning to‘g‘riligiga uning o‘ng tomonini differensiallash va bu differensialning formula chap tomonidagi integral ostidasi ifodaga teng bo‘lishini tekshirish orqali ishonch hosil qilish mumkin.

Asosiy integrallar jadvali

Quyidagi integrallarga odatda jadval integrallari deyiladi.

$$1. \int u^a du = \frac{u^{a+1}}{a+1} + C, \quad (\alpha \neq -1); \quad 2. \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C;$$

$$3. \int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C, \quad (0 < a \neq 1); \quad 4. \int e^u du = e^u + C;$$

$$5. \int \sin u du = -\cos u + C; \quad 6. \int \cos u du = \sin u + C;$$

$$7. \int \operatorname{tg} u du = -\ln |\cos u| + C; \quad 8. \int \operatorname{ctg} u du = \ln |\sin u| + C;$$

$$9. \int \frac{du}{\cos^2 u} = \operatorname{tg} u + C; \quad 10. \int \frac{du}{\sin^2 u} = -\operatorname{ctg} u + C;$$

$$11. \int \frac{du}{\sin u} = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{u}{2} \right| + C; \quad 12. \int \frac{du}{\cos u} = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{u}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C;$$

$$13. \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arcsin \frac{u}{a} + C; \quad 14. \int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \ln \left| u + \sqrt{u^2 \pm a^2} \right| + C.$$

$$15. \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{u}{a} + C; \quad 16. \int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right| + C;$$

$$17. \int \sqrt{u^2 \pm a^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{u^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln \left| u + \sqrt{u^2 \pm a^2} \right| + C.$$

$$18. \int \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{u}{a} + C;$$

$$19. \int sh u du = chu + C; \quad 20. \int ch u du = shu + C;$$

$$21. \int \frac{du}{ch^2 u} = th u + C; \quad 22. \int \frac{du}{sh^2 u} = -cth u + C.$$

Bu integrallardan birining, masalan 13- formulaning to‘g‘riligini ko‘rsatamiz:

$$d \left(\arcsin \frac{u}{a} + C \right) = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{a} \right)^2}} \cdot \frac{1}{a} du = \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}}.$$

Amaliy mashg‘ulotda yechiladigan misollar.

Berilgan aniqmas integrallarni toping.

$$1. \int (x^3 + 5x + \frac{5}{x}) dx$$

$$2. \int (3 - x^2)^2 dx$$

$$3. \int (3 - \frac{1}{x^3}) \sqrt{x^2 - \sqrt{x}} dx$$

$$4. \int a^{-x} (1 - \frac{a^x}{\sqrt{x}}) dx$$

$$5. \int \frac{\cos 2x dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$$

$$6. \int \frac{5 - 2 \operatorname{ctg}^3 x}{\cos^2 x} dx$$

$$7. \int \operatorname{tg} 3x dx$$

$$8. \int (\sin 7x - \frac{1}{4x+4} + \frac{1}{\cos^2 4x}) dx$$

$$8. \int \frac{x-4}{1-x^2} dx, 9. \int \frac{x-x^3}{\sqrt{9+x^4}} dx, 10. \int \frac{3^x}{\sqrt{9-9x}} dx$$

Mustaqil yechish uchun misollar.

Berilgan aniqmas integrallarni toping.

$$1. \int \frac{e^{2x} dx}{e^{2x} + 3} \quad 2. \int (3x - \sqrt{7x^4 - 1} + \frac{1}{\sin^2 4x}) dx \quad 3. \int \frac{dx}{2x^2 + 5}$$

$$4. \int \frac{dx}{\sqrt{5-x^2}} \quad 5. \int \frac{5x-2}{x^2+4} dx \quad 6. \int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2}} dx$$

1.4. Aniqmas integralda integrallash usullari

Bevosita integrallash usuli

Integral ostidagi funksiyada (yoki ifodada) almashtirishlar bajarish va aniqmas integralning xossalarni qo'llash orqali berilgan integralni bir yoki bir nechta jadval integraliga kelnitib integrallash usuliga bevosita integrallash usuli deyiladi.

Misollar

$$1. \int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx = \int \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\cos^2 x} \right) dx =$$

$$= \int \frac{dx}{\sin^2 x} - \int \frac{dx}{\cos^2 x} = -\operatorname{ctgx} x - \operatorname{tg} x + C = -\frac{2}{\sin 2x} + C;$$

$$2. \int \left(5 \sin x - \frac{2}{x^2+1} + x^3 \right) dx = 5 \int \sin x dx - 2 \int \frac{dx}{x^2+1} + \int x^3 dx =$$

$$= -5 \cos x - 2 \operatorname{arctgx} x + \frac{x^4}{4} + C;$$

$$3. \int \frac{x^4}{1+x^2} dx = - \int \frac{1-x^4-1}{1+x^2} dx = - \int (1-x^2) dx + \int \frac{dx}{1+x^2} =$$

$$= - \int dx + \int x^2 dx + \int \frac{dx}{1+x^2} = -x + \frac{x^3}{3} + \operatorname{arctgx} x + C.$$

$$4. \int \frac{dx}{\sqrt{x-3} - \sqrt{x-7}} = \int \frac{\sqrt{x-3} + \sqrt{x-7}}{\sqrt{x-3} + \sqrt{x-7}} \cdot \frac{dx}{\sqrt{x-3} - \sqrt{x-7}} =$$

$$= \frac{1}{4} \int (\sqrt{x-3} + \sqrt{x-7}) dx = \frac{1}{6} \sqrt{(x-3)^3} + \frac{1}{6} \sqrt{(x-7)^3} + C.$$

$$5. \int \frac{dx}{\sqrt{3+x+x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{11}{4} + \left(\frac{1}{4} + x + x^2\right)}} = \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{11}}{2}\right)^2}} =$$

$$= \left(u = x + \frac{1}{2}, \ a = \left(\frac{\sqrt{11}}{2} \right) \right) = \ln \left| x + \frac{1}{2} + \sqrt{\left(x + \frac{1}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{11}}{2} \right)^2} \right| + C =$$

$$= \ln \left| x + \frac{1}{2} + \sqrt{3 + x + x^2} \right| + C.$$

Berilgan integralni jadval integrallariga keltirishda differensialning quyidagi almashtirishlari («differensial amali ostiga kiritish» jarayoni) qo'llaniladi:

$$du = d(u+a), \ a - \text{son}; \ du = \frac{1}{a} d(au); \ u du = \frac{1}{2} d(u^2); \ \cos u du = d(\sin u);$$

$$\sin u du = -d(\cos u); \ \frac{1}{u} du = d(\ln u); \ \frac{1}{\cos^2 u} du = d(\operatorname{tg} u).$$

Umuman olganda, $f'(u)du = d(f(u))$. Bu formuladan integrallarni topishda ko'p foydalaniлади.

Misollar

$$1. \int \frac{\cos x + \sin x}{\sin x - \cos x} dx = \int \frac{d(\sin x - \cos x)}{\sin x - \cos x} = \ln |\sin x - \cos x| + C.$$

$$2. \int \frac{dx}{16+9x^2} = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x)}{16+(3x)^2} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \operatorname{arctg} \frac{3x}{4} + C = \frac{1}{12} \operatorname{arctg} \frac{3x}{4} + C;$$

O'rniga qo'yish (o'zgaruvchini almashtirish) usuli

Ko'pchilik hollarda integralda o'zgaruvchini almashtirish uni bevosita integrallashga olib keladi. Integrallashning bu usuli o'rniga qo'yish (o'zgaruvchini almashtirish) usuli deb yuritiladi. Bu usul quyidagi teoremagaga asoslanadi.

1-teorema. Biror T oraliqda aniqlangan va differensiallanuvchi $x = \varphi(t)$ funksiyaning qiymatlar sohasi X dan iborat bo'lib, X da $f(x)$ funksiya aniqlangan bo'lsin, y'ani T oraliqda $f(\varphi(t))$ murakkab funksiya aniqlangan bo'lsin. Agar $F(x)$ funksiya X oraliqda $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo'lsa, u holda

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \quad (1.1)$$

bo‘ladi.

Istboti. X oraliqda $f(x)$ va $F(x)$ funksiyalar aniqlangan.

Shu sababli $f(\varphi(t))$ va $F(\varphi(t))$ murakkab funksiyalar T oraliqda aniqlangan, differensiallanuvchi hamda

$$(F(\phi(t))) = F(\phi(t))\phi'(t) = f(\phi(t))\phi'(t)$$

bo‘ladi.

Bundan

$$\int f(\phi(t))\phi'(t)dt = \int (F(\phi(t)))dt = F(\phi(t)) + C = (F(x) + C)\Big|_{x=\phi(t)} = \int f(x)dx\Big|_{x=\phi(t)}$$

hisobga olinsa,

$$\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

(1.1) formula aniqmas integralda o‘zgaruvchini almashtirish formulasi deb yuritiladi.

Ayrim hollarda $t = \varphi(x)$ o‘rniga qo‘yish bajarishga to‘g‘ri keladi.

U holda $\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = \int f(t)dt$ bo‘ladi. Demak, (1.1) formula o‘ngdan chapga qo‘llanishi ham mumkin.

Misollar.

1. $\int \frac{\sqrt{1+\ln x}}{x \ln x} dx$ integralni topamiz. $1+\ln x = t^2$ bo‘lsin.

Bundan $\ln x = t^2 - 1$, $\frac{dx}{x} = 2tdt$.

(1.1) formulaga ko‘ra

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1+\ln x}}{x \ln x} dx &= \int \frac{t \cdot 2tdt}{t^2 - 1} = 2 \int \frac{t^2 dt}{t^2 - 1} = 2 \int \left(1 + \frac{1}{t^2 - 1}\right) dt = 2 \left(t + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| \right) + C = \\ &= 2t + \ln \left| \frac{(t-1)^2}{t^2 - 1} \right| + C = 2\sqrt{1+\ln x} + \ln \left| \frac{(\sqrt{1+\ln x})^2}{1+\ln x - 1} \right| + C = \\ &= 2\sqrt{1+\ln x} + 2 \ln \left| \sqrt{1+\ln x} - 1 \right| - \ln |\ln x| + C. \end{aligned}$$

2. $\int x\sqrt{x-3}dx$ integralni topamiz. Bunibg uchun $\sqrt{x-3} = t$ o‘rniga qo‘yish bajaramiz. U holda $x = t^2 + 3$, $dx = 2tdt$.

Shu sababli

$$\begin{aligned} \int x\sqrt{x-3}dx &= \int (t^2 + 3) t \cdot 2tdt = 2 \int (t^4 + 3t^2) dt = \\ &= 2 \int t^4 dt + 6 \int t^2 dt = 2 \cdot \frac{t^5}{5} + 6 \cdot \frac{t^3}{3} + C = \frac{2}{5} \sqrt{(x-3)^5} + 2\sqrt{(x-3)^3} + C. \end{aligned}$$

3. $\int \sqrt{1+\cos^2 x} \sin 2x dx$ integralni topamiz. Bunda $1+\cos^2 x = t^2$ deymiz.

$$\text{Bundan } -2\cos x \sin x dx = 2tdt \text{ yoki } \sin 2x = -2tdt.$$

U holda

$$\int \sqrt{1+\cos^2 x} \sin 2x dx = \int t(-2t) dt = -2 \cdot \frac{t^3}{3} + C = -\frac{2}{3} \sqrt{(1+\cos^2 x)^3} + C.$$

4. $\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2} dx$ integralda $x=3\sin t, dx=3\cos t dt, \sqrt{9-x^2}=3\cos t$

deymiz. Bunda $t=\arcsin \frac{x}{3}$. U holda

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2} dx &= \int \frac{\cos^2 t}{\sin^2 t} dt = \int \frac{1-\sin^2 t}{\sin^2 t} dt = \int \frac{dt}{\sin^2 t} - \int dt = -ctgt - t + C = \\ &= -\frac{\cos t}{\sin t} - t + C = -\frac{\sqrt{1-\sin^2 t}}{\sin t} - t + C = -\frac{\sqrt{1-\left(\frac{x}{3}\right)^2}}{\frac{x}{3}} - \arctg \frac{x}{3} + C = \\ &= -\frac{\sqrt{9-x^2}}{x} - \arcsin \frac{x}{3} + C \end{aligned}$$

Izoh. Ayrim hollarda integrallashning o‘zgaruvchini almashtirish usuli takroran qo‘llaniladi, ya’ni bunda bajarilgan o‘rniga qo‘yishdan so‘ng shunday integral hosil bo‘ladiki, bu integralni boshqa o‘rniga qo‘yish orqali soddalashtirish yoki jadval integraliga keltirish mumkiin bo‘ladi.

Bo‘laklab integrallash usuli

Bo‘laklab integrallash usuli ikki funksiya ko‘paytmasining differentsiiali formulasiga asoslanadi.

2-teorema. $u(x)$ va $v(x)$ funksiyalar qandaydir X oraliqda aniqlangan va differentsiallanuvchi bo‘lib, $u'(x)v(x)$ funksiya bu oraliqda boshlang‘ich funksiyaga ega, y’ani $\int u'(x)v(x)dx$ integral mavjud bo‘lsin. U holda X oraliqda $u(x)v'(x)$ funksiya boshlang‘ich funksiyaga ega va

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)dx \quad (1.2)$$

bo‘ladi.

Istboti. $(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + v'(x)u(x)$ tenglikdan

$$u(x)v'(x) = (u(x)v(x))' - v(x)u'(x).$$

$(u(x)v(x))'$ va $u'(x)v(x)$ funksiyalar X intervalda boshlang‘ich funksiyaga ega bo‘lgani uchun $v'(x)u(x)$ ham X intervalda boshlang‘ich funksiyaga ega bo‘ladi. Oxirgi tenglikning chap va o‘ng tomonini integrallasak, formula kelib chiqadi.

(1.2) formulaga aniqmas integralni bo'laklab integrallash formularini deyiladi.

Ma'lumki, $v'(x)dx = dv$, $u'(x)dx = du$. Bundan (1.2) formula

$$\int u dv = uv - \int v du \quad (1.3)$$

ko'rinishga keltiriladi.

Bo'laklab integrallash usulining mohiyati berilgan integralda integral ostidagi $f(x)dx$ ifodani udv ko'paytma shaklida tasvirlash va (1.3) formulani qo'llagan holda berilgan $\int u dv$ integralni oson integrallanadigan $\int v du$ integral bilan almashtirib topishdan iborat.

Bo'laklab integrallash orqali topiladigan integrallarni asosan uch guruhga ajratish mumkin:

$$1) \int P(x) \arctg x dx, \int P(x) \operatorname{arcctg} x dx, \int P(x) \ln x dx, \int P(x) \arcsin x dx,$$

$\int P(x) \arccos x dx$ (bu yerda $P(x)$ - ko'phad) ko'rinishdagi 1-guruh integrallar.

Bunda $dv = P(x)dx$, qolgan ko'paytuvchilar u bilan belgilanadi;

2) $\int P(x)e^{kx} dx, \int P(x)\sin kx dx, \int P(x)\cos kx dx$ ko'rinishdagi 2-guruh integrallar. Bunday bo'laklashda $u = P(x)$, qolgan ko'paytuvchilar dv deb olinadi;

3) $\int e^{kx} \sin kx dx, \int e^{kx} \cos kx dx$ ko'rinishdagi 3-guruh integrallar bo'laklab integrallash formulasini takroran qo'llash orqali topiladi.

Misollar

$$1. I = \int \sin x e^{2x} dx = \left| \begin{array}{l} u = e^{2x}, \quad du = 2e^{2x} dx \\ dv = \sin x dx, \quad v = -\cos x \end{array} \right| = -e^{2x} \cos x + 2 \int e^{2x} \cos x dx = \\ = \left| \begin{array}{l} u = e^{2x}, \quad du = 2e^{2x} dx \\ dv = \cos x dx, \quad v = \sin x \end{array} \right| = -e^{2x} \cos x + 2(-e^{2x} \sin x - 2 \int e^{2x} \sin x dx) = \\ = e^{2x}(2\sin x - \cos x) - 4I.$$

Bundan

$$I = \frac{1}{5} e^{2x}(2\sin x - \cos x) + C.$$

$$2. \int \operatorname{arctg} x dx = \left| \begin{array}{l} u = \operatorname{arctg} x, \quad du = \frac{dx}{1+x^2}, \\ dv = dx, \quad v = x \end{array} \right| = x \operatorname{arctg} x - \int \frac{x}{1+x^2} dx = \\ = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} dx = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln |1+x^2| + C.$$

3.

$$\int xe^x dx = \left| \begin{array}{l} u = x, \ du = dx \\ dv = e^x dx, \ v = e^x \end{array} \right| = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C = e^x(x-1) + C.$$

$$\begin{aligned} 4. \int \ln^2 x dx &= \left| \begin{array}{l} \ln^2 x = u, \ du = 2 \ln x \cdot \frac{dx}{x}, \\ dx = dv, \ v = x \end{array} \right| = x \ln^2 x - 2 \int \ln x dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} \ln x = u, \ du = \frac{dx}{x}, \\ dx = dv, \ v = x \end{array} \right| = x \ln^2 x - 2x \ln x + 2 \int dx = x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x + C. \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned} \int x^2 \sin 2x dx &= \left| \begin{array}{l} x^2 = u, \ du = 2x dx, \\ \sin 2x dx = dv, \ v = -\frac{\cos 2x}{2} \end{array} \right| = -\frac{1}{2} x^2 \cos 2x + \int x \cos 2x dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} x = u, \ du = dx, \\ \cos 2x dx = dv, \ v = \frac{\sin 2x}{2} \end{array} \right| = -\frac{1}{2} x^2 \cos 2x + \frac{1}{2} x \sin 2x - \frac{1}{2} \int \sin 2x dx = \\ &= -\frac{1}{2} x^2 \cos 2x + \frac{1}{2} x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x + C. \end{aligned}$$

Ko'rsatilgan uch guruh bo'laklab integrallanadigan barcha integrallarni o'z ichiga olmaydi.

Masalan,

6.

$$\begin{aligned} \int \sin x \ln \cos x dx &= \left| \begin{array}{l} \ln \cos x = u, \ du = -\frac{\sin x}{\cos x} dx \\ \sin x dx = dv, \ v = -\cos x \end{array} \right| = -\cos x \ln \cos x - \int \sin x dx = \\ &= -\cos x \ln \cos x + \cos x + C = \cos x(1 - \ln \cos x) + C. \end{aligned}$$

$$7. \int \frac{xdx}{\cos^2 x} = \left| \begin{array}{l} u = x, \ du = dx \\ dv = \frac{dx}{\cos^2 x}, \ v = \operatorname{tg} x \end{array} \right| = x \operatorname{tg} x - \int \operatorname{tg} x dx = x \operatorname{tg} x - \ln |\cos x| + C.$$

$$\begin{aligned} 8. \int \frac{\ln \sin x}{\cos^2 x} dx &= \left| \begin{array}{l} \ln \sin x = u, \ du = \frac{\cos x}{\sin x} dx \\ \frac{dx}{\cos^2 x} = dv, \ v = \operatorname{tg} x \end{array} \right| = \operatorname{tg} x \ln \sin x - \int dx = \\ &= \operatorname{tg} x \ln \sin x - x + C; \end{aligned}$$

Amaliy mashg'ulotda yechiladigan misollar
Berilgan aniqmas integrallarni toping

1. $\int \arccos x dx (Javob. x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + c)$
2. $\int xe^x dx (Javob. xe^x - e^x + c)$
3. $\int e^x \cos x dx (Javob. \frac{e^x}{2} (\cos x + \sin x) + c)$
4. $\int \frac{x \cos x dx}{\sin^2 x} (Javob. -\frac{x}{\sin x} + \ln |\tg \frac{x}{2}| + c)$
5. $\int \frac{1}{\cos x} dx (Javob. \ln \left| \tg \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + c)$
6. $\int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}} dx (Javob. \frac{3}{2} \sqrt[3]{1-\sin 2x} + c)$
7. $\int \frac{dx}{(\arcsin x)^2 \sqrt{1-x^2}} (Javob. -\frac{1}{\arcsin x} + c)$
8. $\int \frac{x^2+1}{x^4+1} dx (Javob. \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x^2-1}{x\sqrt{2}} + c)$
9. $\int \frac{dx}{\sin^2 x \sqrt[3]{\operatorname{ctgx}}} (Javob. -\frac{4}{3} \sqrt[3]{\operatorname{ctgx}^3 x} + c)$
10. $\int \frac{dx}{\sin^2 x + 2 \cos^2 x} (Javob. \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{2}} \right) + c)$
11. $\int \frac{dx}{\sin x} \left(Javob. \ln \left| \tg \frac{x}{2} \right| + c \right)$
12. $\int \sin^2 x dx (Javob. \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + c)$

Mustaqil yechish uchun misollar.

Berilgan aniqmas integrallarni toping

1. $\int (3x - \sqrt[3]{x^5} + 2 \sin x - 3) dx$
2. $\int \frac{\ln x}{x} dx$
3. $\int (\sin 3x + x \sqrt{1+x^2}) dx$
4. $\int (x^7 - \frac{1}{\sqrt[3]{x}} + 2^x) dx$
5. $\int \frac{5x-2}{x^2+4} dx$
6. $\int \cos(3x-4) dx$

1.5. Sodda ratsional kasrlarni integrallash

I va II turdagи sodda kasrlar jadval integrallari orqali topiladi:

$$\int \frac{Adx}{x-\alpha} = A \int \frac{d(x-\alpha)}{x-\alpha} = A \ln |x-\alpha| + C; \quad (1.1)$$

$$\begin{aligned} \int \frac{Adx}{(x-\alpha)^k} &= A \int (x-\alpha)^{-k} d(x-\alpha) = \\ &= A \frac{(x-\alpha)^{-k+1}}{-k+1} + C = \frac{A}{(1-k)(x-\alpha)^{k-1}} + C. \end{aligned} \quad (1.2)$$

III turdagи sodda kasrni qaraymiz. $\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q} dx$ integralining

suratida kasrning maxrajidan olingan hosila $(x^2+px+q)'=2x+p$ ni ajratamiz va natijani integrallaymiz:

$$\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q} dx = \int \frac{\frac{M}{2}(2x+p)+N-\frac{Mp}{2}}{x^2+px+q} dx = \frac{M}{2} \int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx +$$

$$+\left(N - \frac{Mp}{2}\right) \int \frac{dx}{x^2 + px + q} = \frac{M}{2} J_1 + \left(N - \frac{Mp}{2}\right) J_2.$$

Integrallardan birinchisi $J_1 = \ln |x^2 + px + q|$.

Ikkinchini integral maxrajida to‘liq kvadrat ajratamiz va uni integrallaymiz:

$$J_2 = \int \frac{dx}{x^2 + px + q} = \int \frac{d\left(x + \frac{p}{2}\right)}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4}} = \frac{2}{\sqrt{4q - p^2}} \arctg \frac{2x + p}{\sqrt{4q - p^2}},$$

bunda $4q - p^2 > 0$, chunki $D < 0$.

Natijada quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$\int \frac{Mx + N}{x^2 + px + q} dx = \frac{M}{2} \ln |x^2 + px + q| + \frac{2N - Mp}{\sqrt{4q - p^2}} \arctg \frac{2x + p}{\sqrt{4q - p^2}} + C. \quad (1.3)$$

Misol

$\int \frac{5x + 11}{x^2 + 6x + 13} dx$ integralni topamiz.

$$\begin{aligned} \int \frac{5x + 11}{x^2 + 6x + 13} dx &= \int \frac{\frac{5}{2}(2x + 6) + 11 - \frac{5}{2} \cdot 6}{x^2 + 6x + 13} dx = \\ &= \frac{5}{2} \int \frac{(2x + 6)dx}{x^2 + 6x + 13} - 4 \int \frac{dx}{x^2 + 6x + 13} = \frac{5}{2} \ln |x^2 + 6x + 13| - 4J_1. \end{aligned}$$

J_1 integralni topamiz:

$$J_1 = \int \frac{dx}{(x+3)^2 + 4} = \int \frac{d(x+3)}{(x+3)^2 + 2^2} = \frac{1}{2} \arctg \frac{x+3}{2}.$$

Bundan

$$\int \frac{5x + 11}{x^2 + 6x + 13} dx = \frac{5}{2} \ln |x^2 + 6x + 13| - 2 \arctg \frac{x+3}{2} + C.$$

IV turdagisi sodda kasrning integralni topamiz:

$$\begin{aligned} \int \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^s} dx &= \frac{M}{2} \int \frac{(2x + p)dx}{(x^2 + px + q)^s} + \\ &+ \left(N - \frac{Mp}{2}\right) \int \frac{d\left(x + \frac{p}{2}\right)}{\left(\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4}\right)^s}. \end{aligned} \quad (1.4)$$

Bunda birinchi integral jadvaldagiga keltirib, topiladi:

$$\int \frac{(2x + p)dx}{(x^2 + px + q)^s} = \int (x^2 + px + q)^{-s} d(x^2 + px + q) = \frac{1}{(1-s)(x^2 + px + q)^{s-1}}.$$

Ikkinchi integralga uni I_s bilan belgilaymiz $\left(x + \frac{p}{2}\right) = t$ belgilash kiritamiz va $0 < q - \frac{p^2}{4} = a^2$ almashtirish bajaramiz.

U holda

$$\begin{aligned} I_s &= \int \frac{d\left(x + \frac{p}{2}\right)}{\left(\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4}\right)^s} = \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^s} = \frac{1}{a^2} \int \frac{(t^2 + a^2) - t^2}{(t^2 + a^2)^s} dt = \\ &= \frac{1}{a^2} \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^{s-1}} - \frac{1}{a^2} \int \frac{t^2 dt}{(t^2 + a^2)^s}. \end{aligned}$$

Bunda birinchi integral I_s ga o'xshash bo'lib, unda maxrajning darajasi bir birlikka kichik. Shu sababli uni I_{s-1} bilan belgilaymiz. Ikkinchi integralni bo'laklab integrallaymiz:

$$\begin{aligned} \int \frac{t^2 dt}{(t^2 + a^2)^s} &= \frac{1}{2} \int \frac{t \cdot 2t dt}{(t^2 + a^2)^s} = \frac{1}{2} \left(\frac{-t}{(s-1)(t^2 + a^2)^{s-1}} + \frac{1}{s-1} \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^{s-1}} \right) = \\ &= -\frac{t}{2(s-1)(t^2 + a^2)^{s-1}} + \frac{1}{2(s-1)} I_{s-1}. \end{aligned}$$

Demak, I_s integralni hisoblash uchun s darajani pasaytirish formulasini hosil qilamiz:

$$I_s = \frac{1}{a^2} I_{s-1} + \frac{t}{2a^2(s-1)(t^2 + a^2)^{s-1}} - \frac{1}{2a^2(s-1)} I_{s-1}$$

yoki

$$I_s = \frac{t}{2a^2(s-1)(t^2 + a^2)^{s-1}} + \frac{2s-3}{2a^2(s-1)} I_{s-1}. \quad (1.5)$$

Shunday qilib, (1.5) formula bo'yicha I_s integralni topamiz, I_s dagi barcha t ni $x + \frac{p}{2}$ bilan almashtiramiz va birinchi va ikkinchi integralni (1.4) tenglikka qo'yib IV turdagি sodda kasr integralini topish uchun ifoda hosil qilamiz.

(1.5) formula bo'yicha I_s integralni topish indeksi bittaga kichik bolgan I_{s-1} integralni topishga, I_{s-1} integralni topish esa o'z navbatida I_{s-2} integralni topishga keltiriladi va bu jarayon quyidagi jadval integralni topishgacha davom ettiriladi:

$$I_s = \int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{t}{a} + C.$$

Demak, (1.5) formula orqali I_1 dan I_{n-1} ga, so'ngra I_n , qaytiladi va hokazo. Shu sababli bunday formulalar keltirish yoki rekurrent (qaytuvchan) formulalar deyiladi.

Misol

$$\int \frac{2x+5}{(x^2+4x+8)^2} dx \text{ integralni topamiz.}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x+4+1}{(x^2+4x+8)^2} dx &= \int \frac{2x+4}{(x^2+4x+8)^2} dx + \int \frac{dx}{(x^2+4x+8)^2} = \\ &= -\frac{1}{x^2+4x+8} + \int \frac{d(x+2)}{[(x+2)^2+4]^2} = -\frac{1}{x^2+4x+8} + \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^2} \end{aligned}$$

bu yerda $t = x+2$, $a = 2$.

Bundan

$$I_2 = \frac{t}{2a^2(t^2+a^2)} + \frac{1}{2a^3} \operatorname{arctg} \frac{t}{a} = \frac{x+2}{8(x^2+4x+8)} + \frac{1}{16} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{2}.$$

Demak,

$$\begin{aligned} \int \frac{2x+5}{(x^2+4x+8)^2} dx &= -\frac{1}{x^2+4x+8} + \frac{x+2}{8(x^2+4x+8)} + \frac{1}{16} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{2} + C = \\ &= \frac{x-6}{8(x^2+4x+8)} + \frac{1}{16} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{2} + C. \end{aligned}$$

1.6. Ratsional kasr funksiyalarni integrallash

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqadiki, ushbu $R(x) = \frac{Q_m(x)}{P_n(x)}$

ratsional kasr funksiyani integrallash quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- 1)berilgan ratsional kasrning to'g'ri yoki noto'g'ri kasr ekanini tekshirish; agar kasr noto'g'ri bo'lsa, kasrdan butun qismini ajratish;
- 2)to'g'ri kasrning maxrajini ko'paytuvchilarga ajratish;
- 3)to'g'ri kasrni sodda kasrlar yig'indisiga yoyish va yoyilmaning koeffitsiyentlarni topish;
- 4)hosil bo'lgan ko'phad va sodda kasrlar yig'indisini integrallash.

Misol

$$\int \frac{x^4+6}{x^3-2x^2+2x} dx \text{ integralni topamiz.}$$

$$R(x) = \frac{x^4+6}{x^3-2x^2+2x} \text{ noto'g'ri kasr, chunki } m=4, n=3 \ (m>n).$$

Suratni maxrajga bo'lish orqali kasrdan butun qismini ajratamiz:

$$\begin{array}{r}
 \frac{x^4 + 6}{x^4 - 2x^3 + 2x^2} \left| \begin{array}{l} x^3 - 2x^2 + 2x \\ x+2 \end{array} \right. \\
 \underline{-} \quad \underline{-} \\
 \frac{2x^3 - 2x^2 + 6}{2x^3 - 4x^2 + 4x} \\
 \underline{-} \quad \underline{-} \\
 2x^2 - 4x + 6
 \end{array}$$

Bundan

$$R(x) = x + 2 + \frac{2x^2 - 4x + 6}{x^3 - 2x^2 + 2x}.$$

To‘g‘ri kasrning maxrajini ko‘paytuvchilarga ajratamiz:
 $x^3 - 2x^2 + 2x = x(x^2 - 2x + 2)$.

To‘g‘ri kasrni sodda kasrlar ga yoyamiz:

$$\frac{2x^2 - 4x + 6}{x(x^2 - 2x + 2)} = \frac{A}{x} + \frac{Mx + N}{x^2 - 2x + 2}.$$

Yoyilmaning koeffitsiyentlarini topamiz:

$$2x^2 - 4x + 6 = A(x^2 - 2x + 2) + Mx^2 + Nx.$$

Bundan

$$\begin{cases} x^2 : A + M = 2, \\ x^1 : -2A + N = -4, \\ x^0 : 2A = 6. \end{cases}$$

yoki $A = 3$, $M = -1$, $N = 2$.

Shunday qilib,

$$R(x) = x + 2 + \frac{3}{x} + \frac{-x + 2}{x^2 - 2x + 2}.$$

Ko‘phad va sodda kasrlar yig‘indisini integrallaymiz:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{(x^4 + 6)dx}{x^3 - 2x^2 + 2x} &= \int (x+2)dx + \int \frac{3dx}{x} + \int \frac{-x+2}{x^2 - 2x + 2} dx = \frac{x^2}{2} + 2x + 3\ln|x| - \\
 &- \int \frac{\frac{1}{2}(2x-2)+1-2}{x^2 - 2x + 2} dx = \frac{x^2}{2} + 2x + 3\ln|x| - \frac{1}{2} \int \frac{2x-2}{x^2 - 2x + 2} dx + \int \frac{dx}{(x-1)^2 + 1} = \\
 &= \frac{x^2}{2} + 2x + 3\ln|x| - \frac{1}{2} \ln|x^2 - 2x + 2| + \operatorname{arctg}(x-1) + C.
 \end{aligned}$$

Amaliy mashg‘ulotda yechiladigan misollar.

Berilgan aniqmas integrallarni toping

$$1. \int \frac{2x-3}{x(x-1)(x-2)} dx (\text{Jabob. } -\frac{3}{2} \ln|x| + \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|x-2| + c)$$

$$2. \int \frac{x}{(x-1)(x+1)^2} dx (\text{Jabob. } \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + \frac{1}{2} \frac{1}{x+1} + c)$$

$$3. \int \frac{x}{(x-1)(x^2+1)} dx (\text{Javob. } \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{4} \ln|x^2+1| + \frac{1}{2} \arctgx + c)$$

$$4. \int \frac{x^5+x^4-8}{x^3-4x} dx (\text{Javob. } \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 4x + \ln \left| \frac{x^2(x-2)^5}{(x+2)^3} \right| + c)$$

$$5. \int \frac{x^3+1}{x^3-x^2} dx (\text{Javob. } x + \frac{1}{x} + \ln \frac{(x-1)^2}{|x|} + c)$$

$$6. \int \frac{x^2-2x+3}{(x-1)(x^2-4x^2+3x)} dx (\text{Javob. } \frac{1}{x-1} + \ln \frac{\sqrt{(x-1)(x-3)}}{|x|} + c)$$

$$7. \int \frac{x^2}{x^2-1} dx (\text{Javob. } \frac{1}{2} \arctgx + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1-x}{1+x} \right| + c)$$

Mustaqil yechish uchun misollar.

Berilgan aniqmas integrallarni toping.

$$1. \int \frac{x-4}{x^2-5x+6} dx (\text{Javob. } \ln \frac{(x-2)^2}{|x-3|} + c)$$

$$2. \int \frac{1}{(x-1)(x+2)(x+3)} dx (\text{Javob. } \frac{1}{12} \ln \left| \frac{(x-1)(x+3)^3}{(x+2)^4} \right| + c)$$

$$3. \int \frac{2x^2-3x-3}{(x-1)(x^2-2x+5)} dx (\text{Javob. } \ln \frac{\sqrt{(x^2-2x+5)^3}}{|x-1|} + \frac{1}{2} \arctg \frac{x-1}{2} + c)$$

$$4. \int \frac{13}{x(x^2+6x+13)} dx (\text{Javob. } \ln \frac{x}{\sqrt{x^2+6x+13}} + 5 \operatorname{arc tg} \frac{x+3}{2} + c)$$

$$5. \int \frac{1}{x(x^2-1)} dx (\text{Javob. } \ln \frac{\sqrt{x^2-1}}{|x|} + c)$$

1.7. Trigonometrik funksiyalarni integrallash

Trigonometrik funksiyalarni integrallas usullaridan ayrimlari bilan tanishamiz. Faqat trigonometrik o'zgaruvchilar ustida ratsional amallar (qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish) bajarilgan ifoda berilgan bo'lsin. Bunday ifodani barcha trigonometrik funksiyalarni $\sin x$ va $\cos x$ funksiyalar orqali ratsional ravishda ifodalash va $R(\sin x, \cos x)$ ko'rinishga keltirish mumkin.

1. $\int R(\sin x, \cos x) dx$ ko'rinishidagi integrallar

$\int R(\sin x, \cos x) dx$ ko'rinishidagi integralni $\tg \frac{x}{2} = t$ o'rniga qo'yish

orgali hamma vaqt t o'zgaruvchili ratsional funksiyaning integraliga almashtirish, ya'ni ratsionallaştirish mumkin.

Haqiqatan ham, $\int R(\sin x, \cos x) dx$ ifodadan

$$\sin x = \frac{2t \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad \cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad x = \arctg t,$$

$dx = \frac{2dt}{1+t^2}$ o‘rniga qo‘yishlar yordamida t o‘zgaruvchili

$\int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \cdot \frac{2dt}{1+t^2} = \int R_1(t)dt$ ratsional funksiya kelib chiqadi.

$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$ o‘rniga qo‘yish orgali $\int R(\sin x, \cos x)dx$ ko‘rinishidagi har qanday integralni topish mumkin. Shu sababli bu o‘rniga qo‘yish universal trigonometrik o‘rniga qo‘yish deb ataladi.

Misol. $\int \frac{dx}{3\sin x + 2\cos x + 3}$ integralni topamiz. Bunda $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$ o‘rniga qo‘yish bajaramiz. U holda

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{3\sin x + 2\cos x + 3} &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{3 \cdot \frac{2t}{1+t^2} + 2 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} + 3} = 2 \int \frac{dt}{t^2 + 6t + 5} = 2 \int \frac{dt}{(t+1)(t+5)} = \\ &= \int \left(\frac{A}{t+1} + \frac{B}{t+5} \right) dt = A \ln |t+1| + B \ln |t+5| + C. \end{aligned}$$

No‘malum koeffitsiyentlarni aniqlaymiz: $A = \frac{1}{2}$, $B = -\frac{1}{2}$.

Demak,

$$\int \frac{dx}{3\sin x + 2\cos x + 3} = \frac{1}{2} (\ln |t+1| - \ln |t+5|) + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t+1}{t+5} \right| = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 5} \right| + C.$$

Universal trigonometrik o‘rniga qo‘yish $R(\sin x, \cos x)$ ko‘rinishidagi har qanday funksiyani ratsionallashtirish imkonini beradi, ammo amalda ko‘pincha ancha murakkab ratsional funksiyalar hosil bo‘lishi mumkin. Shu sababli ba’zan yuqorida keltirilgan integralni topishda quyidagi sodda o‘rniga qo‘yishlardan foydalilanildi:

a) agar $R(\sin x, \cos x)$ ifoda $\sin x$ ga nisbatan toq, ya’ni $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ bo‘lsa, u holda $\cos x = t$ o‘rniga qo‘yish bu funksiyani ratsionallashtiradi;

b) agar $R(\sin x, \cos x)$ ifoda $\cos x$ ga nisbatan toq, ya'ni $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ bo'lsa, u holda $\sin x = t$ o'rniga qo'yish orqali bu funksiya ratsionallashtiriladi;

c) agar $R(\sin x, \cos x)$ ifoda $\sin x$ va $\cos x$ larga nisbatan juft, ya'ni $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$ bo'lsa, u holda $\operatorname{tg}x = t$ o'rniga qo'yish bu funksiyani ratsionallashtiradi.

Bunda quyidagi almashtirishlardan foydalaniladi:

$$\sin^2 x = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{t^2}{1 + t^2}, \quad \cos^2 x = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{1}{1 + t^2}, \quad x = \arctg t, \quad dx = \frac{dt}{1 + t^2}.$$

Misollar

1. $\int \frac{\cos x dx}{\sin^2 x - 4\sin x + 5}$ integralni topami. Integral ostidagi funksiya $\cos x$ ga nisbatan toq funksiya. Shu sababli $\sin x = t$, $\cos x dx = dt$ deb olamiz.

U holda

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos x dx}{\sin^2 x - 4\sin x + 5} &= \int \frac{dt}{t^2 - 4t + 5} = \int \frac{dt}{(t-2)^2 + 1} = \\ &= \arctg(t-2) + C = \arctg(\sin x - 2) + C. \end{aligned}$$

2. $\int \frac{dx}{1 - 2\sin^2 x}$ integralni topamiz. Integral ostidagi funksiya $\sin x$ ga nisbatan juft funksiya, shu sababli $\operatorname{tg}x = t$ o'rniga qo'yishdan foydalananamiz:

$$\int \frac{dx}{1 - 2\sin^2 x} = \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{1 - \frac{2t^2}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{1-t^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t+1}{t-1} \right| = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\operatorname{tg}x+1}{\operatorname{tg}x-1} \right| + C.$$

2. $\int \sin^m x \cos^n x dx$ ko'rinishidagi integrallar

$\int \sin^m x \cos^n x dx$ ko'rinishidagi integrallar m va n butun sonlarga bog'liq holda quyidagicha topiladi:

a) $n > 0$ va toq bo'lganida $\cos x = t$ o'rniga qo'yish integralni ratsionallashtiradi;

a) $m > 0$ va toq bo'lganida $\sin x = t$ o'rniga qo'yish orqali integral ratsionallashtiriladi;

c) ikkala m va n daraja ko'rsatkichlar juft va nomanfiy bo'lganida

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

formulalaridan foydalanib, darajalar pasaytiriladi;

d) $m+n < 0$ va juft bo'lganida $\operatorname{tg}x = t$ yoki $\operatorname{ctgx} = t$ o'rniga qo'yishdan foydalaniladi. Bunda $m < 0$ va $n < 0$ bo'lsa, u holda suratda $I = (\sin^2 x + \cos^2 x)^k$, $\left(k = \frac{|m+n|}{2} - 1\right)$ almashtirishdan iborat sun'iy usul qo'llab, ratsional funksiyalarni integrallashga keltiriladi;

e) $m, n \leq 0$ va ulardan biri toq bo'lganida $\sin x$ va $\cos x$ lardan qaysi birining darajasi toqligiga qarab, surat va maxrajni shu funksiyaga qo'shimcha ko'paytirishdan foydalaniladi.

Misollar

$$\begin{aligned} 1. \int \sin^n x \cos^2 x dx \quad (n > 0 \text{ va toq}, \cos x = t) &= \int \sin^4 x \cos^2 x \sin x dx = \\ &= -\int (1-t^2)^2 t^2 dt = -\int t^2 dt + 2 \int t^4 dt - \int t^6 dt = -\frac{t^3}{3} + \frac{2t^5}{5} - \frac{t^7}{7} + C = \\ &= -\frac{1}{3} \cos^3 x + \frac{2}{5} \cos^5 x - \frac{1}{7} \cos^7 x + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \int \sin^n x \cos^m x dx \quad (n, m \geq 0 \text{ va juft}) &= \int (\sin x \cos x)^2 \sin^2 x dx = \\ &= \int \left(\frac{\sin^2 2x}{4}\right) \cdot \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right) dx = \frac{1}{8} \int (\sin^2 2x - \sin^2 2x \cos 2x) dx = \\ &= \frac{1}{8} \int \frac{1-\cos 4x}{2} dx - \frac{1}{16} \int \sin^2 2x d(\sin 2x) = \\ &= \frac{1}{16} \left(x - \frac{\sin 4x}{4}\right) - \frac{\sin^3 2x}{48} + C = \frac{1}{16} \left(x - \frac{\sin 4x}{4} - \frac{\sin^3 2x}{3}\right) + C. \end{aligned}$$

$$3. \int \frac{dx}{\sin^4 x \cos^2 x} \quad \text{integralda} \quad n = -4, \quad m = -2, \quad n+m = -6 < 0,$$

$$k = \frac{|m+n|}{2} - 1 = 2.$$

Demak,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin^4 x \cos^2 x} &= \int \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x)^2}{\sin^4 x \cos^2 x} dx = \int \frac{\sin^4 x + 2\sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x}{\sin^4 x \cos^2 x} dx = \\ &= \int \frac{dx}{\cos^2 x} + 2 \int \frac{dx}{\sin^2 x} + \int \frac{\cos^2 x}{\sin^4 x} dx = \operatorname{tg}x - 2\operatorname{ctgx} - \int \operatorname{ctg}^3 x d(\operatorname{ctgx}) = \\ &= \operatorname{tg}x - 2\operatorname{ctgx} - \frac{1}{3} \operatorname{ctg}^3 x + C. \end{aligned}$$

3. $\int \operatorname{tg}'' x dx$ va $\int \operatorname{ctg}'' x dx$ ko'rinishidagi integrallar

$\int \operatorname{tg}^n x dx$ va $\int \operatorname{ctg}^n x dx$ (bu yerda $n > 0$ butun son) ko‘rinishidagi integrallar mos rasvishda $\operatorname{tg}x = t$ va $\operatorname{ctgx} = t$ o‘rniga qo‘yish orqali topiladi.

Bunday integrallarni orniga qo‘yishlardan foydalanmasdan, bevosita

$$\operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1, \quad \operatorname{ctg}^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} - 1$$

formulalar yordamida hisoblash ham mumkin.

Misol

$\int \operatorname{tg}^5 x dx$ integralni ikki usul bilan topamiz.

$$\begin{aligned} 1\text{-usul. } \int \operatorname{tg}^5 x dx &= \left| \operatorname{tg}x = t, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2} \right| = \int \frac{t^5 dt}{1+t^2} = \int t^3 dt - \\ &- \int t dt + \int \frac{tdt}{1+t^2} = \frac{t^4}{4} - \frac{t^2}{2} + \frac{1}{2} \int \frac{d(1+t^2)}{1+t^2} = \frac{t^4}{4} - \frac{t^2}{2} + \frac{1}{2} \ln |1+t^2| + C = \\ &= \frac{1}{4} \operatorname{tg}^4 x - \frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 x - \frac{1}{2} \ln |\cos^2 x| + C = \frac{1}{4} \operatorname{tg}^4 x - \frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 x - \ln |\cos x| + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2\text{-usul. } \int \operatorname{tg}^5 x dx &= \int \operatorname{tg}^3 x \cdot \operatorname{tg}^2 x dx = \int \operatorname{tg}^3 x \cdot \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx = \\ &= \int \operatorname{tg}^3 x \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} - \int \operatorname{tg}^3 x dx = \int \operatorname{tg}^3 x d(\operatorname{tg}x) - \int \operatorname{tg}x \cdot \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx = \\ &= \frac{1}{4} \operatorname{tg}^4 x - \int \operatorname{tg}x d(\operatorname{tg}x) - \int \operatorname{tg}x dx = \frac{1}{4} \operatorname{tg}^4 x - \frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 x - \ln |\cos x| + C. \end{aligned}$$

4. $\int \sin mx \cos nx dx$, $\int \sin mx \sin nx dx$, $\int \cos mx \cos nx dx$ ko‘rinishidagi integrallar

Bu ko‘rinishdagi integrallar

$$\sin mx \cos nx = \frac{1}{2} (\sin(m+n)x + \sin(m-n)x),$$

$$\sin mx \sin nx = \frac{1}{2} (\cos(m-n)x - \cos(m+n)x),$$

$$\cos mx \cos nx = \frac{1}{2} (\cos(m+n)x + \cos(m-n)x)$$

trigonometrik formulalar yordamida topiladi.

Misol

$$\begin{aligned} \int \cos 3x \cdot \cos 5x dx &= \frac{1}{2} \int (\cos 8x + \cos 2x) dx = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{8} \sin 8x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) + C = \frac{1}{16} (\sin 8x + 4 \sin 2x) + C. \end{aligned}$$

Amaliy mashg‘ulotda yechiladigan misollar.

Berilgan aniqmas integrallarni toping

$$1. \int \frac{1}{3\sin^2 x + 5\cos^2 x} dx (Jabol. \frac{1}{\sqrt{15}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}\operatorname{tg}x}{\sqrt{5}} + c)$$

$$2. \int \frac{1}{3+5\cos x} dx (Jabol. \frac{1}{4} \ln \left| \frac{2+\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{2-\operatorname{tg} \frac{x}{2}} \right| + c)$$

$$3. \int \frac{1}{3\sin^2 x + 3\sin x \cos x + \cos^2 x} dx (Jabol. \frac{1}{\sqrt{13}} \ln \left| \frac{\frac{1}{2}\operatorname{tg}x + 3 - \sqrt{3}}{2\operatorname{tg}x + 3 + \sqrt{3}} \right| + c)$$

$$4. \int \sin^4 3x dx (Jabol. \frac{3}{8}x - \frac{1}{2}\sin 6x + \frac{1}{96}\sin 12x + c)$$

$$5. \int \frac{\cos^4 x + \sin^4 x}{\cos^2 x - \sin^2 x} dx (Jabol. \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1+\operatorname{tg}x}{1-\operatorname{tg}x} \right| + \frac{1}{2}\sin x \cos x + c)$$

$$6. \int \frac{1}{\cos x \sin^3 x} dx (Jabol. \ln |\operatorname{tg}x| - \frac{1}{2\sin^2 x} + c)$$

$$7. \int \cos^3 x \sin^{10} x dx (Jabol. \frac{\cos^{11} x}{11} - \frac{\cos^{13} x}{13} + c)$$

$$8. \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x + 1} dx (Jabol. \sqrt{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg}x}{\sqrt{2}} \right) - x + c)$$

Mustaqil yechish uchun misollar.

Berilgan aniqmas integrallarni toping.

$$1. \int \frac{1}{4-5\sin x} dx (Jabol. \frac{1}{3} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 2}{2\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 1} \right| + c)$$

$$2. \int \frac{\sin x}{\sin x + 1} dx (Jabol. \frac{2}{1+\operatorname{tg} \frac{x}{2}} + x + c)$$

$$3. \int \frac{\cos 2x}{\sqrt{3+4\sin 2x}} dx (Jabol. \frac{1}{2} \sqrt{3+4\sin 2x} + c)$$

$$4. \int \frac{1}{8-4\sin x + 5\cos^2 x} dx (Jabol. \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 5}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 3} \right| + c)$$

1.8. Giperbolik funksiyalarni integrallash

Giperbolik funksiyalarni integrallash trigonometrik funksiyalarni integrallash kabi amalga oshiriladi. Bunda giperbolik funksiyalar uchun o'rinni bo'ladigan quyidagi formulalardan foydalilanildi:

$$ch^2 x - sh^2 x = 1, \quad 2shx \cdot chx = sh2x, \quad ch^2 x = \frac{ch2x + 1}{2}, \quad ch2x =$$

$$sh^2 x = \frac{ch2x - 1}{2}, \quad 1 - th^2 x = \frac{1}{ch^2 x}, \quad cth^2 x - 1 = \frac{1}{sh^2 x} = ch^2 x + shx$$

$$shx = \frac{2th \frac{x}{2}}{2}, \quad chx = \frac{1 + th^2 \frac{x}{2}}{2}.$$

$$1 - th^2 \frac{x}{2} \quad 1 - th^2 \frac{x}{2}$$

Misollar

$$1. \int \frac{dx}{shx} = \int \frac{dx}{\frac{2sh \frac{x}{2} ch \frac{x}{2}}{2}} = \int \frac{1}{th \frac{x}{2}} \cdot \frac{2}{ch^2 \frac{x}{2}} dx = \int \frac{d \left(th \frac{x}{2} \right)}{th \frac{x}{2}} = \ln \left| th \frac{x}{2} \right| + C.$$

$$2. \int \frac{dx}{ch^4 x} = \int \frac{1}{ch^2 x} \cdot \frac{dx}{ch^2 x} = \int (1 - th^2 x) d(thx) = thx - \frac{1}{3} th^3 x + C.$$

$$3. \int th^3 x dx = \int thx \cdot th^2 x dx = \int thx \left(1 - \frac{1}{ch^2 x} \right) dx = \int thx dx - \int thx d(thx) = \\ = \int \frac{shx dx}{chx} - \frac{1}{2} th^2 x = \int \frac{d(chx)}{chx} - \frac{1}{2} th^2 x = \ln |chx| - \frac{1}{2} th^2 x + C.$$

$$4. \int \frac{dx}{3chx + 2shx} \text{ integralni hisoblashda } th \frac{x}{2} = t \text{ belgilash kiritamiz.}$$

$dx = \frac{2dt}{1-t^2}$, $shx = \frac{2t}{1-t^2}$, $chx = \frac{1+t^2}{1-t^2}$ o'rniga o'yishlar yordamida topamiz:

$$\int \frac{dx}{3chx + 2shx} = \int \frac{\frac{2dt}{1-t^2}}{3 \cdot \frac{1+t^2}{1-t^2} + 2 \cdot \frac{2t}{1-t^2}} = \frac{2}{3} \int \frac{dt}{t^2 + \frac{4}{3}t + 1} =$$

$$= \frac{2}{3} \int \frac{d \left(t + \frac{2}{3} \right)}{\left(t + \frac{2}{3} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{5}}{3} \right)^2} = \frac{2}{\sqrt{5}} \arctg \left(\frac{3t+2}{\sqrt{5}} \right) + C = \frac{2}{\sqrt{5}} \arctg \left(\frac{3th \frac{x}{2} + 2}{\sqrt{5}} \right) + C.$$

Giberbolik funksiyalarni o'z ichiga olgan integrallarni $R(e^x)$ ratsional funksiyaning integraliga keltirib topish mumkin. Bunda $\int R(e^x)dx$ ko'rinishdagi integrallar

$e^x = t$ o'rniga qo'yish yordamida ratsionallashtiriladi.

Misollar

$$1. \int \frac{dx}{chx} = \int \frac{2dx}{e^x + e^{-x}} = 2 \int \frac{e^x dx}{e^{2x} + 1} = (e^x = t, e^x dx = dt) = 2 \int \frac{dt}{t^2 + 1} = 2 \operatorname{arg} \operatorname{tg} t + C = 2 \operatorname{arctg} e^x + C.$$

$$2. \int \frac{2e^x - 1}{e^{2x} - e^x - 2} dx = \left(e^x = t, dx = \frac{dt}{t} \right) = \int \frac{2t - 1}{t(t^2 - t - 2)} dt = \int \frac{2t - 1}{t(t+1)(t-2)} dt.$$

Ratsional kasrni sodda kasrlarga yoyamiz:

$$\frac{2t - 1}{t(t+1)(t-2)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t+1} + \frac{C}{t-2}.$$

Yoyilmaning koeffitsiyentlarini topamiz:

$$2t - 1 = A(t^2 - t - 2) + B(t^2 - 2t) + C(t^2 + t).$$

Bundan

$$\begin{cases} t^2 : A + B + C = 0, \\ t^1 : -A - 2B + C = 2, \\ x^0 : -2A = -1. \end{cases}$$

$$\text{yoki } A = \frac{1}{2}, B = -1, C = \frac{1}{2}.$$

Shunday qilib,

$$\begin{aligned} \int \frac{2e^x - 1}{e^{2x} - e^x - 2} dx &= \int \frac{2t - 1}{t(t+1)(t-2)} dt = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} - \int \frac{dt}{t+1} + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t-2} = \\ &= \frac{1}{2} \ln t - \ln(t+1) + \frac{1}{2} \ln(t-2) + C = \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{|t(t-2)|}{(t+1)^2} + C = \frac{1}{2} \ln \frac{|e^x(e^x - 2)|}{(e^x + 1)^2} + C. \end{aligned}$$

1.9. Irratsional ifodalarni integrallash

Irratsional ifodalarni o'z ichiga olgan ayrim integrallashni ko'rib chiqamiz.

$$1. \int R\left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m_1}{n_1}}, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m_2}{n_2}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m_t}{n_t}}\right) dx \quad \text{ko'rinishidagi}$$

integrallar

$\int R\left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m_1}{n_1}}, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m_2}{n_2}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m_k}{n_k}}\right) dx$ (R -ratsional funksiya,

$m_1, n_1, m_2, n_2, \dots, m_k, n_k$, - butun sonlar) ko‘rinishdagi integrallar $\frac{ax+b}{cx+d} = t'$ o‘rniga qo‘ish yordamida ratsional funksiyaning integraliga keltiriladi, bunda $s = EKUK(n_1, n_2, \dots, n_k)$.

Misollar

1. $\int \frac{x^2 + \sqrt[3]{1+x}}{\sqrt{1+x}} dx$ integralni topamiz. Bunda $EKUK(2,3) = 6$.

$1+x = t^6$ deymiz.

U holda

$$\sqrt{1+x} = t^3, \quad \sqrt[3]{1+x} = t^2, \quad dx = 6t^5 dt.$$

Demak,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + \sqrt[3]{1+x}}{\sqrt{1+x}} dx &= \int \frac{(t^6 - 1)^2 + t^2}{t^3} \cdot 6t^5 dt = 6 \int t^2(t^{12} - 2t^6 + t^2 + 1) dt = \\ &= 6 \left(\frac{t^{15}}{15} - 2 \frac{t^9}{9} + \frac{t^5}{5} + \frac{t^3}{3} \right) + C = \frac{2t^3}{15}(3t^{12} - 10t^6 + 9t^2 + 15) + C = \\ &= \frac{2\sqrt{1+x}}{15} (3(1+x)^2 - 10(1+x) + 9\sqrt[3]{1+x} + 15) + C. \end{aligned}$$

2. $\int \frac{4x^2 + \sqrt[3]{2x+1}}{\sqrt{2x+1}} dx$ integralni topamiz. Bunda $EKUK(2,3) = 6$.

$2x+1 = t^6$ deymiz.

U holda

$$\sqrt{2x+1} = t^3, \quad \sqrt[3]{2x+1} = t^2, \quad dx = 3t^5 dt.$$

Demak,

$$\begin{aligned} \int \frac{4x^2 + \sqrt[3]{2x+1}}{\sqrt{2x+1}} dx &= \int \frac{(t^6 - 1)^2 + t^2}{t^3} \cdot 3t^5 dt = 3 \int t^2(t^{12} - 2t^6 + t^2 + 1) dt = \\ &= 3 \left(\frac{t^{15}}{15} - 2 \frac{t^9}{9} + \frac{t^5}{5} + \frac{t^3}{3} \right) + C = \frac{t^3}{15}(3t^{12} - 10t^6 + 9t^2 + 15) + C = \\ &= \frac{\sqrt{2x+1}}{15} (12x^2 - 8x + 9\sqrt[3]{2x+1} + 8) + C. \end{aligned}$$

2. $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$ ko‘rinishidagi integrallar

$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$ ko‘rinishidagi integrallar Eylerning uchta o‘rniga qo‘yichi orqali ratsional funksiyalardan olingan integrallarga keltiriladi:

a) $a > 0$ bo'lganida $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t \pm \sqrt{ax}$ almashtirish orqali integral ostidagi funksiya ratsionallashtiriladi (Eylerning birinchi o'rniqa qo'yishi);

b) $c > 0$ bo'lganida $\sqrt{ax^2 + bx + c} = tx \pm \sqrt{c}$ almashtirish yordamida integral ostidagi funksiya ratsionallashtiriladi (Eylerning ikkinchi o'rniqa qo'yishi);

c) $ax^2 + bx + c$ kvadrat uchhad $a(x - x_1)(x - x_2)$ ko'rinishda ko'paytuvchilarga ajralganida integral ostidagi funksiya $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - x_1)$ almashtirish bilan ratsionallashtiriladi (Eylerning uchinchi o'rniqa qo'yishi).

Misollar

1. $\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2}}$ integralni topamiz. Bunda $a > 0$. Shu sababli

$$\sqrt{x^2 + 2x + 2} = t - x \text{ o'rniqa qo'yish bajaramiz.}$$

U holda

$$x^2 + 2x + 2 = t^2 - 2tx + x^2, 2x + 2tx = t^2 - 2.$$

Bundan

$$x = \frac{t^2 - 2}{2(1+t)}, dx = \frac{t^2 + 2t + 2}{2(1+t)^2}, 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2} = 1 + t - \frac{t^2 - 2}{2(1+t)} = \frac{t^2 + 4t + 4}{2(1+t)}.$$

Topilganlarni berilgan integralga qo'yamiz:

$$\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2}} = \int \frac{2(1+t)(t^2 + 2t + 2)}{(t^2 + 4t + 4)2(1+t)^2} dt = \int \frac{t^2 + 2t + 2}{(1+t)(2+t)^2} dt.$$

Integral ostidagi to'g'ri kasrni sodda kasrlarga yoyamiz:

$$\frac{t^2 + 2t + 2}{(1+t)(2+t)^2} = \frac{A}{1+t} + \frac{B}{2+t} + \frac{C}{(2+t)^2}.$$

Koeffitsiyentlarni tenglashtirish usulini qo'llaymiz:
 $A=1, B=0, C=-2$.

Bundan

$$\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2}} = \int \frac{dt}{1+t} - 2 \int \frac{dt}{(2+t)^2} = \ln|1+t| + \frac{2}{2+t} + C.$$

x o'zgaruvchiga qaytamiz:

$$\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 + 2x + 2}| + \frac{2}{x+2+\sqrt{x^2 + 2x + 2}} + C.$$

2. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + x + 1}}$ integralda $c > 0$. Shu sababli $\sqrt{x^2 + x + 1} = tx + 1$

deymiz.

U holda

$$t = \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - 1}{x} \text{ va } x^2 + x + 1 = t^2 x^2 + 2xt + 1, \quad x - xt^2 = 2t - 1.$$

Bundan

$$x = \frac{2t-1}{1-t^2}, \quad dx = 2 \frac{t^2 - t + 1}{(1-t^2)^2} dt, \quad \sqrt{x^2 + x + 1} = \frac{t^2 - t + 1}{1-t^2}.$$

Topilganlarni berilgan integralga qo'yamiz:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + x + 1}} = \int \left(\frac{1-t^2}{2t-1} \right) \cdot \left(\frac{1-t^2}{t^2 - t + 1} \right) \cdot \left(2 \frac{t^2 - t + 1}{(1-t^2)^2} dt \right) = \int \frac{2dt}{2t-1}.$$

Bundan

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + x + 1}} \int \frac{2dt}{2t-1} = \ln |2t-1| + C = \ln \left| \frac{2\sqrt{x^2 + x + 1} - 2 - x}{x} \right| + C.$$

3. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 3x + 2}}$ integralni topamiz. Bunda

$x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$ bo'lgani uchun $\sqrt{(x-1)(x-2)} = (x-1)t$ o'rniغا qo'yish bajaramiz.

U holda

$$(x-1)(x-2) = (x-1)^2 t^2, \quad t = \sqrt{\frac{x-2}{x-1}}.$$

Bundan

$$x = \frac{t^2 - 2}{t^2 - 1}, \quad dx = \frac{2tdt}{(t^2 - 1)^2}, \quad \sqrt{x^2 - 3x + 2} = \left(\frac{t^2 - 2}{t^2 - 1} - 1 \right) t = -\frac{t}{t^2 - 1}.$$

Topilganlarni berilgan integralga qo'yamiz:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 3x + 2}} = \int \frac{-(t^2 - 1)2tdt}{(t^2 - 1)^2 t} = -2 \int \frac{dt}{t^2 - 1} =$$

$$= -\ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C = -\ln \left| \frac{1-2t+t^2}{t^2-1} \right| + C$$

Eski o'zgaruvchiga qaytami:

$$\begin{aligned} & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 3x + 2}} \\ &= -\ln \left| \frac{1-2\sqrt{\frac{x-2}{x-1}} + \frac{x-2}{x-1}}{\frac{x-2}{x-1} - 1} \right| + C = -\ln |3 - 2x + 2\sqrt{x^2 - 3x + 2}| + C. \end{aligned}$$

Eyler o'rniغا qo'yishlari ko'p integrallarda murakkab hisoblashlarga olib kelishi mumkin. Bunday hollarda integrallashning quyidagi usullaridan foydalaniladi.

$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})dx$ ko'rinishidagi integrallarni hisoblashning boshqa bir usuli kvadrat uchhaddan to'la kvadrat ajratish usulidir. Bu usulda $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})dx$ ko'rinishidagi integrallar kvadrat uchhaddan to'la kvadrat ajratish yo'li bilan ushbu integrallardan biriga keltiriladi:

a) agar $a > 0$ va $b^2 - 4ac < 0$ bo'lsa, u holda $\int R(t, \sqrt{m^2 + n^2 t^2})dt$, bu yerda

$$n^2 = a, m^2 = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}, t = x + \frac{b}{2a};$$

b) agar $a > 0$ va $b^2 - 4ac > 0$ bo'lsa, u holda $\int R(t, \sqrt{n^2 t^2 - m^2})dt$, bu yerda $n^2 = a, m^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a}, t = x + \frac{b}{2a}$;

c) agar $a < 0$ va $b^2 - 4ac > 0$ bo'lsa, u holda $\int R(t, \sqrt{m^2 - n^2 t^2})dt$, bu yerda

$$n^2 = -a, m^2 = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}, t = x + \frac{b}{2a}.$$

Mos ravishda $t = \frac{m}{n}tgz, t = \frac{m}{n \sin z}, t = \frac{m}{n} \sin z$ o'rniga qo'yishlar orqali oxirgi integrallar $\int R(\sin z, \cos z)dz$ ko'rinishga keltiriladi.

Misol

$\int \sqrt{5 + 4x - x^2} dx$ integralni topamiz. Buning uchun kvadrat uchhaddan to'la kvadrat ajratamiz, yangi t -zgaruvchi kiritamiz va trigonometrik o'rniga qo'yishdan foydalanib, topamiz:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{5 + 4x - x^2} dx &= \int \sqrt{9 - (x - 2)^2} dx = \left| \begin{array}{l} x - 2 = t, \\ dx = dt \end{array} \right| = \int \sqrt{9 - t^2} dt = \\ &= \left| \begin{array}{l} t = 3 \sin z, \\ dt = \cos z dz \end{array} \right| = \int \sqrt{9 - 9 \sin^2 z} 3 \cos z dz = \int 9 \cos^2 z dz = \\ &= \frac{9}{2} \int (1 + \cos 2z) dz = \frac{9}{2} \left(z + \frac{\sin 2z}{2} \right) + C = \frac{9}{2} (z + \sin z \sqrt{1 - \sin^2 z}) + C = \\ &= \left| z = \arcsin \frac{t}{3} \right| = \frac{9}{2} \left(\arcsin \frac{t}{3} + \frac{t}{3} \sqrt{1 - \frac{t^2}{9}} \right) + C = \frac{9}{2} \arcsin \frac{t}{3} + \frac{t}{2} \sqrt{9 - t^2} + C = \\ &= \frac{9}{2} \arcsin \frac{x-2}{3} + \frac{1}{2}(x-2)\sqrt{5+4x-x^2} + C. \end{aligned}$$

Bundan tashqari $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})dx$ ko'rinishidagi integrallarni hisoblashda quyidagi usullarni qo'llash mumkin:

a) $\int \frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$ ko'rinishidagi integrallar, bu yerda $P_n(x)$ n - darajali ko'phad:

1) $n=0$ da $\int \frac{Adx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$ bo'ladi; bu integrallar $a > 0$ bo'lganda jadvaldagi 14- integralga, $a < 0$ bo'lganda jadvaldagi 13- integralga keltiriladi;

2) $n=1$ da $\int \frac{(Ax + B)dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$ bo'ladi; bu integrallar suratda kvadrat uchhadning hosilasini ajratish natijasida ikkita, biri jadvaldagi 1-integralga va ikinchisi 1) banddag'i integralga keltiriladi;

3) $n \geq 2$ bo'lganda berilgan integraldan keltirish formulalari yordamida quyidagi ko'rinishdagi ifoda hosil qilinadi:

$$\int \frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = Q_{n-1}(x)\sqrt{ax^2 + bx + c} + M \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}},$$

bu yerda $Q_{n-1}(x)$ - koeffitsiyentlari noma'lum bo'lgan $n-1$ - darajali ko'phad,

M - qandaydir o'zgarmas son. Bunda ko'phadning noma'lum koeffitsientlari va M soni oxirgi tenglikni differensiallash hamda x ning chap va o'ng tomonidagi bir xil darajalari oldidagi koeffitsientlarni tenglashtirish orqali topiladi.

$$b) \int \frac{dx}{(\alpha x + \beta)\sqrt{ax^2 + bx + c}} \quad \text{ko'rinishidagi integral} \quad \alpha x + \beta = \frac{1}{t}$$

almash tirish yordamida 1) banddag'i integralga keltiriladi;

$$c) \int \frac{dx}{(\alpha x + \beta)^n \sqrt{ax^2 + bx + c}} \quad (n \in Z, n > 1) \quad \text{ko'rinishidagi integrallar}$$

$\alpha x + \beta = \frac{1}{t}$ o'rniغا qo'yish orqali 3) banddag'i integralga keltiriladi.

Misol

$$\int \frac{dx}{(x-2)^3 \sqrt{x^2 - 4x + 5}} \quad \text{integralni topamiz. Bunda } x-2 = \frac{1}{t} \text{ deymiz. U}$$

$$\text{holda } dx = -\frac{dt}{t^2}, \quad x^2 - 4x + 5 = \frac{1}{t^2} + 1.$$

Bundan

$$\int \frac{dx}{(x-2)^3 \sqrt{x^2 - 4x + 5}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t^3} \sqrt{\frac{1}{t^2} + 1}} = -\int \frac{t^2 dt}{\sqrt{t^2 + 1}}.$$

b) banddag'i integral hosil qilindi. $n=2$ bo'lgani uchun

$$\int \frac{t^2 dt}{\sqrt{t^2 + 1}} = (At + B)\sqrt{t^2 + 1} + M \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + 1}}.$$

Tenglikning har ikkala tomonini differensiallaymiz:

$$\frac{t^2}{\sqrt{t^2 + 1}} = A\sqrt{1+t^2} + \frac{(At+B)t}{\sqrt{t^2 + 1}} + \frac{M}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

yoki

$$t^2 = A(1+t^2) + (At+B)t + M.$$

x ning bir xil darajalari oldidagi koefitsientlarni tenglab, topamiz:

$$A = \frac{1}{2}, \quad b = 0, \quad M = -\frac{1}{2}.$$

U holda

$$\int \frac{t^2 dt}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{t\sqrt{1+t^2}}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{t\sqrt{1+t^2}}{2} - \frac{1}{2} \ln|t + \sqrt{1+t^2}| + C.$$

Eski o'zgaruvchiga qaytamiz:

$$\int \frac{dx}{(x-2)^3 \sqrt{x^2 - 4x + 5}} = -\frac{\sqrt{x^2 - 4x + 5}}{2(x-2)^2} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sqrt{x^2 - 4x + 5}}{x-2} \right| + C.$$

3. $\int x^m (a+bx^n)^r dx$ binominal differensial integrali $\int x^m (a+bx^n)^r dx$ ko'rinishidagi integral binominal differensial integrali deyiladi. Bunda integral ostidagi ifoda $x^m (a+bx^n)^r$ ga binominal differensial deyiladi, bu yerda m, n, p – ratsional sonlar

Binominal differensial integrali uchta holdagina ratsional funksiyalarni integrallashga keltiriladi:

a) p butun son bo'lganida integral $x = t^s$ (bu yerda $s = EKUK(m, n)$) o'rniga qo'yish orqali ratsionallaشتiriladi;

b) $\frac{m+1}{n}$ butun son bo'lganida integral $a+bx^n = t^s$ (bu yerda $s = p$ sonning maxraji) o'rniga qo'yish yordamida ratsionallaشتiriladi;

c) $\frac{m+1}{n} + p$ butun son bo'lganida integralda $a+bx^n = t^s x^n$ (bu yerda $s = p$ sonning maxraji) almashtirish bajariladi.

Agar yuqorida keltirilgan shartlar bajarilmasa binominal differensial elementar funksiyalar orqali ifodalanmaydi, ya'ni integrallanmaydi.

Masalan, $\int \sqrt{1+x^3} dx$ integralning integral osti funksiyasi binominal differensial: $m=0, n=3, p=\frac{1}{2}$. Bunda

$p=\frac{1}{2}, \frac{m+1}{n}=\frac{1}{3}, \frac{m+1}{n}+p=\frac{5}{6}$ sonlardan birortasi butun son emas. Shu sababli bu integral elementar funksiyalar orqali ifodalanmaydi.

Misol

$$\int \frac{dx}{x^3 \sqrt{1+x^4}} \text{ integralni topamiz. Shartga ko'ra } m=-3, n=4, p=-\frac{1}{2},$$

$$\frac{m+1}{n}+p=\frac{-3+1}{4}-\frac{1}{2}=-1.$$

U holda

$$1+x^4=t^2 x^4, x=(t^2-1)^{\frac{1}{4}}, dx=-\frac{1}{2} t(t^2-1)^{\frac{5}{4}}, t=\frac{\sqrt{1+x^4}}{x^2}.$$

Demak,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^3 \sqrt{1+x^4}} &= \int x^{-3} (1+x^4)^{-\frac{1}{4}} dx = \\ &= -\frac{1}{2} \int (t^2-1)^{\frac{1}{4}(-3)} (t^2)^{-\frac{1}{2}} \left((t^2-1)^{\frac{1}{4}} \right)^{-\frac{1}{2}} t(t^2-1)^{-\frac{5}{4}} dt = \\ &= -\frac{1}{2} \int (t^2-1)^{\frac{3}{4}-\frac{5}{4}} \cdot t^{-1+1} dt = -\frac{1}{2} \int dt = -\frac{1}{2} t + C = -\frac{\sqrt{1+x^4}}{2x^2} + C. \end{aligned}$$

Amaliy mashg'ulotda yechiladigan misollar.

Berilgan aniqmas integrallarni toping.

$$1. \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3+4}} dx \quad (\text{Javob. } \frac{4}{3} \sqrt[4]{x^3} - \frac{16}{3} \ln |\sqrt[4]{x^3} + 4| + c)$$

$$2. \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x^2-\sqrt{x}}} dx \quad (\text{Javob. } \frac{6}{5} \sqrt[5]{x^5} + \frac{12}{5} \sqrt[5]{x^5} + \frac{12}{5} \ln |\sqrt[5]{x^5} - 1| + c)$$

$$3. \int \frac{1}{3x-4\sqrt{x}} dx \quad (\text{Javob. } \frac{2}{3} \ln |\sqrt{x} + 4| + c)$$

$$4. \int \frac{1}{\sqrt{3x+4} + 2\sqrt[3]{3x+4}} dx \quad (\text{Javob. } \frac{4}{3} \left(\frac{1}{2} \sqrt{3x+4} - 2\sqrt[3]{3x+4} + 4 \ln(\sqrt[3]{3x+4} + 2) \right) + c)$$

$$5. \int \frac{1}{\sqrt{x-7\sqrt{x}}} dx \quad (\text{Javob. } 4(\frac{1}{2} \sqrt{x} + 7\sqrt[4]{x} + 49 \ln |\sqrt[4]{x} - 7| + c))$$

$$6. \int \frac{\sqrt{1-x} dx}{\sqrt{1+x} x} \quad (\text{Javob. } \frac{2}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \right| + 2 \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + c)$$

Mustaqil yechish uchun misollar.

Berilgan aniqmas integrallarni toping.

$$1. \int x^5 \sqrt[3]{(1+x^3)^2} dx \quad (\text{Javob. } \frac{1}{8} \sqrt[3]{(1+x^3)^8} - \frac{1}{5} \sqrt[3]{(1+x^3)^5} + c)$$

$$2. \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x^3+1}} dx \quad (\text{Javob. } \frac{4}{3} (\sqrt[3]{x^3} - \ln|\sqrt[3]{x^3+1}|) + c)$$

$$3. \int \frac{x^3}{\sqrt{x^2+2}} dx \quad (\text{Javob. } \frac{(x^2-4)\sqrt{x^2+2}}{3} + c)$$

$$4. \int \frac{\sqrt{x^3}-\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}} dx \quad (\text{Javob. } \frac{2}{9} \sqrt[3]{x^9} - \frac{12}{13} \sqrt[3]{x^{13}} + c)$$

$$5. \int \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}} dx \quad (\text{Javob. } 6(\sqrt[3]{x} - \frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{\sqrt{x}}{3} - \ln(1+\sqrt[3]{x}) + c))$$

$$6. \int \frac{4x}{\sqrt[3]{(3x-8)^2} - 2\sqrt[3]{3x-8} + 4} dx \quad (\text{Javob. } \frac{1}{3} (\sqrt[3]{(3x-8)^4} + \frac{8}{9}(3x-8) + c))$$

1.10. Boshlangich funksiyasi elementar funksiyalarning chekli yigindisi ko‘rinishida tasvirlanmaydigan funksiyalar

Biz integrallashning elementar funksiyalarning keng sinfini qamrab olgan muhim usullarini ko‘rib chiqdik. Bu usullar ko‘pchilik hollarda aniqmas integralni topish, ya’ni boshlang‘ich funksiyalarni aniqlash imkonini beradi.

Ma’lumki, har qanday uzlusiz funksiya boshlang‘ich funksiyaga ega bo‘ladi. Agar biror $f(x)$ elementar funksiyaning boshlang‘ich funksiyasi ham elementar funksiya bo‘lsa, u holda $\int f(x)dx$ integral elementar funksiyalarda olinadi deyiladi. Bunda integral elementar funksiyalar orqali ifodalanadi (yoki integralni topsa bo‘ladi). Agar integral elementar funksiyalar orqali ifodalanmasa, u holda $\int f(x)dx$ integral elementar funksiyalarda olinmaydi (yoki integralni topib bo‘lmaydi) deyiladi.

Masalan, $\int \sqrt{x} \cdot \cos x dx$ integral elementar funksiyalarda olinmaydi, chunki hosilasi $\sqrt{x} \cdot \cos x$ ga teng bo‘lgan elementar funksiya mavjud emas. Amaliy tatbiqda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan elementar funksiyalarda olinmaydigan integrallarga misollar keltiramiz:

$\int e^{-x^2} dx$ – Puasson integrali (ehtimollar nazariyasi);

$\int \frac{dx}{\ln x}$ – integralli logarifm (sonlar nazariyasi);

$\int \cos x^2 dx$, $\int \sin x^2 dx$ – Frenel integrallari (fizika);

$\int \frac{\sin x}{x} dx$, $\int \frac{\cos x}{x} dx$ – integralli sinus va kosinus;

$\int \frac{e^x}{x} dx$ – integralli ko‘rsatkichli funksiya.

Elementar funksiyalarda ifolanmasada, e^{-x^2} , $\frac{1}{\ln x}$, $\cos x^2$, $\sin x^2$, $\frac{\sin x}{x}$,

$\frac{\cos x}{x}$, $\frac{e^x}{x}$

funksiyalarning boshlang‘ich funksiyalari yetarlicha o‘rganilgan, ularning qiymatlari uchun x argumentning turli qiymatlarida mufassal jadvallar tuzilgan.

II BOB. ANIQ INTEGRAL


2.1. Aniq integral tushunchasiga olib keluvchi masalalar. Egri chiziqli trapetsiyaning yuzasni hisoblash masalasi

Aniq integral iqtisodiyotda va texnikaning bir qancha masalalarini yechishda, xususan, har xil geometrik va fizik kattaliklarni hisoblashda keng qo'llaniladi.

Tekislikda Oxy to'g'ri burchakli dekart koordinatalar sistemasi kiritilgan va $[a; b], b > a$ kesmada uzliksiz va manfiy bo'lmafan $y = f(x)$, ya'ni $f(x) \geq 0$ funksiya aniqlangan bo'lsin.

Yuqoridan $y = f(x)$ funksiya grafigining yoyi bilan, quyidan Ox o'qning $[a; b]$ kesmasi bilan, yon tomonlaridan $x = a, 0 \leq y \leq f(a)$ va

$x = b, 0 \leq y \leq f(b)$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan $aAbb$ figuraga egri chiziqli trapetsiya deyiladi.
(2-shakl)



$aAbb$ egri chiziqli trapetsiyaning S yuzasiga ta'rif beramiz. $[a; b]$ kesmani n ta kichik kesmalarga bo'lamic: bo'linish nuqtalarining abssissalarini $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{i-1} < x_i < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ bilan belgilaymiz.
 $\{x_i\} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ bo'lish nuqtalari

to'plamini $[a; b]$ kesmanining bo'linishi deymiz. x_i bo'linish nuqtalari orqali Oy o'qqa parallel $x = x_i$ to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Bu to'g'ri chiziqlar $aAbb$ trapetsiyani asoslari $[x_{i-1}; x_i]$ bo'lgan n ta bo'lakka bo'ladi. $aAbb$ trapet-siyaning S yuzasi n ta tasma yuzalarining yig'indisiga teng bo'ladi. n yetarlicha katta va barcha $[x_{i-1}; x_i]$ kesmalar kichik bo'lganida har bir n ta tasmaning yuzasini hisoblash oson bo'lgan mos to'g'ri to'trburchakning yuzasi bilan almashtirish mumkin bo'ladi. Har bir $[x_{i-1}; x_i]$ kesmada biror ξ_i nuqtani tanlaymiz, $f(x)$ funksiyaning bu nuqtadagi qiymati $f(\xi_i)$ ni hisoblaymiz va uni to'g'ri to'rtburchakning balandligi deb qabul qilamiz. $[x_{i-1}; x_i]$ kesma kichik bo'lganida $f(x)$ uzliksiz funksiya bu kesmada kichik o'zgarishga ega bo'ladi. Shu sababli bu kesmalarda funksiyani

o'zgarmas va taqriban $f(\xi_i)$ ga teng deyish mumkin. Bitta tasmaning yuzasi $f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$ ga teng bo'lganidan $aABb$ egri chiziqli trapetsiyaning S yuzasi taqriban S_n teng bo'ladi:

$$S \approx S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1} \quad (2.1)$$

(2.1) taqribiy qiymat $d = \max\{x_i - x_{i-1}\}, (i=\overline{1,n})$ kattalik qancha kichik bo'lsa shuncha aniq bo'ladi. d kattalikka $\{x_i\}$ bo'linishning diametri deyiladi. Bunda $n \rightarrow \infty$ da $d \rightarrow 0$.

Shunday qilib, egri chiziqli trapetsiyining S yuzasi deb, S_n to'g'ri to'rtburchaklar yuzasining bo'linish diametri nolga intilgandagi limitiga aytildi, ya'ni

$$S = \lim_{d \rightarrow 0} S_n = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i. \quad (2.2)$$

Demak, egri chiziqli trapetsiyining yuzasini hisoblash masalasi (2.2) ko'rinishdagi limitni hisoblashga keltiriladi.

Bosib o'tilgan yo'l masalasi

Agar moddiy nuqtaning harakat qonuni $s = f(t)$ (bunda t - vaqt, s - bosib o'tilgan yo'l) tenglama bilan berilgan bo'lsa $f(t)$ funksiyining $f'(t)$ hosilasi material nuqtaning berilgan vaqt dagi harakat tezligi v ga teng, ya'ni $v = f'(t)$ bo'ladi Fizikada quyidagi teskari masalani tez-tez yechishga to'g'ri keladi. Material nuqta to'g'ri chiziq bo'y lab v tezlik bilan harakat qilayotgan bo'lsin. v tezlik t vaqtning uzlusiz funksiyasi bo'lsin deymiz. Material nuqta vaqtning $t=a$ dan $t=b$ gacha bo'lgan biror $[a,b]$ oraliq'ida bosib o'tgan yo'l s ni topamiz. $[a,b]$ kesmani $a = t_0 < t_1 < \dots < t_{i-1} < t_i < \dots < t_{n-1} < t_n = b$ nuqtalar bilan vaqtning n ta yetarlicha kichik oraliqlariga bo'lamiz. Vaqtning kichik $[t_{i-1}; t_i]$ oraliq'ida $v(t)$ tezlik deyarli o'zgarmaydi va uni bu vaqt oraliq'ida o'zgarmas va $v(\xi_i)$ ($\xi_i \in [t_{i-1}; t_i]$) ga taqriban teng deyish mumkin. Bunda harakat $[t_{i-1}; t_i]$ kesmada tekis bo'ladi. U holda bosib o'tilgan yo'l bu vaqt oraliq'ida $v(\xi_i)(t_i - t_{i-1})$ ga, $[a,b]$ vaqt oraliq'ida $s \approx s_n = \sum_{i=1}^n v(\xi_i) \Delta t_i, \Delta t_i = t_i - t_{i-1}$ ga teng bo'ladi. Bu taqribiy qiymat $d = \max \Delta t_i, (i=\overline{1,n})$ kattalik qancha kichik bo'lsa shuncha aniq bo'ladi.

Shunday qilib, s bosib o'tilgan yo'l deb, s_n yig'indining $d \rightarrow 0$ dagi limitiga aytildi, ya'ni

$$s = \lim_{d \rightarrow 0} s_n = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n v(\xi_i) \Delta t_i. \quad (2.3)$$

Demak, bosib o'tilgan yo'lni hisoblash masalasi (2.3) ko'rinishdagi limitni hisoblashga keltiriladi.

Qaralgan har ikki masalada biror ko'rinishdagi yig'indining limitini topishga olib keluvchi bir xil usul qo'llanildi. Tabiatda bilim va texnikaning bir qancha masalalari yuqoridagi kabi yig'indining limitini topishga keltiriladi. Shu sababli (2.2) va (2.3) ifodalarni, aniq talqiniga qiziqmasdan, o'rganib chiqamiz.

2.2. Integral yig'indi va aniq integral

$y = f(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmada aniqlangan va uzliksiz bo'lsin. $[a; b]$ kesmani ixtiyoriy ravishda $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{i-1} < x_i < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ nuqtalar bilan n ta qismga bo'lamiz, bunda $\{x_i\}$ ga $[a; b]$ kesmaning bo'linishi, $d = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$, ($i = 1, n$) kattalikka bo'linish diametri deymiz.

Har bir $[x_{i-1}; x_i]$ qismiy kesmadan ixtiyoriy ξ_i nuqtani tanlaymiz va $f(x)$ funksiyaning bu nuqtadagi qiymati $f(\xi_i)$ ni hisoblaymiz, bunda ξ_i nuqtalarga belgilangan nuqtalar deymiz.

$f(\xi_i)$ qiymatni mos $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ uzunlikka ko'paytiramiz va barcha ko'paytmalarni qo'shamiz, ya'ni

$$w_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, \quad (2.4)$$

yig'indini tuzamiz. (2.4) yig'indiga $f(x)$ funksiya uchun $[a; b]$ kesmaning $\{x_i\}$ bo'linishidagi Rimann integral yig'indisi deyiladi.

$\{x_i\}$ bo'linishni maydalaymiz, ya'ni yangi bo'linish nuqtalarini qo'shamiz va yig'indining $d \rightarrow 0$ dagи limitini (agar u mavjud bo'lsa) topamiz.

w_n yig'indining $d \rightarrow 0$ dagи limiti tuzunchasini kiritamiz.

1-ta'rif. Agar $\forall \varepsilon > 0$ son uchun shunday $\delta > 0$ son topilsaki, $|I - w_n| < \varepsilon$ tengsizlik $[a; b]$ kesmaning diametri $d < \delta$ bo'lgan istalgan $\{x_i\}$ bo'linishida ξ_i belgilangan nuqtalarning tanlanishiga bog'liq bo'limgan holda bajarilsa, I soniga w_n Rimann integral yig'indisining limiti deyiladi $I = \lim_{d \rightarrow 0} w_n$ deb yoziladi.

2-ta'rif. Agar Riman integral yig'indisi $d \rightarrow 0$ da chekli limitga ega bo'lsa, u holda bu limitga $[a; b]$ kesmada $f(x)$ funksiyadan olingen aniq (bir karrali) integral (Riman integrali) deyiladi va $\int_a^b f(x)dx$ kabi belgilanadi.

Shunday qilib, ta'rifga ko'ra,

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, \quad (2.5)$$

bu yerda $f(x)$ - integral ostidagi funksiya, x - integrallash o'zgaruvchisi, a, b - integralning quyi va yuqori chegarasi, $[a; b]$ - integrallash sohasi (kesmasi) deyiladi.

$[a; b]$ kesmada $\int_a^b f(x)dx$ aniq integral mavjud bo'lsa, $y = f(x)$ funksiya shu kesmada integrallanuvchi (Riman bo'yicha integrallanuvchi) deyiladi.

Izoh. Oliy matematika kursida bosha aniq integrallar qaralmagani sababli bundan keyin «Riman integrali» va «Riman bo'yicha integrallanuvchi» iboralarini mos ravishda «integral» va «integrallanuvchi» deb yozamiz.

Keltirilgan ta'riflarda $a < b$ bo'lsin deb faraz qilindi. Aniq integral tushunchasini $a = b$ va $a > b$ bo'lgan hollar uchun umumlashtiramiz.

$a > b$ bo'lganida 2-ta'rifga ko'ra

$$\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx \quad (2.6)$$

bo'ladi. (2.6) tenglik integrallash chegaralari almashtirilganida aniq integralning ishorasi teskarisiga o'zgarishini bildiradi.

2-ta'rifga ko'ra $a = b$ bo'lganida

$$\int_a^a f(x)dx = 0 \quad (2.7)$$

bo'ladi. Bu tenglik bir xil chegaralari integrallashda aniq integralning nolga teng bo'lishini bildiradi.

(2.4) integral yig'indi berilgan funksiyaning argumenti qanday harf bilan belgilanishiga bog'liq bo'lmasani sababli, uning limiti va shuningdek aniq integral integrallash o'zgaruvchisining belgilanishiga bog'liq bo'lmaydi:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(z)dz.$$

Misol

$\int_0^1 x^2 dx$ integralni uning ta’rifidan foydalanib hisoblaymiz. [0;1]

kesmada $y = x^2$ funksiya uzlusiz. [0;1] kesmani $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_{i-1} < x_i < \dots < x_{n-1} < x_n = 1$ nuqtalar bilan uzunliklari $\Delta x_i = \frac{1}{n}$ ($i = 1, n$) bo‘lgan n ta teng bo‘lakka bo‘lamiz. Bunda $d = \frac{1}{n}$, ξ_i nuqta sifatida qismiy kesmalarning oxirlarini olamiz:

$$\xi_i = x_i = \frac{i}{n}.$$

Tegishli integral yig‘indini tuzamiz:

$$\begin{aligned} w_n &= \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \frac{i^2}{n^2} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} (1^2 + 2^2 + \dots + n^2) = \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}. \end{aligned}$$

Bundan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} = \frac{1}{3}.$$

Demak, ta’rifga ko‘ra

$$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \lim_{(n \rightarrow \infty)} w_n = \frac{1}{3}.$$

Endi ξ_i nuqta sifatida qismiy kesmalarning boshlarini olamiz:

$$\xi_i = x_{i-1} = \frac{i-1}{n}.$$

Bundan

$$w_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \frac{(i-1)^2}{n^2} \cdot \frac{1}{n} = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3} = \frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2}$$

yoki

$$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \lim_{(n \rightarrow \infty)} w_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2} = \frac{1}{3}.$$

Berilgan integralning qiymati [0;1] kesmani bo‘lish usuliga va bu kesmada ξ_i nuqtani tanlash usuliga bog‘liq emas va $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$.

Funksiya integrallanuvchi bo‘ladigan shartlarni keltiramiz.

1-teorema (funksiya integrallanuvchi bo‘lishining zaruriy sharti).

Agar $y = f(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmada integrallanuvchi bo‘lsa, u holda u bu kesmada chegaralangan bo‘ladi.

Izboti. $[a; b]$ kesmada integrallanuvchi $y = f(x)$ funksiya bu kesmada chegaralanmagan bo‘lsin deb faraz qilamiz. U holda bu

kesmaning istalgan $\{x_i\}$ bo'linishida $[x_{i-1}; x_i]$ kesmalarning hech bo'lmanida bittasida funksiya chegaralanmagan bo'ladi. Bu holda $\xi_i \in [x_{i-1}; x_i]$ nuqtani turli usullar bilan tanlash orqali $f(\xi_i)\Delta x$, ko'paytmani yetarlicha katta qilish mumkin. Demak, integral faqat $\xi_i \in [x_{i-1}; x_i]$ nuqtalarni tanlash hisobiga yig'indi yetartlicha katta bo'ladi va $d \rightarrow 0$ da hech bir limitga intilmaydi. Shu sababli $y = f(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmada integrallanuvchi bo'lmaydi. Olingan ziddiyatdan teoremaning isboti kelib chiqadi.

2-teorema. (funksiya integrallanuvchi bo'lishining yetarli sharti). $[a; b]$ kesmada uzlukziz bo'lgan funksiya bu kesmada integrallanuvchi bo'ladi.

Teoremani isbotsiz qabul qilamiz.

Funksianing uzlusizligi uning integrallanuvchi bo'lishini faqat yetarli sharti bo'ladi. Boshqacha aytganda $[a; b]$ kesmada uzelishga ega bo'lgan, ammo bu kesmada integrallanuvchi funksiyalar mavjud bo'lishi ham mumkin.

Shuningdek, funksiya integrallanuvchi bo'lishinngi kuchsizroq shartlarini ifodalovchi quyidagi teoremlar o'rinnli bo'ladi.

3-teorema. $[a; b]$ kesmada uzlukziz bo'lib, chekli sondagi birinchi tur uzelish nuqtalariga ega bo'lgan funksiya bu kesmada integrallanuvchi bo'ladi.

4-teorema. $[a; b]$ kesmada monoton funksiya bu kesmada integrallanuvchi bo'ladi.

2.3.Aniq integralning geometrik va mexanik ma'nolari

Egri chiziqli trapetsyaning yuzasi masalasiga qaytamiz. (2.2) tenglikning o'ng tomoni integral yig'indidan iborat. U holda (2.5) formuladan aniq integralning geometrik ma'nosi kelib chiqadi: agar $f(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmada integrallanuvchi va manfiy bo'limasa, u holda $[a; b]$ kesmada $f(x)$ funksiyadan olingan aniq integral $y = f(x) \geq 0$, $y = 0$, $x = a$, $x = b$ $a < b$ chiziqlar bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsyaning yuzasiga teng.

Misol

$\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} dx$ integralni uning geometrik ma'nosiga tayanib hisoblaymiz.

Bunda x ning -3 dan 3 gacha o‘zgarishida tenglamasi $y = \sqrt{9 - x^2}$ bo‘lgan chiziq $x^2 + y^2 = 9$ aylananing yuqori bo‘lagidan iborat bo‘ladi. Shu sababli $x = -3$, $x = 3$, $y = 0$, $y = \sqrt{9 - x^2}$ chiziqlar bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsiya $x^2 + y^2 = 9$ doiranining yuqori qismidan tashkil topadi. Uning yuzi $S = \frac{9\pi}{2}$ ga teng.

Demak,

$$\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} dx = \frac{9\pi}{2}.$$

Endi bosib o‘tilgan yo‘l masalasiga o‘tamiz. (2.3) tenglikning o‘ng tomoni integral yig‘indidan iborat bo‘lgani uchun (2.5) formuladan ushbu xulosaga kelamiz: agar $v(t)$ funksiya $[a; b]$, $a < b$ kesmada integrallanuvchi va manfiy bo‘lmasa, u holda $v(t)$ tezlikdan $[a; b]$ vaqt oralig‘ida olingan aniq integral material nuqtaning $t = a$ dan $t = b$ gacha vaqt oralig‘ida bosib o‘tgan yo‘liga teng.

Bu jumla aniq integralning mexanik ma’nosini anglatadi.

2.4. Aniq integralning xossalari

1°. Agar integral ostidagi funksiya birga teng bo‘lsa, u holda

$$\int_a^b dx = b - a$$

bo‘ladi.

Isboti. Aniq integralning ta’rifiga ko‘ra

$$\int_a^b dx = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n 1 \Delta x_i = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = \lim_{d \rightarrow 0} (b - a) = b - a.$$

2°. Ozgarmas ko‘paytuvchini aniq integral belgisidan tashqariga chiqarish mumkin, ya’ni

$$\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx, \quad k = \text{const}.$$

Isboti. $\int_a^b kf(x) dx = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n kf(\xi_i) \Delta x_i = k \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = k \int_a^b f(x) dx$.

3°. Chekli sondagi funktsiyalar algebraik yig‘indisining aniq integrali qo‘shiluvchilar aniq integrallarining algebraik yig‘indisiga teng, ya’ni

$$\int_a^b (f(x) \pm \varphi(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b \varphi(x) dx.$$

$$\text{Isboti. } \int_a^b (f(x) \pm \varphi(x)) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (f(\xi_i) \pm \varphi(\xi_i)) \Delta x_i = \\ = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \pm \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \varphi(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b \varphi(x) dx.$$

4°. Agar $[a; b]$ kesma bir necha qismga bo'lingan bo'lsa, u holda $[a; b]$ kesma bo'yicha olingan aniq integral har bir qism bo'yicha olingan aniq integrallar yig'indisiga teng bo'ladi. Masalan,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \quad c \in [a; b].$$

Isboti. $a < c < b$ bo'lsin deylik. Integral yig'indi $[a; b]$ kesmani bo'lish usuliga bog'liq emas. Shu sababli c ni $[a; b]$ kesmani bo'lish nuqtasi qilib olamiz. Masalan, agar $c = x$ deb olsak, u holda w_n ni ikki yig'indiga ajratish mumkin:

$$w_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

Bunda $d \rightarrow 0$ da limitga o'tamiz:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

a, b, c nuqtalarning boshqacha joylashishida xossa shu kabi isbotladi. Masalan, $a < b < c$ bo'lsa, $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$ bo'ladi.

Bundan

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx - \int_b^c f(x) dx$$

yoki integrallash chegaralarining almashtirilishi xossaga ko'ra

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

5°. Agar $[a; b]$ kesmada funksiya o'z ishorasini o'zgartirmasa, u holda funksiya aniq integralining ishorasi funksiya ishorasi bilan bir xil bo'ladi, ya'ni:

$$[a; b] \text{ da } f(x) \geq 0 \text{ bo'lganda } \int_a^b f(x) dx \geq 0;$$

$$[a; b] \text{ da } f(x) \leq 0 \text{ bo'lganda } \int_a^b f(x) dx \leq 0.$$

Isboti. $f(x) \geq 0$ funksiya uchun integral yig'indi $w_n \geq 0$ bo'ladi, chunki $\Delta x_i > 0$. Bundan $\int_a^b f(x)dx \geq 0$. Shu kabi $\Delta x_i > 0$, $f(x) \leq 0$ ekanidan $w_n \leq 0$ va $\int_a^b f(x)dx \leq 0$ kelib chiqadi.

6°. Agar $[a;b]$ kesmada $f(x) \geq \varphi(x)$ bo'lsa, u holda

$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b \varphi(x)dx$$

bo'ladi.

Isboti. $f(x) \geq \varphi(x)$ dan $f(x) - \varphi(x) \geq 0$ bo'ladi. U holda 5° xossaga ko'ra

$$\int_a^b (f(x) - \varphi(x))dx \geq 0 \text{ yoki } 3^\circ \text{ xossaga ko'ra } \int_a^b f(x)dx - \int_a^b \varphi(x)dx \geq 0.$$

Bundan

$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b \varphi(x)dx.$$

7°. Agar m va M sonlar $f(x)$ funksiyaning $[a;b]$ kesmadagi eng kichik va eng katta qiymatlarii bo'lsa, u holda

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

bo'ladi.

Isboti. Shartga kora $m \leq f(x) \leq M$. U holda 6° xossaga ko'ra

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b M dx.$$

Bunda

$$\int_a^b m dx = m \int_a^b dx = m(b-a), \quad \int_a^b M dx = M \int_a^b dx = M(b-a).$$

U holda

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a).$$

Bu xossa aniq integralni baholash haqidagi teorema deb yuritiladi.

8°. Agar $f(x)$ funktsiya $[a;b]$ kesmada uzlucksiz bo'lsa, u holda shunday $c \in [a;b]$ nuqta topiladiki,

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a) \tag{2.8}$$

bo'ladi.

Isboti. 7° xossaga ko'ra

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a).$$

Bundan

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} \leq M.$$

$\frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} = \mu$ ($m \leq \mu \leq M$) deymiz. U holda Bolsano-Koshining ikkinchi teoremasiga ko'ra shunday $c \in [a; b]$ nuqta topiladi, $f(c) = \mu$ bo'ladi.

Shu sababli

$$\frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} = f(c) \text{ yoki } \int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a).$$

(2.8) formulaga o'rta qiymat formulasi, $f(c)$ ga $f(x)$ funktsiyaning $[a; b]$ kesmadagi o'rtacha qiymati deyiladi.

Bu xossa o'rta qiymat haqidagi teorema deb ataladi.

O'rta qiymat haqidagi teorema quyidagi geometrik talqinga ega: agar $f(x) > 0$ bo'lsa, u holda $\int_a^b f(x)dx$ integral qiymati balandligi $f(c)$ ga va asosi $(b-a)$ ga teng bo'lgan to'g'ri to'rburchakning yuzasiga teng bo'ladi.

Aniq integralning xossalardan quyidagi natijalar kelub chiqadi.

1-natija. $[a; b]$ kesmada aniqlangan $f(x)$ funktsiya uchun

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

bo'ladi.

2-natija. Agar $[a; b]$ kesmada $|f(x)| \leq k$ bo'lsa, u holda

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq k(b-a), \quad (k = \text{const.})$$

bo'ladi.

Misollar1. $\int_0^1 x^2 \cos^2 x dx$ va $\int_0^1 x \sin^2 x dx$ integrallarni taqqoslaymiz.

$x \in [0; 1]$ nuqtalarda $x^2 \cos^2 x \leq x \sin^2 x$ tengsizlik bajariladi.

U holda aniq integralning 8° xossasiga ko'ra

$$\int_0^1 x^2 \cos^2 x dx \leq \int_0^1 x \sin^2 x dx$$

bo‘ladi.

$$2. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{4 + 3\sin^2 x} \text{ integralni baholaymiz.}$$

$0 \leq \sin^2 x \leq 1$ ekanidan $\frac{1}{7} \leq \frac{1}{4 + 3\sin^2 x} \leq \frac{1}{4}$ bo‘ladi. U holda aniq integralni baholash haqidagi teoremaga ko‘ra $\frac{1}{7}\left(\frac{\pi}{2} - 0\right) \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{4 + 3\sin^2 x} \leq \frac{1}{4}\left(\frac{\pi}{2} - 0\right)$

yoki

$$\frac{\pi}{14} \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{4 + 3\sin^2 x} \leq \frac{\pi}{8}.$$

3. $y = 2x + 2$ funksiyaning $[-1; 2]$ kesmadagi o‘rtacha qiymatini topamiz. Bunda o‘rta qiymat haqidagi teoremdan foydalanamiz:

$$f_{o,rt} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Aniq integralning geometrik ma’nosiga ko‘ra $\int_{-1}^2 (2x+2) dx$ integralning qiymati uchburchakning yuzasiga teng, ya’ni (3-shakl)

$$S = \frac{1}{2} \cdot (2+1) \cdot 6 = 9.$$


Bundan

$$f_{o,rt} = \frac{1}{2 - (-1)} \cdot 9 = 3.$$

4. Uzunligi 12 sm. bo‘lgan AB kesmada C nuqta olingan. Tomonlari AC va CB kesmalardan iborat to‘g‘ri to‘rburchakning o‘rtacha yuzasini topamiz.

Bunda A nuqtani hisob (koordinata) boshi deb olamiz. U holda $AC = x$ va $CB = 12 - x$ bo‘ladi. Bu kesmalarni tomonlar qilib yasalgan to‘g‘ri to‘rburchakning yuzasi $s = x(12 - x)$ bo‘ladi. Bu yusaning o‘rta qiymatini aniq integralning g^o – xossasi bilan topamiz:

$$S_{o,rt} = \frac{\int_0^{12} x(12-x) dx}{12-0} = \frac{1}{12} \left(\int_0^{12} 12x dx - \int_0^{12} x^2 dx \right) = \\ = \frac{1}{12} \left(6x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^{12} = \frac{1}{12} (864 - 576) = 24 \text{ sm}^2.$$



Amaliy mashg'ulotda yechiladigan misollar.

Berilgan aniq integrallarni hisoblang.

$$1. \int_1^4 \sqrt{x} dx \text{ (Javob. } \frac{14}{3})$$

$$2. \int_1^2 \left(2x^2 + \frac{2}{x}\right) dx \text{ (Javob. } \frac{21}{4})$$

$$3. \int_1^e \frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}} dx \text{ (Javob. 2)}$$

$$4. \int_0^1 \frac{1}{x^2+4x+5} dx \text{ (Javob. } \arctg \frac{1}{7})$$

$$5. \int_0^4 \frac{1}{1+\sqrt{2x+1}} dx \text{ (Javob. } 2 - \ln 2)$$

$$6. \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx \text{ (Javob. } \frac{4}{3})$$

$$7. \int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx \text{ (Javob. } \arctg \pi)$$

$$8. \int_1^3 \frac{1}{x\sqrt{x^2+5x+1}} dx \text{ (Javob. } \ln \frac{7+2\sqrt{7}}{9})$$

$$9. \int_0^5 \frac{1}{2x+\sqrt{3x+1}} dx \text{ (Javob. } \frac{1}{5} \ln 112)$$

Mustaqil yechish uchun misollar.

Berilgan aniq integrallarni hisoblang.

$$1. \int_1^4 \left(2x + \frac{3}{\sqrt{x}}\right) dx \text{ (Javob. 21)}$$

$$2. \int_4^9 \frac{y-1}{\sqrt{y+1}} dy \text{ (Javob. } \frac{23}{3})$$

$$3. \int_0^2 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}} dx \text{ (Javob. } 3 + 4 \ln 2)$$

$$4. \int_1^e x \ln^2 x dx \text{ (Javob. } \frac{1}{4}(e^2 - 1))$$

2.5. Yuqori chegarasi o'zgaruvchi aniq integral

$y = f(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmada aniqlangan va uzlusiz bo'lsin. U holda u ixtiyoriy $[a; x]$ ($a \leq x \leq b$) kesmada integrallanuvchi bo'ladi, ya'ni istalgan $x \in [a; b]$ uchun

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad (2.9)$$

integral mabjud bo'ladi.

Agar ixtiyoriy $t \in [a; b]$ da $f(t) > 0$ bo'lsa, u holda $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ integral asosi

$[a; x]$ kesmadan iborat bo'lgan egri chiziqli trapetsiyaning o'zgaruvchi yuzasi $S(x)$ ni ifodalaydi (1-shakl).

$[a; b]$ kesmada (2.9) tenglik bilan aniqlanuvchi $F(x)$ funksiya yuqori chegarasi o'zgaruvchi aniq integral deyiladi.

$F(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmada uzlusiz va differensiallanuvchi bo'ladi. Shunindek, bunda $F(x)$ funksiya uchun quyidagi teorema o'rinni bo'ladi.

1-teorema $[a; b]$ kesmada uzlusiz $f(t)$ funksianing yuqori chegarasi o'zgaruvchi integrali $F(x)$ dan yuqori chegara bo'yicha olingan hosila mavjud va u integral ostidagi funksianing yuqori chegaradagi qiymatiga teng bo'ladi, ya'ni

$$F'(x) = \left(\int_a^x f(t) dt \right)' = f(x), \quad x \in [a; b]. \quad (2.10)$$

Isboti. $x \in [a; b]$ va $x + \Delta x \in [a; b]$ bo'lsin. U holda aniq integralning 4° xossasini qo'llab, topamiz:


$$F(x + \Delta x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt.$$

Bundan (2.9) tenglik va o'rta qiymat haqidagi teoremaga ko'ra

$$\Delta F = F(x + \Delta x) - F(x) = \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt = f(c)\Delta x, \quad \text{bu yerda } c \in [x, x + \Delta x].$$

$F(x)$ funksianing hosilasini aniqlaymiz:

$$F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c)\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(c).$$



$\Delta x \rightarrow 0$ da $x + \Delta x \rightarrow x$ va $c \rightarrow x$, chunki $c \in [x, x + \Delta x]$.

U holda $f(x)$ funksiyaning uzluksizligidan

$$F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(c) = f(x)$$

bo'ladi.

teoremasi matematik analizning asosiy teoremalaridan biri hisoblanadi. Bu teorema differensial bilan aniq integral tushunchalari orasidagi munosabatni ochib beradi.

Bu teoremadan $[a; b]$ kesmada uzluksiz har qanday $f(x)$ funksiya shu kesmada boshlang'ich funksiyaga ega bo'ladi va uning boshlang'ich funksiyalaridan biri yuqori chegarasi o'zgaruvchi $F(x)$ integral bo'ladi degan xulosa kelib chiqadi.

$f(x)$ funksiyaning boshqa bir boshlang'ich funksiyasi $F(x)$ funksiyadan C o'zgarmas songa farq qilgani uchun aniqmas va aniq integrallar orasidagi ushbu bog'lanish kelib chiqadi:

$$\int f(x)dx = \int f(t)dt + C, x \in [a; b].$$

2.6. Nyuton-Leybnis formulasi

Aniq integralni integral yig'indining limiti sifatida hisoblash hatto oddiy funksiyalar uchun ham ancha qiyinchiliklar tug'diradi. Shu sababli aniq integralni hisoblashning (2.10) formulaga asoslangan, amaliy jihatdan qulay bo'lgan hamda keng qo'llaniladigan usuli bilan tanishamiz.

2-teorema (integral hisobning asosiy teoremasi). Agar $F(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmada uzluksiz bo'lgan $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo'lsa, u holda $[a; b]$ kesmada $f(x)$ funksiyadan olingan aniq integral $F(x)$ funksiyaning integrallash oralig'idagi orttirmasiga teng bo'ladi, ya'ni

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a). \quad (2.11)$$

Izboti. $F(x)$ funksiya $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyalaridan biri bo'lsin. U holda 1-teoremaga asosan $\int_a^b f(t)dt$ funksiya ham $f(x)$ funksiyaning $[a; b]$ kesmadagi boshlang'ich funksiyasi bo'ladi. Boshlang'ich funksiyalar C o'zgarmas songa farq qilganidan

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) + C.$$

Bu tenglikka $x=a$ ni qo'yamiz va bir xil chegarali aniq integralning xossasini qo'llaymiz:

$$\int_a^a f(t)dt = F(a) + C = 0.$$

Bundan $C = -F(a)$. U holda istalgan $x \in [a; b]$ uchun

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a)$$

bo'ladi.

Oxirgi tenglikda $x=b$ deymiz va t o'zgaruvchini x bilan almashtiramiz. Natijada (2.11) formula kelib chiqadi.

(2.11) formulaga Nyuton-Leybnis formulasi deyiladi.

$F(b) - F(a)$ ayirmani shartli ravishda $F(x)|_a^b$ deb yozish kelishilgan.

Bu kelishuv natijasida Nuyton-Leybnis formulasi

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b \quad (2.12)$$

ko'inishda ifodalanadi.

Misollar

$$1. \int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln|x + \sqrt{1+x^2}| \Big|_0^3 = \ln|3 + \sqrt{10}| - \ln 1 = \ln|3 + \sqrt{10}|.$$

$$2. \int_{-1}^4 \frac{dx}{x^2 - 2x + 10} = \int_{-1}^4 \frac{dx}{(x-1)^2 + 3^2} = \frac{1}{3} \arctg \frac{x-1}{3} \Big|_{-1}^4 = \frac{1}{3} (\arctg 1 - \arctg 0) = \frac{\pi}{12}.$$

Nyuton-Leybnis formulasidan uning qo'llanish shartlarini hisobga olmagan holda formal foydalanish xato hatijaga olib kelishi mumkin.

Masalan, $\frac{1}{4+x^2}$ funksiya uchun boshlang'ich funksiya sifatida $\frac{1}{2} \arctg \frac{x}{2}$ ni yoki $\frac{1}{2} \arcctg \frac{2}{x}$ ni olish mumkin. Avval $F(x) = \frac{1}{2} \arctg \frac{x}{2}$ deb olamiz:

$$\int_{-2}^2 \frac{dx}{4+x^2} = \frac{1}{2} \arctg \frac{x}{2} \Big|_{-2}^2 = \frac{1}{2} (\arctg 1 - \arctg(-1)) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right) = \frac{\pi}{4}.$$

Bunda Nyuton-Leybnis formulasi to'g'ri qo'llanildi, chunki $F(x) = \arctg x$ funksiya $[-2; 2]$ kesmada uzlusiz va $F'(x) = f(x)$ tenglik butun kesmada bajariladi.

Endi $F(x) = \frac{1}{2} \arcctg \frac{2}{x}$ deb olamiz:

$$\int_{-2}^2 \frac{dx}{4+x^2} = \frac{1}{2} \arctg \frac{2}{x} \Big|_{-2}^2 = \frac{1}{2} (\arctg 1 - \arctg(-1)) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{-\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4}.$$

Bunda Nyuton-Leybnis formulasi noto‘g‘ri (formal) qo‘llanildi, chunki $x=0$ da $\arctg \frac{1}{x}$ funksiya uzilishga ega va u $[-2;2]$ kesmada boshlang‘ich funksiya bo‘la olmaydi. Natijada xatolik $\left(-\frac{\pi}{4} \neq \frac{\pi}{4}\right)$ kelib chiqdi.

Demak, Nyuton-Leybnis formulasini qo‘llashda $F(x)$ boshlang‘ich funksiya berilgan kesmada uzlusiz deb faraz qilinadi (ayrim shartlarda Nyuton-Leybnis formulasi uzilishga ega bo‘lgan funksiyalar uchun ham o‘rinli bo‘lishi mumkin).

2.7. Aniq integralda o‘zgaruvchini almashtirish

1-teorema. $y=f(x)$ funksiya $[\alpha; \beta]$ kesmada uzlusiz bo‘lsin.

Agar: 1) $x=\phi(t)$ funksiya $[\alpha; \beta]$ kesmada differensiallanuvchi va $\phi'(t)$ funksiya $[\alpha; \beta]$ kesmada uzlusiz; 2) $x=\phi(t)$ funksiyaning qiymatlar sohasi $[\alpha; \beta]$ kesmadan iborat; 3) $\phi(\alpha)=a$ va $\phi(\beta)=b$ bo‘lsa, u holda

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^\beta f(\phi(t))\phi'(t)dt \quad (2.13)$$

bo‘ladi.

Istobi. Nyuton-Leybnis formulasiga ko‘ra

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a),$$

bu yerda $F(x)$ funksiya $f(x)$ funksiyaning $[\alpha; \beta]$ kesmadagi boshlang‘ich funksiyalaridan biri. $\Phi(t) = F(\phi(t))$ murakkab funksiyani qaraymiz.

Murakkab funksiyani differensiallash qoidasiga asosan

$$\Phi'(t) = F'(\phi(t))\phi'(t) = f(\phi(t))\phi'(t).$$

Demak, $\Phi(t)$ funksiya $[\alpha; \beta]$ kesmada $f(\phi(t))\phi'(t)$ uzlusiz funksiya uchun boshlang‘ich funksiya bo‘ladi. Nyuton-Leybnis formulasi bilan topamiz:

$$\int_a^\beta f(\phi(t))\phi'(t)dt = \Phi(\beta) - \Phi(\alpha) = F(\phi(\beta)) - F(\phi(\alpha)) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx.$$

(2.13) formula aniq integralda o'zgaruvchini almashtirish formulasi deb yuritiladi. Aniq integralni hisoblashning bu usulida aniq integralda o'rniga qo'yish usuli deyiladi.

Izoh. Aniq integralni (2.13) formula bilan hisoblashda yangi o'zgaruvchidan eski o'zgaruvchiga qaytish shart emas, chunki integrallash chegarasi o'rniga qo'yishga mos tarzda o'zgaradi.

Misollar

$$1. \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{4-x^2} dx \text{ integralni hisoblaymiz. Bunda } x=2\sin t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$$

belgilash kiritamiz. Bu o'zgaruvchini almashtirish 3-teoremaning barcha shartlarini qanoatlantiradi: birinchidan $f(x)=\sqrt{4-x^2}$ funksiya $[0; \sqrt{3}]$ kesmada uzliksiz, ikkinchidan $x=2\sin t$ funksiya $\left[0; \frac{\pi}{3}\right]$ kesmada differensiallanuvchi va $x'=2\cos t$ bu kesmada uzliksiz, uchinchidan t o'zgaruvchi 0 dan $\frac{\pi}{3}$ gacha o'zgarganda $x=2\sin t$ funksiya 0 dan $\sqrt{3}$ gacha o'sadi va bunda $\phi(0)=0$ va $\phi\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}$. Bunda $dx=2\cos t dt$.

(6) formuladan topamiz:

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{4-x^2} dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^2 t dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1 + \cos 2t) dt = 2 \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

2. $\int_0^1 x\sqrt{1+x^2} dx$ integralni hisoblaymiz. Bunda $t=\sqrt{1+x^2}$ o'rniga qo'yish bajaramiz. U holda

$$x=\sqrt{t^2-1}, \quad dx=\frac{tdt}{\sqrt{t^2-1}}, \quad x=0 \text{ da } t=1, \quad x=\text{da } t=\sqrt{2}.$$

$[1; \sqrt{2}]$ kesmada $\sqrt{t^2-1}$ funksiya monoton o'sadi, demak o'rniga qo'yich to'g'ri bajarilgan. Bundan

$$\int_0^1 x\sqrt{1+x^2} dx = \int_1^2 \sqrt{t^2-1} \cdot t \cdot \frac{tdt}{\sqrt{t^2-1}} = \int_1^2 t^2 dt = \frac{t^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}.$$

Izoh. (2.13) formulani qo'llashda teoremda sanab o'tilgan shartlarning bajarilishini tekshirish lozim. Agar bu shartlar buzilsa keltirilgan formula bo'yicha o'zgaruvchini almashtirish xato natijaga olib kelishi mumkin.

2.8.Aniq integralni bo‘laklab integrallash

1-teorema. Agar $u(x)$ va $v(x)$ funksiyalar $u'(x)$ va $v'(x)$ hosilalari bilan $[a; b]$ kesmada uzlusiz bo‘lsa, u holda

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du \quad (2.14)$$

bo‘ladi.

Istboti. Teoremaning shartiga ko‘ra $u(x)$ va $v(x)$ funksiyalar hosilaga ega.

U holda ko‘paytmani differensiallash qoidasiga binoan

$$(u(x)v(x))' = u(x)v'(x) + v(x)u'(x).$$

Bundan $u(x)v(x)$ funksiya $u(x)v'(x) + v(x)u'(x)$ funksiya uchun boshlang‘ich

funksiya bo‘lishi kelib chiqadi. $u(x)v'(x) + v(x)u'(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmada uzlusiz bo‘lganidan u bu kesmada integrallanuvchi bo‘ladi.

U holda aniq integralning 3° xossasiga va Nyuton-Leybnis formulasiga ko‘ra

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx + \int_a^b v(x)u'(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b$$

yoki

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du.$$

(2.14) formula aniq integralni bo‘laklab integrallash formulasi deb ataladi.

Misol

$$1. \int_0^1 \arcsin x dx = \left| \begin{array}{l} \arcsin x = u, \quad dv = dx \\ du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad v = x \end{array} \right| = x \arcsin x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} = \\ = \arcsin 1 + \sqrt{1-x^2} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} - 1.$$

2.9. Aniq integralning geometrik masalalarga tatbiqlari

1. Aniq integralning qo'llanish sxemalari

x o'garuvchi aniqlangan $[a; b]$ kesmaga bog'liq biror geometrik yoki fizik A kattalikning qiymatini (tekis shakl yuzasini, jism hajmini, kuchning bajargan ishini va hokazo) hisoblash talab qilingan bo'lsin. Bunda A kattalik additiv deb faraz qilinadi, ya'ni $[a; b]$ kesmaning $c \in [a; b]$ nuqta bilan $[a; c]$ va $[c; b]$ qismlarga bo'linishida A kattalikning $[a; b]$ kesmaga mos qiymati uning $[a; c]$ va $[c; b]$ kesmalarga mos qiymatlarining yig'indisiga teng qilib olinadi.

A kattalikning qiymatini hisoblash ma'lum tartibda (sxema asosida) bajariladi. Bunda ikki sxemadan biriga amal qilish mumkin: I sxema (integral yig'indilar usuli) va II sxema (differensial usuli).

I sxema aniq integralning ta'rifiga asoslanadi. Bunda:

1°. $[a; b]$ kesma $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{i-1} < x_i < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ nuqtalar bilan n ta kichik kesmalarga bo'linadi. Bunda A kattalik mos n ta ΔA_i , ($i = \overline{1, n}$) «elementar qo'shiluvchilar» ga bo'linadi:
$$A = \Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots + \Delta A_n;$$

2°. Har bir «elementar qo'shiluvchi» masalaning shartidan aniqlanuvchi funksiyaning mos kesma istalgan nuqtasida hisoblangan qiymati bilan kesmaning uzunligi ko'paytmasi ko'rinishiga keltiriladi:
$$\Delta A_i \approx f(\xi_i) \Delta x_i;$$

ΔA_i ning taqribiy qiymatini topishda ayrim soddalashtirishlar qilish mumkin: kichik bo'lakda yowni uning chekkalarini tortib turuvchi vatar bilan almashtirish mumkin; kichik bo'lakda o'zgaruvchi tezlikni o'zgarmas deyish mumkin va hokazo.

Bunda A kattalikning taqribiy qiymati integral yig'indidan iborat bo'ladi:

$$A \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

3°. A kattalikning haqiqiy qiymati bu integral yig'indining $n \rightarrow \infty$ dagi (bunda $\lambda = \max_{\text{osxsh}} \Delta x_i$) limitiga teng bo'ladi:

$$A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx.$$

II sxema I sxemaning o'zgargan ko'rinishi hisoblanadi va «differensial usul» yoki «yuqori tartibli cheksiz kichiklarni tashlab yuborish usuli» deb ataladi. Bunda:

1°. $[a; b]$ kesmada ixtiyoriy x qiymatni tanlaymiz va o'zgaruvchi $[a; x]$ kesmani qaraymiz. Bu kesmada A kattalik x ning funksiyasi bo'ladi: $A = A(x)$, ya'ni A kattalikning bo'lagi $A(x)$ noma'lum funksiya bo'ladi, bu yerda $x \in [a; b]$ - A kattalikning parametrlaridan biri;

2°. x ning kichik $\Delta x = dx$ kattalikka o'zgarishida ΔA orttirmaning bosh qismini topamiz: $dA = f(x)dx$, bu yerda $f(x)$ - x o'zgaruvchining masala shartidan kelib chiquvchi funksiyasi (bunda mumkin bo'lgan soddalashtirishlar qilinishi mumkin);

3°. $\Delta A \approx dA$ deb, dA ni a dan b gacha integrallash orqali A ning izlanayotgan qiymati topiladi:

$$A = \int_a^b f(x)dx.$$

2. Tekis shakl yuzasini hisoblash

Yuzani dekart koordinatalarida hisoblash

Aniq integralning geometrik ma'nosiga asosan abssissalar o'qidan yuqorida yotgan, ya'ni yuqoridan $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$) funksiya grafigi bilan, quyidan Ox o'q bilan, yon tomonlaridan $x=a$ va $x=b$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsiyaning yuzasi

$$S = \int_a^b f(x)dx \quad (2.15)$$

integtegralga teng bo'ladi.

Shu kabi, abssissalar o'qidan pastda yotgan, ya'ni quyidan $y = f(x)$ ($f(x) \leq 0$) funksiya grafigi bilan, yuqoridan Ox o'q bilan, yon tomonlaridan $x=a$ va $x=b$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsiyaning yuzasi

$$S = - \int_a^b f(x)dx \quad (2.16)$$

integtegralga teng bo'ladi.

(2.15) va (2.16) formulalarni bitta formula bilan umumlashtirish mumkin:

$$S = \left| \int_a^b f(x)dx \right|. \quad (2.17)$$


Misol. $y=x^2$, $y=0$ va $x=1$ chiziqlar bilan chegaralangan tekis shakl yuzasini (2.15) formula bilan topamiz:

$$S = \int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$$


Yuzani hisoblashga oid murakkabroq masalalar yuzaning additivlik xossasiga asoslangan holda yechiladi. Bunda tekis shaki kesishmaydigan qismlarga ajratiladi va aniq integralning 4'xossasiga ko'ra tekis shaklning yuzasi qismlar yuzalarining yig'indisiga teng bo'ladi.

Misol. $y = \cos x$, $y = 0$, $x = 0$ va $x = \pi$ chiziqlar bilan chegaralangan tekis shakl yuzasini hisoblaymiz. Bunda berilgan tekis shaklni yuzalari S_1 va S_2 bo'lgan kesishmaydigan qismlarga ajratamiz. U holda yuzaning additivlik xossasiga asosan berilgan tekis shaklning yuzasi qismlar yuzalarining yig'indisiga teng bo'ladi. Demak, (6-shakl)

$$S = S_1 + S_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \sin x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = 1 - (-1) = 2.$$



5-shakl.



6-shakl.

$[a; b]$ kesmada ikkita $y_1 = f_1(x)$ va $y_2 = f_2(x)$ uzliksiz funksiyalar berilgan va $x \in [a; b]$ da $f_2(x) \geq f_1(x)$ bo'lsin. Bu funksiyalarning grafiklari va $x=a$, $x=b$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan tekis shaklning yuzasini topamiz.


Har ikkala funksiya musbat bo'lganda bu tekis shaklning yuzasi yuqoridan $y_2 = f_2(x)$ va $y_1 = f_1(x)$ funksiyalar garfiylari bilan, quyidan Ox o'q bilan, yon tomonlardan $x=a$ va $x=b$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan egri chiziqli

trapetsiyalar yuzalarining ayirmasiga teng bo'ladi:


$$S = \int_a^b f_2(x) dx - \int_a^b f_1(x) dx = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x)) dx. \quad (2.18)$$

(2.18) formula $[a; b]$ kesmada uzluksiz va musbat bo'limgan $y_2 = f_2(x)$ va $y_1 = f_1(x)$ funksiyalar uchun ham o'rinni bo'ladi.

Haqiqatan ham, agar $y_2 = f_2(x)$ va $y_1 = f_1(x)$ funksiyalar $[a; b]$



7-shakl



8-shakl

kesmada manfiy qiymatlar qabul qilsa (bunda $y_2 \geq y_1$), har bir funksiyaga bir xil o'zgarmas $y = C$ qiymatlar qo'shish orqali $y_1 = f_1(x) + C$ va $y_2 = f_2(x) + C$ funksiyalar grafiglarini Ox o'qidan yuqorida joylashtirish mumkin (6-shakl).

tekis shakl tekis shaklni parallel ko'chirish orqali hosil qilindi. Shu sababli yuzaning ko'chishga nisbatan invariantlik xossasiga ko'ra bu tekis shakllar teng yuzalarga ega bo'ladi.

yuza uchun (2.18) formula o'rinni, ya'ni

$$S = \int_a^b (f_2(x) + C) dx - \int_a^b (f_1(x) + C) dx = \int_a^b ((f_2(x) + C) - (f_1(x) + C)) dx.$$


Bundan

$$S = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x)) dx.$$


Demak, (2.17) formula 7-shakldagi tekis shakl uchun ham o'rinni bo'ladi.

Ayrim hollarda yuzani hisoblashga oid masalalar yuzaning ko'chishga nisbatan invariantlik xossasidan foydalangan holda soddalashtiriladi. Bunda tekis shakl yuzasi (2.18) formulada x va y o'zgaruvchilar (Ox va Oy o'qlar) ning o'rnini almashtirish yo'li bilan hisoblanadi, ya'ni (9-shakl)

$$S = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x)) dx = \int_c^d (g_2(y) - g_1(y)) dy. \quad (2.19)$$



9-shakl



10-shakl.


Misollar

1. $y^2 = x + 1$ va $y = x - 1$ chiziqlar bilan chegaralangan tekis shaklning yuzasini hisoblaymiz.

Tekis shakl umumiy $B(0;-1)$ va $C(3;2)$ nuqtalarga ega bo'lgan parabola va to'g'ri chiziq bilan chegaralangan. Tekis shaklni uchta qismga, ya'ni yuzalari S_1 ga teng bo'lgan AOD va AOB parabolik sektorlarga va yuzasi S_2 ga teng bo'lgan BCD parabolik uchburchakka ajratamiz.

Bunda (2.15) va (2.18) formulalarni qo'llab, topamiz:

$$\begin{aligned} S &= 2S_1 + S_2 = 2 \int_{-1}^0 \sqrt{x+1} dx + \int_0^3 (\sqrt{x+1} \\ &= \frac{4}{3} \sqrt{(x+1)^3} \Big|_{-1}^0 + \left(\frac{2}{3} \sqrt{(x+1)^3} - \frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_0^3 \end{aligned}$$



11-shakl

Bu yuza y o'zgaruvchi bo'yicha hisoblanganda tekis shaklni qismlarga ajratiish shart bo'lmaydi:

2. $x = \frac{1}{2} y^2$, $y = -3$, $y = 1$ chiziqlar va ordinatalar o'qi bilan chegaralangan tekis shakl yuzasini hisoblaymiz:

$$S = \int_{-3}^1 y^2 dy = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} y^3 \Big|_{-3}^1 = \frac{1}{6} (1 + 27) = \frac{14}{3}.$$

Agar egri chiziqli trapetsiya yuqorida $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $\alpha \leq t \leq \beta$ parametrik tenglamalar bilan berilgan funksiya grafigi bilan chegaralangan bo'lsa (2.15) formulada $x = \varphi(t)$, $dx = \varphi'(t)dt$ o'rniga qo'yish orqali o'zgaruvchi almashtiriladi.

U holda

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \psi(t) \varphi'(t) dt \quad (2.20)$$

bo'ladi, bu yerda, $a = \varphi(\alpha)$ va $b = \varphi(\beta)$.

Misol

Radiusi R ga teng doira yuzasini hisoblaymiz. Buning uchun koordinatalar boshini doiraning markaziga joylashtiramiz. Bu doiraning aylanasi $x = R \cos t$, $y = R \sin t$ parametrik tenglamalar bilan aniqlanadi va doira koordinata o'qlariga nisbatan simmetrik bo'ladi. Shu sababli uning birinchi chorakdag'i yuzasini hisoblaymiz (bunda x o'zgaruvchi 0 dan R gacha o'zgarganda t parametr $\frac{\pi}{2}$ dan 0 gacha o'zgaradi) va natijani to'rtga ko'paytiramiz:


$$\begin{aligned} S &= 4S_1 = 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} R \sin t (-R \sin t) dt = 4R^2 \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \\ &= 2R^2 \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2t) dt = 2R^2 \left(t - \frac{\sin 2t}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi R^2. \end{aligned}$$

3. Yuzani qutb koordinatalarida hisoblash

Qutb koordinatalar (r - qutb radiusi, φ - qutb burchagi) sistemasida berilgan $r = r(\varphi)$ funksiya $\varphi \in [\alpha; \beta]$ kesmada uzluksiz bo'lsin.

$r = r(\varphi)$ funksiya grafigi hamda O qutbdan chiqqan $\varphi = \alpha$ va $\varphi = \beta$ nurlar bilan chegaralangan tekis shaklga egri chiziqli sektor deyiladi.

AOB egri chiziqli sektor yuzasini hisoblaymiz. Bunda II sxemadan foydalanamiz.



12-shakl

1°. Izlanayotgan yuza φ burchakning funksiyasi bo'lsin deymiz:
 $S = S(\varphi)$, bu yerda $\alpha \leq \varphi \leq \beta$ ($\varphi = \alpha$ bo'lganda $S(\alpha) = 0$, $\varphi = \beta$ bo'lganda $S(\beta) = S$).

2°. Joriy φ qutb burchagi $\Delta\varphi = d\varphi$ orttirma olganida ΔS yuza OAB «elementar egri chuiqli sektor» yuzasiga teng orttirma oladi.

Bunda dS differensial ΔS orttirmaning $d\varphi \rightarrow 0$ dagi orttirmasining bosh qismini ifodalaydi va radiusi r ga, markaziy burchagi $d\varphi$ ga teng bo'lgan OAC doiraviy sektor yuzaasiga teng bo'ladi. (12-shakl)

Shu sababli

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\varphi.$$

3°. Oxirgi ifodani $\varphi = \alpha$ dan $\varphi = \beta$ gacha integrallab izlanayotgan yuzani topamiz:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi. \quad (2.21)$$

Misol

$r = 2\cos 3\varphi$ egri chiziq bilan chegaralangan figuraning yuza-sini hisoblaymiz. Bu figura uch yaproqli gul deyiladi. (2.21) formula bilan topamiz:


$$\frac{1}{6} S = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} 4\cos^2 3\varphi d\varphi = \int_0^{\pi} (1 + \cos 6\varphi) d\varphi = \left(\varphi + \frac{1}{6}\sin 6\varphi \right) \Big|_0^{\pi}$$

Bundan $S = \pi$.


4. Tekis egri chiziq yoyi uzunligini hisoblash

Tekislikda AB egri chiziq $[a; b]$ kesmada uzliksiz $y = f(x)$ funksiya grafigi bilan berilgan bo'lsin. AB egri chiziq uzunligini II sxemadan foydalangan holda topamiz.

1°. $[a; b]$ kesmada ixtiyoriy x qiymatni tanlaymiz va o'zgaruvchi $[a; x]$ kesmani qaraymiz. Bu kesmada l kattalik x ning funksiyasi bo'ladi: $l = l(x)$ ($l(a) = 0$ va $l(b) = l$).



13-shakl



14-shakl

2°. x ning kichik $\Delta x = dx$ kattalikka o'zgarishida dl differensialni topamiz: $dl = l'(x)dx$. MN yoxi uni tortib turuvchi vatar bilan almashtiramiz va $l'(x)$ ni topamiz:

$$l'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2} = \sqrt{1 + (y'_x)^2}.$$

Demak, $dl = \sqrt{1 + (y'_x)^2} dx$ yoki $y'_x = \frac{dy}{dx}$ ekanidan $dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$.

3°. dl ni a dan b gacha integrallab, topamiz:

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (y'_x)^2} dx \quad (2.22)$$

(2.22) tenglikka yoy differensialining to'g'ri burchakli koordinatalardagi formulasi deyiladi.

Agar egri chiziq $x = g(y)$, $y \in [c; d]$ tenglama bilan berilgan bo'lsa, yuqorida keltirilganlarni takrorlab, AB yoy uzunligini hisoblashning quyidagi formulasini hosil qilamiz:

$$l = \int_c^d \sqrt{1 + (x'_y)^2} dy. \quad (2.23)$$

Agar egri chiziq $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $\alpha \leq t \leq \beta$ parametrik tenglamalar bilan berilgan bo'lsa, (2.22) formulada $x = \varphi(t)$, $y = \psi(x)$, $dx = \varphi'(t)dt$ o'riniqa qo'yish orqali o'zgaruvchi almashtiriladi.

Bunda

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt \quad (2.24)$$

kelib chiqadi, bu yerda $a = \varphi(\alpha)$ va $b = \varphi(\beta)$.

Egri chiziq qutb koordinatalar sistemasida $r = r(\varphi)$, $\alpha \leq \varphi \leq \beta$ tenglama bilan berilgan bo'lsin, bunda $r(\varphi)$, $r'(\varphi)$ funksiyalar $[\alpha; \beta]$ kesmada uzliksiz va A, B nuqtalarga qutb koordinatalarida α, β burchaklar mos keladi.

$x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ ekanidan

$$x'(\varphi) = r'(\varphi) \cos \varphi - r(\varphi) \sin \varphi, \quad y'(\varphi) = r'(\varphi) \sin \varphi - r(\varphi) \cos \varphi.$$

(2.24) formulaga $x'(\varphi)$ va $y'(\varphi)$ hosilalarni qo'yamiz va almashtirishlar bajarib, topamiz:

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r'^2(\varphi) + r''^2(\varphi)} d\varphi. \quad (2.25)$$

Misollar:

1. $y = x^{\frac{3}{2}}$ yarim kubik parabolaning $x=0$ dan $x=5$ gacha yoyi uzunligini topamiz. Bunda $y = x^{\frac{3}{2}}$ dan $y' = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$ kelib chiqadi.

U holda (2.22) formula bilan topamiz:

$$l = \int_0^5 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x^2} dx = \frac{8}{27} \left(1 + \frac{9}{4}x^2 \right)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^5 = \frac{335}{27}.$$

2. $y = \frac{3}{8}x^{\frac{4}{3}} - \frac{3}{4}\sqrt[3]{x^2}$ egri chiziq yoyining Ox o‘q bilan kesishish nuqtalari orasidagi uzunligini hisoblaymiz. Buning uchun avval $y=0$ deb egri chiziqning Ox oq bilan kesishish nuqtalarini aniqlaymiz: $x_1 = 0$, $x_2 = 2\sqrt{2}$.

Hosilani topamiz:

$$y' = \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}} - \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{2} \left(x^{\frac{1}{3}} - x^{-\frac{1}{3}} \right).$$

Yoy uzunligini hisoblaymiz:

$$\begin{aligned} l &= \int_0^{2\sqrt{2}} \sqrt{1 + \frac{1}{4} \left(x^{\frac{1}{3}} - x^{-\frac{1}{3}} \right)^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\sqrt{2}} \sqrt{\left(x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}} \right)^2} dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\sqrt{2}} \left(x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}} \right) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}} + \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}} \right) \Big|_0^{2\sqrt{2}} = 3. \end{aligned}$$

3. $\begin{cases} x = a\cos^3 t, \\ y = a\sin^3 t \end{cases}$ tenglama bilan berigan egri chiziq uzunligini topamiz. Berilgan tenglama astroidani ifodalaydi.

Astroidaning uzunligini (2.23) formula bilan topamiz:

$$\begin{aligned} l &= 4 \int_0^{\pi} \sqrt{(-3a\cos^2 t \sin t)^2 + (3a\sin^2 t \cos t)^2} dt = \\ &= 4 \int_0^{\pi} 3a \sqrt{\cos^2 t \sin^2 t \cdot (\cos^2 t + \sin^2 t)} dt = \\ &= 12a \int_0^{\pi} \cos t \sin t dt = 6a \sin^2 t \Big|_0^{\pi} = 6a. \end{aligned}$$

4. $r = a(1 + \cos\varphi)$, $a > 0$ kardioda uzunligini topamiz. Bunda egri chiziqning simmetrikligini hisobga olamiz. U holda

$$l = 2l = 2 \int_0^{\pi} \sqrt{a^2(1 + \cos \varphi)^2 + a^2(-\sin \varphi)^2} d\varphi = 4a \int_0^{\pi} \sqrt{\frac{1 + \cos \varphi}{2}} d\varphi = \\ = 4a \int_0^{\pi} \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi = 8a \sin \frac{\varphi}{2} \Big|_0^{\pi} = 8a.$$

5. Aylanish sirti yuzasini hisoblash

ABegri chiziq $y = f(x) \geq 0$ funksiyaning grafigi bo'lsin. Bunda $x \in [a; b]$, $y = f(x)$ funksiya va uning $y' = f'(x)$ hosilasi bu kesmada uluksiz bo'lsin.

ABegri chiziqning Ox o'q atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jism sirti yuzasini hisoblaymiz. Buning uchun II sxemanini qo'llaymiz.

1°. Istalgan $x \in [a; b]$ nuqta orqali Ox o'qqa perpendikular tekislik o'tkazamiz. Bu tekislik aylanish sirtini radiusi $y = f(x)$ bo'lgan aylana bo'ylab kesadi. Bunda aylanish sirtidan iborat S kattalik x ning funksiyasi bo'ladi: $S = S(x)$ ($S(a) = 0$ va $S(b) = S$).

2°. x argumentga $\Delta x = dx$ orttirma beramiz va $x + \Delta x \in [a; b]$ nuqta orqali Ox o'qqa perpendikular tekislik o'tkazamiz. Bunda $S = S(x)$ funksiya «belbog» ko'rinishida dS orttirma oladi.


Kesimlar orasidagi jismni yasovchisi dl bo'lgan va asoslarining radiuslari y va $y + dy$ bo'lgan kesik konus bilan almashtiramiz. Bu kesik konusning yon sirti $dS = \pi(y + y + dy)dl = 2\pi y dl + \pi dy dl$ ga teng. $dy dl$ ko'paytmani dS ga nisbatan yuqori tartibli cheksiz kichik sifatida tashlab yuboramiz: $dS = 2\pi y dl$. Bunda $dl = \sqrt{1 + (y'_x)^2} dx$ ekanini hisobga olamiz: $dS = 2\pi y \sqrt{1 + (y'_x)^2} dx$.

3°. dS ni a dan b gacha integrallab, topamiz:

$$S = 2\pi \int_a^b y \sqrt{1 + (y'_x)^2} dx \quad (2.26)$$

Shu kabi $x = g(y)$, $y \in [c; d]$ funksiya grafigining Oy o'q atrofida aylantirshdan hosil bo'lgan jism sirtining yuzasi ushu

$$S = 2\pi \int_c^d x \sqrt{1 + (x'_y)^2} dy \quad (2.27)$$



15-shakl

formula bilan hisoblanadi.

Agar sirt $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $\alpha \leq t \leq \beta$ parametrik tenglamalar bilan berilgan bo'lsa, u holda AB egri chiziqning $Ox(Oy)$ o'q atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jism sirti yuzasi quyidagicha hisoblanadi:

$$S = 2\pi \int_a^b \psi(t) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt \quad \left(S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} \psi(t) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt \right), \quad (2.28)$$

bu yerda $a = \varphi(\alpha)$ va $b = \varphi(\beta)$ ($c = \psi(\alpha)$ va $d = \psi(\beta)$).

AB egri chiziq qutb koordinatalar sistemasida $r = r(\varphi)$, $\alpha \leq \varphi \leq \beta$ tenglama bilan berilgan bo'lganida quyidagi formulalar o'rinni bo'ladi:

$$S = 2\pi \int_a^b r \sin \varphi \sqrt{r^2 + r'^2} d\varphi \quad (Ox), \quad S = 2\pi \int_a^b r \cos \varphi \sqrt{r^2 + r'^2} d\varphi \quad (Oy). \quad (2.29)$$

Misollar

1. Radiusi R ga teng bo'lgan shar sirti yuzaini hisoblaymiz.. Shar parametrik tenglamasi $x = R \cos t$, $y = R \sin t$ bo'lgan yarim aylananining Ox o'q atrofida aylanishidan hosil bo'ladi. Sharning koordinata o'qlariga simmetrik bo'lishini inobatga olib, hisoblaymiz:

$$\begin{aligned} S &= 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} R \sin t \sqrt{(-R \sin t)^2 + (R \cos t)^2} dt = \\ &= 4\pi R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = -4\pi R^2 \cos t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 4\pi R^2. \end{aligned}$$

2. zanjir chizig'i $x=0$ dan $x=a$ gacha bo'lagining Ox o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirt yuzasini hisoblaymiz.


Buning uchun avval $y' = sh \frac{x}{a}$ hosilani va $\sqrt{1 + (y')^2} = ch \frac{x}{a}$ ifodani topamiz.

U holda (2.26) formulaga ko'ra


$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^a ch^2 \frac{x}{a} dx = \pi a \int_0^a \left(1 + ch^2 \frac{2x}{a} \right) dx = \\ &= \pi a \left(\frac{a}{2} sh \frac{2x}{a} + x \right) \Big|_0^a = \pi a^2 \left(\frac{1}{2} sh 2 + 1 \right). \end{aligned}$$

3. $y = \frac{x^2}{2}, x > 0$ parabola bo‘lagining $y = \frac{3}{2}$ to‘g‘ri chiziq bilan kesilgan qismining Oy o‘qi atrofida aylanishidan hosil bo‘lgan sirt yuzasini hisoblaymiz. Misol shartidan topamiz: $x = \sqrt{2y}$, $x' = \frac{1}{\sqrt{2y}}$.

(2.27) formula bilan topamiz:



16-shakl



17-shakl

$$\sigma = 2\pi \int_0^{\frac{3}{2}} \sqrt{2y} \sqrt{1 + \frac{1}{2y}} dy = 2\pi \int_0^{\frac{3}{2}} \sqrt{2y + 1} dy = 2\pi \frac{1}{3} (2y + 1)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\frac{3}{2}} = \frac{14\pi}{3}.$$

6. Hajmlarni hisoblash

Hajmi ko‘ndalang kesim yuzasi bo‘yicha hisoblash

Hajmi hisoblanishi lozim bo‘lgan qandaydir jism uchun uning istalgan ko‘ndalang kesim yuzasi S ma’lum bo‘lsin. Bu yuza ko‘ndalang kesim joylashishiga bog‘liq bo‘ladi: $S = S(x)$, $x \in [a; b]$, bu yerda $S(x)$ - $[a; b]$ kesmada uzluksiz funksiya.

Izlanayotgan hajjni II sxema asosida topamiz.

1°. Istalgan $x \in [a; b]$ nuqta orqali Ox o‘qqa perpendikular tekislik o‘tkazamiz. Jismning bu tekislik bilan kesimi yuzasini $S(x)$ bilan va jismning bu tekislikdan chapda yotgan bo‘lagining hajmini $V(x)$ bilan belgilaymiz. Bunda V kattalik x ning funksiyasi bo‘ladi: $V = V(x)$ ($V(a) = 0$ va $V(b) = V$).

2°. $V(x)$ funksiyaning dV differensialini topamiz. Bu differensial Ox o‘q bilan x va $x + \Delta x$ nuqtalarda kesishuvchi parallel tekisliklar orasidagi «elementar qatlam» dan iborat bo‘ladi. Bu differensialni asosi $S(x)$ ga va balandligi Δx ga teng silindr bilan taqriban almashtirish mumkin. Demak, $dV = S(x)\Delta x$.

3°. dV ni a dan b gacha integrallab, izlanayotgan hajjni topamiz:


$$V = \int_a^b S(x)dx. \quad (2.30)$$

Misollar

1. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ellipsoidning hajmini hisoblaymiz.

Ellipsoidning koordinatalar boshidan x ($-a \leq x \leq a$) masofada o‘tuvchi Ox o‘qqa perpendikulyar tekislik bilan kesamiz. Kesimda yarim o‘qlari $b(x) = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ va $c(x) = c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ bo‘lgan ellips hosil bo‘ladi. Uning yuzasi $S(x) = \pi b(x)c(x) = \pi bc\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$. U holda

$$V = \int_{-a}^a \pi bc\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)dx = \pi bc\left(x - \frac{x^3}{3a^2}\right) \Big|_{-a}^a = \frac{4}{3}\pi abc.$$




18-shakl

2. $x^2 + y^2 = 9$ va $x^2 + z^2 = 9$ silindrlar bilan chegaralangan jism hajmini hisoblaymiz. Berilgan jismning I oktantda ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) joylashgan sakkizdan bir bo'lagini qaraymiz. Uning Ox o'qqa perpendikular tekislik bilan kesimi kvadratdan iborat. Kesim abssissasi $(x; 0; 0)$ nuqtadan o'tganda kvadratning tomonlari $a = y = z = \sqrt{9 - x^2}$ ga va yuzasi $S(x) = 9 - x^2$ ga teng bo'ladi, bu yerda $0 \leq x \leq 3$.

Jismning hajjni (2.30) formula bilan hisoblaymiz:

$$V = 8 \int_0^3 (9 - x^2) dx = 8 \left(9x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^3 = 144.$$



19-shakl

Aylanish jismlarining hajmini hisoblash

Yuqorida $y = f(x)$ uzlusiz funksiya grafigi bilan, quyidan Ox o'q bilan, yon tomonlaridan $x=a$ va $x=b$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsiyaning Ox o'q atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini hisoblaymiz. Bu jismning ixtiyoriy ko'ndalang kesimi doiradan iborat. Shu sababli jismning $X=x$ tekislik bilan kesimining yuzasi $S(x)=\pi y^2$ bo'ladi.

U holda (2.30) formulaga ko'ra

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx. \quad (2.31)$$

Shu kabi Yuqorida $y = f(x)$ uzlusiz funksiya grafigi bilan, quyidan Ox o'q bilan, yon tomonlaridan $x=a$ va $x=b$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsiyani Oy o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmi quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$V = 2\pi \int_a^b y x dx. \quad (2.32)$$

Agar egri chiziqli trapetsiya $x=\varphi(y)$ uzlusiz funksiya grafigi, Oy o'qi,

$y=c$ va $y=d$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan bo'lsa, u holda

$$V = \pi \int_c^d x^2 dy \quad (Oy) \quad \left(V = 2\pi \int_c^d x y dy \quad (Ox) \right) \quad (2.33)$$

bo‘ladi.


$r = r(\varphi)$ egri chiziq va $\varphi = \alpha, \varphi = \beta$ nurlar bilan chegaralangan egri chiziqlari sektorning qutb o‘qi atrofida aylanishidan hosil bo‘lgan jismning hajmi

$$V = \frac{2\pi}{3} \int_{\alpha}^{\beta} r^3 \sin \varphi d\varphi \quad (2.34)$$

formula bilan topiladi.

Misollar

1. $x = y^2, y = 0$ va $x = a$ ($a > 0$) chiziqlar bilan chegaralangan tekis shaklning



20-shakl

uchburchakning balandlik bo‘ylab aylanishidan hosil bo‘lgan jism tenglamasi $y = kx$ bo‘lsin deymiz.

U holda

$$y = kx, k = \operatorname{tg} \varphi = \frac{R}{H}, y = \frac{R}{H} x.$$

Bundan


$$V = \pi \int_0^a y^2 dx = \pi \int_0^a \frac{R^2}{H^2} x^2 dx = \frac{\pi R^2}{H^2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^a$$

3. $y = \cos x$ va $y = -1$ chiziqlar bilan chegaralangan tekis shaklning $-\pi \leq x \leq \pi$ da $y = -1$ to‘g‘ri chiziq atrofida aylanishidan hosil bo‘lgan jismning hajmini hisoblaymiz. Egri chiziq $y = -1$

Ox o‘q aylanishidan hosil bo‘lgan jismning hajmini (2.31) formula bilan hisoblaymiz:

$$V = \pi \int_0^a (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^a x dx = \pi \frac{x^2}{2} \Big|_0^a = \frac{\pi a^2}{2}.$$

2. Radiusi R ga va balandligi H ga teng bo‘lgan konusning hajmini hisoblaymiz. Bunda konusnni katetlari R va H bo‘lgan to‘g‘ri burchakli yo‘nalgan Ox o‘q atrofida deyish mumkin. Gipotenuza



to‘g‘ri chiziq atrofida aylangani uchun yangi koordinatalar sistemasiga o‘tish maqsadga muvofiq bo‘ladi: $x' = x$, $y' = y + 1$.

U holda aylanish jismining hajmi

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-x}^x (y')^2 dx' = \pi \int_{-x}^x (y+1)^2 dx = \\ &= \pi \int_{-x}^x (\cos x + 1)^2 dx = \pi \int_{-x}^x (1 + 2\cos\varphi + \cos^2\varphi) d\varphi = \\ &= \pi(\varphi + 2\sin\varphi) \Big|_{-x}^x + \frac{1}{2}\pi \int_0^{\pi} (1 + \cos 2\varphi) d\varphi = 2\pi^2 + \frac{1}{2}\pi \left(\varphi + \frac{1}{2}\sin 2\varphi \right) \Big|_{-x}^x = 3\pi^2. \end{aligned}$$

4. $r = a(1 - \cos\varphi)$ kardiodidan qutb o‘qi atrofida aylanishidan hosil bo‘lgan jismning hajmini hisoblaymi. Bunda φ burchak 0 dan π gacha o‘zgaradi. U holda (2.34) formulaga ko‘ra

2.10. Aniq integralning mexanika masalalariga tatbiqlari

1. Momentlar va og‘irlik markazini hisoblash

Tekis shakl va aylanish sirti yuzalarini, tekis egri chiziq yoyi uzunligini, hajmlarini hisoblashga oid yuqorida keltirilgan masalalarni I sxema asosida yechishda aynan bir xil usul qo‘llaniladi. Bunda izlanilayotgan Q kattalikni hisoblash integral yig‘indi limitini topishga keltiriladi. Barcha masalalarda Q kattalik biror $[a;b]$ kesma va bu kesmadagi uzlusiz funksiaylarga bog‘liq holda o‘rganiladi.

Shu kabi Q kattalik quyidagi xossalarga ega deb faraz qilamiz:

1°. Additivlik xossasi. $[a;b]$ kesma istalgancha bo‘laklarga bo‘linganida ham

$$Q = \sum_{i=1}^n Q_i \text{ bo‘ladi, bu yerda } Q_i - Q \text{ ning } i - \text{bo‘lakdagi qiymati;}$$

2°. Kichiklikdagi chiziqlilik xossasi. $[a;b]$ kesmadagi istalgan kichik $[x_{i-1}; x_i]$ kesmada $Q \approx k\Delta x$, bo‘ladi, bu yerda $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

Quyida keltiriladigan momentlarni, og‘irlik markazi va kuchning bajargan ishini hisoblash formulalari ham yuqoridagi singari hosil qilinadi. Shu sababli bu formulalarni keltirib chiqarmaymiz va ulardan masalalarni yechishda foydalanamiz.

Oxtekislikda massalari mos ravishda m_1, m_2, \dots, m_n bo‘lgan $A_1(x_1; y_1), A_2(x_2; y_2), \dots, A_n(x_n; y_n)$ nuqtalar sistemasi berilgan bo‘lsin.

Sistemaning Ox (Oy) o‘qqa nisbatan statik momenti M_x (M_y) deb nuqtalar massalarini ularning ordinatalariga (absissalariga) ko‘paytmalari yig‘indisiga aytildi, ya’ni

$$M_x = \sum_{i=1}^n m_i y_i \quad \left(M_y = \sum_{i=1}^n m_i x_i \right).$$

Sistemaning Ox (Oy) oqqa nisbatan inersiya momenti J_x (J_y) deb nuqtalar massalarini ularning ordinatalari (absissalari) kvadratiga ko‘paytmalari yig‘indisiga aytildi, ya’ni

$$J_x = \sum_{i=1}^n m_i y_i^2 \quad \left(J_y = \sum_{i=1}^n m_i x_i^2 \right).$$

Sistemaning og‘irlik markazi deb koordinatalari $\left(\frac{M_y}{m}, \frac{M_x}{m} \right)$ bo‘lgan nuqtalarga aytildi, bu yerda $m = \sum_{i=1}^n m_i$.

2. Tekis egri chiziqning momentlari va og‘irlik markazi

Oxy tekislikda AB egri chiziq $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) tenglama bilan berilgan va egri chiziqning har bir nuqtasida $\gamma = \gamma(x)$ zichlik va $f(x)$ funksiya $f'(x)$ hosilasi bilan birga uzliksiz bo‘lsin.

U holda AB egri chiziqning momentlari va og‘irlik markazining koordinatalari quyidagi formulalar bilan aniqlanadi:

$$M_x = \int_a^b \gamma y dl, \quad M_y = \int_a^b \gamma x dl; \quad (1)$$

$$J_x = \int_a^b \gamma y^2 dl, \quad J_y = \int_a^b \gamma x^2 dl; \quad (2)$$

$$x_c = \frac{\int_a^b \gamma x dl}{\int_a^b \gamma dl}, \quad y_c = \frac{\int_a^b \gamma y dl}{\int_a^b \gamma dl}, \quad (3)$$

bu yerda $y = f(x)$, $\gamma = \gamma(x)$, $dl = \sqrt{1+y'^2} dx$, $a \leq x \leq b$.

Misol

Zichligi $\gamma = 1$ ga teng bo‘lgan $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, $|x| \leq R$ yarim aylananing momentlari va og‘irlik markazini topamiz. Bunda $y' = -\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}}$ bo‘lgani uchun $dl = \frac{R dx}{\sqrt{R^2 - x^2}}$.

U holda (1) - (3) formulalardan topamiz:

$$M_x = \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} \frac{Rdx}{\sqrt{R^2 - x^2}} = R \int_{-R}^R dx = Rx \Big|_{-R}^R = 2R^2,$$

$$M_y = \int_{-R}^R \frac{xRdx}{x\sqrt{R^2 - x^2}} = -R\sqrt{R^2 - x^2} \Big|_{-R}^R = 0.$$

$$J_x = \int_{-R}^R (R^2 - x^2) \frac{Rdx}{\sqrt{R^2 - x^2}} = R \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} dx = R \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} R^2 \cos^2 t dt =$$

$$= R^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{R^3}{2} \left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi R^3}{2},$$

$$J_y = \int_{-R}^R \frac{x^2 Rdx}{x\sqrt{R^2 - x^2}} = R \left(-x\sqrt{R^2 - x^2} \Big|_{-R}^R + \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} dx \right) = R \left(0 + \frac{\pi R^2}{2} \right) = \frac{\pi R^3}{2}.$$

$$\int dl = \int_{-R}^R \frac{Rdx}{\sqrt{R^2 - x^2}} = R \arcsin \frac{x}{R} \Big|_{-R}^R = \pi R,$$

$$x_c = 0, y_c = \frac{2R^3}{\pi R} = \frac{2R}{\pi}.$$

3. Tekis shaklning momentlari va og'irlik markazi

Ox tekislikda $[a; b]$ kesmada uzluksiz bo'lgan $y = f(x)$ funksiya grafigi, Ox o'q, $x=a$ va $x=b$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsiya (tekis shakl) berilgan va tekis shaklning har bir nuqtasida $\gamma = \gamma(x)$ zichlik uzluksiz bo'lsin. U holda tekis shaklning momentlari va og'irlik markazining koordinatalari quyidagi formulalar orqali topiladi:

$$M_x = \frac{1}{2} \int_a^b y y^2 dx, \quad M_y = \int_a^b y x y dx; \quad (4)$$

$$J_x = \frac{1}{2} \int_a^b y y^3 dx, \quad J_y = \int_a^b y x^2 y dx; \quad (5)$$

$$x_c = \frac{\int_a^b y x y dx}{\int_a^b y y dx}, \quad y_c = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b y y^2 dx}{\int_a^b y y dx}, \quad (6)$$

bu yerda $\gamma = \gamma(x)$, $y = y(x)$, $a \leq x \leq b$.

Misollar

- $y = \sin x$ sinusoida yoyi va Ox o'qining $0 \leq x \leq \pi$ bo'lagi bilan chegaralangan, zichligi $\gamma = 1$ ga teng figuraning og'irlik markazini topamiz. Bunda. sinusoidaning simmetrikligidan $x_c = \frac{\pi}{2}$ bo'ladi.


U holda

$$M_x = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} y^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{4} \left(x - \frac{\sin 2x}{2} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{4}.$$

$$\int_0^{\pi} y dx = \int_0^{\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = 2, \quad y_c = \frac{4}{2} = \frac{\pi}{8}.$$

Demak,

$$x_c = \frac{\pi}{2}, \quad y_c = \frac{\pi}{8}.$$



2. Asosi b ga va balandligi h ga teng uchburchakning asosiga nisbatan momentini toping.

Ox o‘qni uchburchakning asosi bo‘ylab va Oy o‘qni balandlik bo‘ylab yo‘naltiramiz. Uchburchakni qalinligi dy ga teng cheksiz yupqa gorizontal tasmalarga bo‘lamiz. Bu tasmalar elementar massalar rolini o‘ynaydi.

Uchburchaklarning o‘xshashlik alomatiga ko‘ra:


$$dm = b \frac{h-y}{h} dy,$$

$$dJ_x = y^2 dm = \frac{b}{h} y^2 (h-y) dy.$$

Bundan

$$J_x = \frac{b}{h} \int_0^h y^2 (h-y) dy = \frac{b}{3} y^3 \Big|_0^h - \frac{b}{4h} y^4 \Big|_0^h = \frac{1}{12} bh^2.$$

3. $4x^2 + 9y^2 = 36$ ellips va $x^2 + y^2 = 9$ aylanalar bilan chegaralangan tekis shaklning birinchi charokdagisi bo‘lagi og‘irlik markazini topamiz:



$$M_y = \int_0^3 x(y_2 - y_1) dx = \int_0^3 x \left(\sqrt{9 - x^2} - \frac{2}{3} \sqrt{9 - x^2} \right) dx = \frac{1}{3} \int_0^3 x \sqrt{9 - x^2} dx =$$

$$= -\frac{1}{6} \int_0^3 \sqrt{9 - x^2} d(9 - x^2) = -\frac{1}{9} (9 - x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^3 = 3.$$

$$M_x = \frac{1}{2} \int_0^3 (y_2^2 - y_1^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^3 x \left((9 - x^2) - \frac{4}{9} (9 - x^2) \right) dx =$$

$$= \frac{5}{18} \int_0^3 (9 - x^2) dx = \frac{5}{18} \left(9x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^3 = 5.$$

Radiusi 3 ga teng doiraning yuzasi

$\frac{9\pi}{4}$ ga, yarim o‘qlari $a=3$, $b=2$ bo‘lgan

ellips chorak qismining yuzasi $\frac{3\pi}{2}$ ga

teng bo‘lgani uchun qaralayotgan tekis shakl yuzasi $S = \frac{9\pi}{4} - \frac{3\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}$ ga teng bo‘ladi. Sunday qilib,

$$x_c = \frac{M_y}{S} = \frac{4}{\pi}, \quad y_c = \frac{M_x}{S} = \frac{20}{3\pi}.$$

4. Kuchning bajargan ishini hisoblash

Material nuqta o‘zgaruvchan F kuch tasirida Ox o‘qi bo‘ylab harakatlanayotgan bo‘lsin va bunda kuchning yo‘nalishi harakat yo‘nalishi bilan bir xil bo‘lsin. U holda F kuchning material nuqtani Ox o‘qi bo‘ylab $x=a$ nuqtadan $x=b$ ($a < b$) nuqtaga ko‘chirishda bajargan ishi quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$A = \int_a^b F(x) dx, \quad (7)$$

bu yerda $F(x)$ funksiya $[a;b]$ kesmada uzluksiz.

Misollar:

1. Agar prujina $1H$ kuch ostida $1 sm$ ga cho‘zilsa, uni $6 sm$ cho‘zish uchun qancha ish bajarish kerak bo‘lishini topamiz. Guk qonuniga muvofiq F kuch va x cho‘zilish o‘zaro $F = kx$ bog‘lanishga ega. Proporsionallik koeffitsiyentini masalaning shartidan topamiz:

$$x=1 \text{ sm} = 0,01 \text{ mda } F=1H, \text{ ya’ni } 1=k \cdot 0,01.$$

Bundan, $k=100$ va $F=100x$.

U holda

$$A = \int_0^{0.06} 100x dx = 50x^2 \Big|_0^{0.06} = 0.18 \text{ (J)}.$$

2. m massali kosmik kemani erdan h masofaga uchurish uchun qancha ish bajarish kerak bo'lishini topamiz. Butun olam tortishish qonuniga ko'ra yerning jismni tortish kuchi $F = k \frac{mM}{x^2}$ ga teng, bu yerda M -yerning massasi, x - yer markazidan kosmik kemagacha bo'lgan masofa, k - gravtasiya doimiyligi. Yer sirtida, ya'ni $x=R$ da $F=mg$ ga teng, bu yerda g - erkin tushish tezlanishi.

U holda

$$mg = k \frac{mM}{R^2}.$$

$$\text{Bundan } kM = gR^2 \text{ va } F = mg \frac{R^2}{x^2}.$$

Izlanayotgan ishni (7) formula bilan topamiz:

$$A = \int_R^{R+h} mg \frac{R^2}{x^2} dx = -mgR^2 \frac{1}{x} \Big|_R^{R+h} = -mgR^2 \left(\frac{1}{R+h} - \frac{1}{R} \right) = mgR \frac{h}{R+h}.$$

Agar kosmik kema cheksizlikka ketsa, ya'ni $h \rightarrow \infty$ da $A = mgR$ bo'ladi.

3.. Ikkita e_0 va e elektr zaryadi mos ravishda Ox o'qining $x_0 = 0$ va $x_1 = a$ nuqtalrida joylangan. Ikkinchisi zaryadni $x_2 = b$ ($b > a$) masofaga ko'chirish uchun kerak bo'ladigan ishni topamiz. Kulon qonuniga ko'ra e_0 zaryad e zaryadni

$$F = \frac{e_0 e}{x^2} \text{ kuch bilan itaradi, bu yerda } x \text{-zaryadlar orasidagi masofa.}$$

Izlanayotgan ishni (18.4) formula bilan topamiz:

$$A = \int_a^b e_0 e \frac{dx}{x^2} = -e_0 e \frac{1}{x} \Big|_a^b = -e_0 e \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) = \frac{e_0 e(b-a)}{ab}.$$

5. Jismning bosib o'tgan yo'li

Material nuqta (jism) to'g'ri chiziq bo'ylab o'zgaruvchan $v = v(t)$ tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsin. Bu nuqtaning t_1 dan t_2 gacha vaqt oralig'ida bosib o'tgan yo'lini topamiz.

Hosilaning fizik ma'nosiga ko'ra nuqtaning bir tomoniga harakatida «to'g'ri chiziqli» harakat tezligi yo'ldan vaqt bo'yicha

olingan hosilaga teng», ya'ni $v(t) = \frac{dS}{dt}$. Bundan $dS = v(t)dt$. Bu tenglikni t_1 dan t_2 gacha integrallaymiz:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} v(t)dt. \quad (8)$$

Izoh. Bu formulani aniq integralni qo'llash sxemalari bilan topish mumkin.

Misol

Material nuqtaning tezligi $v = 2(6-t)$ m/s qonun bilan o'zgaradi. Nuqtaning harahat boshidan eng katta uzoqlashishini topami:

$$S = \int_0^6 2(6-t)dt = 12t - t^2.$$

Nuqtaning eng katta uzoqlashishini yo'lni vaqtning funksiyasi sifatida qarab, topamiz: $S' = 12 - 2t$. $t = 6$ da $S' = 0$ bo'ladi.

Bundan

$$S_{\max} = 12 \cdot 6 - 6^2 = 36 \text{ m.}$$

6. Suyuqlikning vertikal plastinkaga bosimi

Paskal qonuniga ko'ra suyuqlikning gorizontal plastinkaga bosimi $P = g \cdot \gamma \cdot S \cdot h$

formula bilan topiladi, bu yerda g - erkin tushish tezlanishi, γ - suyuqlik zichligi, S - plastinkaning yuzasi, h - plastinkaning botish chuqurligi.

Plastinkaning vertikal botishida suyuqlikning plastinkaga bosimini bu formula bilan topib bo'lmaydi, chunki plastinkaning har xil nuqtalari turli chuqurlikda yotadi.

Suyuqlikka $x=a$, $x=b$, $y_i = f_i(x)$,

$y_i = f_i(x)$ chiziqlar bilan chegaralangan plastinka vertikal botirilayotgan bo'lsin. Bunda koordinatalar sistemasi 24-shaklda ko'rsatilganidek tanlangan bo'lsin. Shuyuqlikning plastinkaga P bosimini topish II sxemadan foydalanamiz.

Bunda: 1°. Izlanayotgan P kattalikning bir qismi x ning funksiyasi bo'lsin:

$p = p(x)$, ya'ni $p = p(x)$ - plastinkaning x o'zgaruvchi $[a; x]$ kesmasiga mos qismiga suyuqlik bosimi, bu yerda $x \in [a; b]$ ($p(a) = 0$ va $p(b) = P$).

2°. x argumentga $\Delta x = dx$ orttirma beramiz. Bunda $p(x)$ funksiya Δp orttirma oladi (24-shaklda - dx qalililikdagi tasma). Funksiyaning dp differensialni topamiz. dx kichik ekanidan tasmani barcha nuqtalari bitta chuqurlikda yotuvchi to‘g’ri to‘rtburchak deb hisoblaymiz, ya’ni plastinka gorisontal bo‘lsin deymiz. U holda Paskal qonuniga ko‘ra

$$dp = g \cdot \gamma \cdot \underbrace{(y_2 - y_1)}_s \cdot dx \cdot h.$$

3°. dp ni $x=a$ dan $x=b$ gacha integrallaymiz:

$$P = g \cdot \gamma \cdot \int_a^b (y_2 - y_1) x dx$$

yoki

$$P = g \cdot \gamma \cdot \int_a^b (f_2(x) - f_1(x)) x dx. \quad (9)$$

Misol

Asoslari a va b ga, balandligi h ga teng bo‘lgan teng yonli trapetsiya shaklidagi plastinka suyuqlikka c chuqurlikda botirilgan.

Suyuqlikning plastinkaga bosimini topamiz.

Izlanayotgan bosim (9) formulaga ko‘ra

$$P = g \gamma \int_c^{c+h} y x dx$$

bo‘ladi.


y o‘zgaruvchini x

o‘zgaruvchi orqali ifodalash uchun CMN va CKB uchburchaklarning o‘xshashligidan foydalanamiz:


$$\frac{y-a}{b-a} = \frac{x-c}{h}.$$

$$\text{Bundan } y = a + \frac{b-a}{h} (x - c).$$

U holda



24-shakl



25-shakl

$$P = g\gamma \int_c^{c+h} \left(a + \frac{b-a}{h}(x-c) \right) x dx = g\gamma \left(\frac{ax^2}{2} + \frac{b-a}{h} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{cx^2}{2} \right) \right) \Big|_c^{c+h} = \\ = g\gamma \left(\frac{a+b}{2} ch + \frac{h^2}{6} (a+2b) \right).$$

Amaliy mashg'ulotda yechiladigan misollar.

1. $r = 2R\sin\varphi$ bir jinsli aylananing og'irlik markazini toping.
2. $x = a\cos^3 t$, $y = a\sin^3 t$ bir jinsli astroidaning Ox o'qdan yuqorida yotgan yoyining og'irlik markazini toping.
3. $4x + 3y - 12 = 0$ bir jinsli to'g'ri chiziqning koordinata o'qlari orasida joylashgan kesmasining koordinata o'qlariga nisbatan statik momentlarini toping.
4. $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 2$ ciziqlar bilan chegaralangan bir jinsli tekis shaklning koordinata o'qlariga nisbatan statik va inersiya momentlarini, og'irlik markazini toping.
5. $y = 4 - x^2$ va $y = 0$ bir jinsli chiziqlar bilan chegaralangan figuraning og'irlik markazini toping.
6. Yarim o'qlari $a = 5$ va $b = 4$ bo'lgan bir jinsli ellipsning koordinata o'qlariga nisbatan inersiya momentini toping.
7. $x^2 + y^2 = R^2$ aylananing birinchi chorakda joylashgan bo'lagining o'g'rilik markazini toping. Bunda aylananing har bir nuqtasidagi chiziqli zichligi shu nuqta koordinatalarining ko'paytmasiga proporsional.
8. $x = 8\cos^3 t$, $y = 4\sin^3 t$ astroida birinchi chorakda yotgan yoyining koordinata o'qlariga nisbatan statik momentlarini va massasini toping. Bunda astroidaning har bir nuqtasidagi chiziqli zichligi x ga teng.
9. Prujinani 4 sm.ga cho'zish uchun 24 J ish bajariladi. 150 J ish bajarilsa, prujinana qanday uzunlikka cho'ziladi?
10. Agar prujinani 1 sm.ga siqish uchun 1 kG kuch sarf qilinsa, prujinaning 8 sm.ga siqishda sarf bo'ladigan F kuch bajargan ishni toping.
11. Uzunligi 0,5 m. va radiusi 4 mm. bo'lgan mis simni 2 mm. cho'zish uchun qancha ish bajarish kerak? Bunda $F = E \frac{\Delta x}{l}$, $E = 12 \cdot 10^4$ N/mm².

12. Og‘irligi $P=1,5\text{ T}$ bo‘lgan kosmik kemani yer sirtidan $h=2000\text{ km}$. masofaga uchirish uchun bajarilishi kerak bo‘ladigan ishni toping.

Mustaqil yechish uchun misollar.

1. Jismning to‘g‘ri chiziqli harakat tezligi $v=2t+3t^2\text{ (m/s)}$ formula bilan ifodalanadi. Jismning harakat boshlanishidan 5 s. davomida bosib o‘tgan yo‘lini toping.

2. Nuqtaning harakat tezligi $v=0,1t^3\text{ (m/s)}$ ga teng. Nuqtaning 10 s. davomidagi o‘rtacha tezligini toping.

3. Sportchining parashutdan tushish tezligi $v=\frac{mg}{k}\left(1-e^{-\frac{kt}{m}}\right)$

formula bilan ifodalanadi, bu yerda g -erkin tushish tezlanishi, m -sportchining massasi, k - proporsionallik koefitsiyenti. Agar parashutdan tushish 3 min. davom etgan bo‘lsa, sportchi qanday balandlikdan sakragan?

4. Nuqtaning harakat tezligi $v=0,1e^{-0,01t}\text{ (m/s)}$ ga teng. Nuqtaning harakat boshlanishidan harakat to‘xtaguncha bosib o‘tgan yo‘lini toping.

5. Suyuqlikka vertikal botirilgan asoslari a va b ($b>a$) ga, balandligi h ga teng bo‘lgan teng yonli trapetsiya shaklidagi plastinkaga suyuqlikning bosimini toping.

6. Asosi 18 m. Va balandligi 6 m. bo‘lgan to‘rt burchakli shluzga suv bosimini toping.

7. Diametri 6 m. bo‘lgan va suv sathida joylashgan yarim doira shaklidagi vertikal devorga suv bosimini toping. Suv zichligi $\gamma=1000\text{ kg/m}^3$.

2.11. Xosmas integrallar

$\int_a^b f(x)dx$ integral mavjud bo‘lishi uchun ikkita shartning bajarilishi talab qilingan edi: 1) integrallash chegarasi chekli $[a;b]$ kesmadan iborat bo‘lishi; 2) integral ostidagi funksiya $[a;b]$ kesmada aniqlangan va chegaralangan bo‘lishi.

Agar aniq integral uchun keltirilgan shartlardan biri bajarilmasa, u holda integralga xosmas integral deyiladi. Agar faqat birinchi shart o'rini bo'lmasa, integralga cheksiz chegarali xosmas integral (yoki I tur xosmas integral) deyiladi. Agar faqat ikkinchi shart bajarilmasa, ya'ni integral ostidagi funksiya $[a; b]$ kesmada uzilishga ega bo'lsa, integralga chegaralanmagan funksiyaning xosmas integrali (yoki II tur xosmas integral) deyiladi.

1. Cheksiz chegarali xosmas integrallar

(I tur xosmas integrallar)

1-ta'rif. $f(x)$ funksiya $[a; +\infty)$ oraliqda uzluksiz bo'lsin. Agar $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx$ chekli limit mavjud bo'lsa, bu limitga yuqori chegarasi cheksiz xosmas integral deyiladi va $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ kabi belgilanadi, ya'ni

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx. \quad (1)$$

Bu holda $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ integralga yaqinlashuvchi integral deyiladi.

Agar $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx$ limit mayjud bo'lmasa yoki cheksiz bo'lsa $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ integralga uzoqlashuvchi integral deyiladi.

Quyi chegarasi cheksiz va har ikkala chegarasi cheksiz xosmas integrallar shu kabi aniqlanadi:

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx, \quad (2)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_b^{+\infty} f(x)dx, \quad (3)$$

bu yerda c - o'qning istalgan fiksirlangan nuqtasi.

Bunda (3) tenglikning chap tomonidagi xosmas integral, o'ng tomonidagi har ikkala xosmas integral yaqinlashganda yaqinlashadi.

Misollar

1. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ ($\alpha > 0$) integralni yaqinlashishga tekshiramiz. $\alpha \neq 1$ bo'lsin.

U holda

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Big|_1^b = \frac{1}{1-\alpha} (\lim_{b \rightarrow +\infty} b^{1-\alpha} - 1).$$

Bunda: 1) $\alpha < 1$ bo'lganda $\int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha} (\lim_{b \rightarrow +\infty} b^{1-\alpha} - 1) = +\infty$,

2) $\alpha > 1$ bo'lganda,

$$3) \alpha = 1 \text{ bo'lganda } \int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln x \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln b = +\infty.$$

Demak, $\int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha}$ xosmas integral $\alpha > 1$ da yaqinlashadi va $0 < \alpha \leq 1$ da uzoqlashadi.

2. $\int_{-\infty}^0 x \cos x dx$ integralni yaqinlashishga tekshiramiz.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 x \cos x dx &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 x \cos x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(x \sin x \Big|_a^0 - \int_a^0 \sin x dx \right) = \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} (-a \sin a + \cos x \Big|_a^0) = \lim_{a \rightarrow -\infty} (-a \sin a - \cos a + 1). \end{aligned}$$

Bu limit mavjud emas. Shu sababli $\int_{-\infty}^0 x \cos x dx$ integral uzoqlashadi.

3. $\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{x^2 + 6x + 10}$ integralni yaqinlashishga tekshiramiz. Oraliq nuqtani $c = 0$ deymiz. U holda (3) tenglikga ko'ra

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{x^2 + 6x + 10} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{x^2 + 6x + 10} + \int_0^\infty \frac{dx}{x^2 + 6x + 10}.$$

Bundan

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{x^2 + 6x + 10} &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{(x+3)^2 + 1} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \arctg(x+3) \Big|_a^0 = \\ &= \arctg 3 - \lim_{a \rightarrow -\infty} \arctg(a+3) = \arctg 3 + \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{dx}{x^2 + 6x + 10} &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{(x+3)^2 + 1} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctg(x+3) \Big|_0^b = \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctg(b+3) - \arctg 3 = \frac{\pi}{2} - \arctg 3. \end{aligned}$$

U holda

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{x^2 + 6x + 10} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{x^2 + 6x + 10} + \int_0^\infty \frac{dx}{x^2 + 6x + 10} = \\ &= \arctg 3 + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \arctg 3 = \pi. \end{aligned}$$

Demak, xosmas integral yaqinlashadi.

2. Chegaralanmagan funksiyalarning xosmas integrallari

(II tur xosmas integrallar)

2-ta'rif. $f(x)$ funksiya $[a; b]$ oraliqda aniqlangan va uzluksiz bo'lib, $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_a^{b-\epsilon} f(x)dx$ chekli limit mavjud bo'lsa, bu limitga $f(x)$ funksiyadan olingan xosmas integral deyiladi va $\int_a^b f(x)dx$ kabi belgilanadi.

Shunday qilib,

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_a^{b-\epsilon} f(x)dx. \quad (4)$$

Shunga o'xshash: 1) agar $f(x)$ funksiya x ning a ga o'ngdan yaqinlashishda uzilishga ega bo'lsa

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{a+\epsilon}^b f(x)dx; \quad (5)$$

bo'ladi;

2) agar $f(x)$ funksiya $c \in [a; b]$ da uzilishga ega bo'lsa, u holda

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_a^{c-\epsilon} f(x)dx + \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{c+\epsilon}^b f(x)dx \quad (6)$$

bo'ladi.

Bu xosmas integrallar uchun yaqinlashish (uzoqlashish) tushunchalari cheksiz chegarali integrallardagi kabi kiritiladi.

Misollar

1. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ integralni yaqinlashishga tekshiramiz. $x=1$ da integral ostidagi funksiya ikkinchi tur uzilishga ega.

U holda (4) tenglikka ko'ra

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_0^{1-\epsilon} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \arcsin x \Big|_0^{1-\epsilon} = \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} (\arcsin(1-\epsilon) - 0) = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Demak, xosmas integral yaqinlashadi

2. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x\sqrt{|x|}}$ integralni yaqinlashishga tekshiramiz. $x=0$ da integral ostidagi funksiya uzilishga ega.

U holda (6) tenglikka ko'ra

$$\int_{-1}^{\epsilon} \frac{dx}{x\sqrt[3]{x}} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-1}^{\epsilon} \frac{dx}{x\sqrt[3]{x}} + \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\epsilon}^{1} \frac{dx}{x\sqrt[3]{x}} = -3 \lim_{\epsilon \rightarrow 0} x^{\frac{1}{3}} \Big|_{-1}^{\epsilon} - 3 \lim_{\epsilon \rightarrow 0} x^{\frac{1}{3}} \Big|_{-\epsilon}^{1} =$$

Demak, xosmas integral uzoqlashadi. Bunga Nyuton-Leybnits formulasi formal tarzda qo'llanilsa, u holda xato natija kelib chiqadi:

$$\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x\sqrt[3]{x}} = -\frac{3}{\sqrt[3]{x}} \Big|_{-1}^{1} = -6.$$

3. Xosmas integrallarning yaqinlashish alomatlari

Ko'pincha xosmas integralni (1) - (6) formulalar orqali hisoblash shart bo'lmasdan faqat uning yaqinlashuvchi yoyi uzoqlashuvchi bo'lishini bilish yetarli bo'ladi. Bunday hollarda berilgan integralning yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchi bo'lishi yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchiligi oldindan ma'lum bo'lgan boshqa xosmas integral bilan taqqoslash orqali aniqlanadi. Xosmas integrallarning taqqoslash alomatlarni ifodalovchi teoremlarni isbotsiz keltiramiz.

1-teorema (I tur xosmas integralning yaqinlashish alomati). $[a;+\infty)$ oraliqda $f(x)$ va $\phi(x)$ funksiyalar uzlucksiz bo'lsin va $0 \leq f(x) \leq \phi(x)$ tengsizlikni qanoatlantirsin. U holda:

- 1) agar $\int_a^{\infty} \phi(x)dx$ integral yaqinlashsa $\int_a^{\infty} f(x)dx$ integral yaqinlashadi;
- 2) agar $\int_a^{\infty} f(x)dx$ integral uzoqlashsa $\int_a^{\infty} \phi(x)dx$ integral uzoqlashadi.

Misollar

1. $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$ integralni yaqinlashishga tekshirami. Puasson integrali deb ataluvchi bu integral boshlang'ich funksiya ega emas.

Bunda

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx + \int_1^{\infty} e^{-x^2} dx.$$

$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$ integral xosmas integral emas va u chekli son qiymatiga ega.

$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$ integralni qaraymiz. $[1;+\infty)$ oraliqda $0 < e^{-x^2} \leq e^{-x}$ bo'ladi, e^{-x^2} va e^{-x} funksiyalar uzlucksiz. U holda

$$\int_a^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-x}) \Big|_a^b = \frac{1}{e} - \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{e^b} = \frac{1}{e}.$$

Demak, bu integral yaqinlashadi va 1-teoremaning birinchi bandiga asosan

Puasson integrali ham yaqinlashadi.

2-teorema (II tur xosmas integralning yaqinlashish alomati).

[a; b) oraliqda $f(x)$ va $\varphi(x)$ funksiyalar uzluksiz bo'lsin va $0 \leq f(x) \leq \varphi(x)$ tengsizlikni qanoatlantirsın, $x=b$ da $f(x)$ va $\varphi(x)$ funksiyalar aniqlanmagan yoki uzilishga ega bo'lsin. U holda:

1) agar $\int_a^b \varphi(x) dx$ integral yaqinlashsa $\int_a^b f(x) dx$ integral yaqinlashadi;

2. $\int_a^b \frac{dx}{e^x - \cos x}$ integralni yaqinlashishga tekshiramiz. Integral ostidagi funksiya $x=0$ da uzilishga ega.

$$x \in (0, 1] \text{ da } \frac{1}{e^x - \cos x} \geq \frac{1}{xe}.$$

Bundan

$$\int_0^b \frac{dx}{xe} = \frac{1}{e} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^b \frac{dx}{x} = \frac{1}{e} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \ln|x| \Big|_{\varepsilon}^b = \frac{1}{e} (0 - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \ln|\varepsilon|) = +\infty.$$

Demak, $\int_a^b \frac{dx}{xe}$ integral uzoqlashadi va 2-teoremaning ikkinchi bandiga asosan berilgan integral ham uzoqlashadi.

2) agar $\int_a^b f(x) dx$ integral uzoqlashsa $\int_a^b \varphi(x) dx$ integral uzoqlashadi.

Taqqoslash teoremasi faqat nomanfiy funksiyalarga tegishli. Ishorasi almashadigan funksiyalarning xosmas integrallari uchun quyidagi alomat o'rini bo'ladi.

3-teorema. Agar $\int_a^{\infty} |f(x)| dx$ ($\int_a^b |f(x)| dx$) integral yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda $\int_a^{\infty} f(x) dx$ ($\int_a^b f(x) dx$) integral yaqinlashuvchi bo'ladi.

Agar $\int_a^{\infty} |f(x)| dx \left(\int_a^b |f(x)| dx \right)$ integral yaqinlashuvchi bo'lsa $\int_a^{\infty} f(x)dx \left(\int_a^b f(x)dx \right)$ xosmas integral absolyut yaqinlashuvchi xosmas integral deyiladi.

Agar $\int_a^{\infty} f(x)dx \left(\int_a^b f(x)dx \right)$ integral yaqinlashuvchi bo'lib, $\int_a^{\infty} |f(x)| dx \left(\int_a^b |f(x)| dx \right)$ integral uzoqlashuvchi bo'lsa $\int_a^{\infty} f(x)dx \left(\int_a^b f(x)dx \right)$ integral shartli yaqinlashuvchi xosmas integral deyiladi.

Misol

$\int_1^{\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$ integralni yaqinlashishga tekshiramiz. Integral ostidagi funksiya $[1; +\infty)$ oraliqda ishorasini almashtiradi.

Ma'lumki, $\left| \frac{\cos x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2}$. va 1-misolga ko'ra $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ integral yaqinlashuvchi.

U holda, 1-teoremaga asosan $\int_1^{\infty} \frac{|\cos x|}{x^2} dx$ integral yaqinlashuvchi va 3-teorema va 3-ta'rifga ko'ra $\int_1^{\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$ integral absolyut yaqinlashuvchi bo'ladi.

(2), (3) ko'rinishdagi ((5),(6) ko'rinishdagi) xosmas integrallar uchun taqqoslash alomatlari hamda absolyut va shartli yaqinlashish tusunchalari yuqorida (1) ko'rinishdagi ((4) ko'rinishdagi) integrallar uchun keltirilgandagi kabi kiritiladi.

III BOB. IKKI KARRALI INTEGRALLAR

3.1. Ikki karrali integral va uning xossalari

Oxy tekislikning L silliq (yoki bo'lakli silliq) yopiq chiziq bilan chegaralangan D sohasida $z = f(x, y)$ yoki $z = f(P)$ funksiya berilgan bo'lsin.

Quyidagi ishlarni bajaramiz.

1. D sohani ixtiyoriy ravishda umumiyl ichki nuqtalarga ega bo'limgan va yuzalari $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$ bo'lgan n ta bo'lakka bo'lamic.

$$\sigma = \sum_{i=1}^n \Delta\sigma_i, \text{ bunda } \sigma - D \text{ sohaning yuzasi.}$$

2. $\Delta\sigma_i$ yuzalarning har birida $P_i(x_i; y_i)$ nuqtani tanlab, bu nuqtada $z = f(x, y)$ funksianing qiymatini hisoblaymiz va uni $\Delta\sigma_i$ ga ko'paytiramiz:

$$f(x_i, y_i) \Delta\sigma_i.$$

3. Barcha shunday ko'paytmalarining yig'indisini tuzamiz:

$$I_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta\sigma_i. \quad (1)$$


Bu yig'indiga $f(x, y)$ funksiya uchun D sohadagi integral yig'indi deyiladi.

$\Delta\sigma_i$ yuza chegaraviy nuqtalari orasidagi masofalarning (vatarlarning) eng kattasiga shu yuzaning diametri deyiladi va d_i bilan belgilanadi, bunda $n \rightarrow \infty$ da $d_i \rightarrow 0$.

1-ta'rif. Agar (1) integral yig'indining $\max d_i \rightarrow 0$ dagi chekli limiti D sohani bo'laklarga bo'lish usuliga va bu bo'laklarda $P_i(x_i, y_i)$ nuqtani tanlash usuliga bog'liq bo'limgan holda mavjud bo'lsa, u holda bu limitga $f(x, y)$ funksiyadan D soha bo'yicha olingan *ikki karrali integral* deyiladi va $\iint_D f(x, y) d\sigma$ bilan belgilanadi.

Demak,

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta\sigma_i, \quad (2)$$



bu yerda, D – integrallash sohasi, $f(x, y)$ – integral ostidagi funksiya, $\int f(x, y) d\sigma$ – integral ostidagi ifoda, x, y – integrallash o‘zgaruvchilari, $d\sigma$ – yuza elementi deb ataladi.

Ikki karrali integralning mavjudlik teoremasi deb ataluvchi teoremani isbotsiz qabul qilamiz.

1-teorema. Chegaralangan yopiq sohada uzlusiz har qanday $z = f(x, y)$ funksiya uchun ikki karrali integral mavjud bo‘ladi.

Mayjudlik teoremasidan D sohani istalgan ravishda bo‘laklarga, masalan, koordinata o‘qlariga parallel chiziqlar bilan tomonlari Δx , va Δy , ga teng bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchaklarga bo‘lish mumkinligi kelib chiqadi.

Bunday bo‘lishda $\Delta\sigma_i = \Delta x_i \cdot \Delta y_i$ ekanidan

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(x, y) dx dy.$$


2-ta’rif. Quyidan D soha bilan, yuqorida tenglamasi $z = f(x, y)$ bo‘lgan sirt bo‘lagi bilan, yon tomondan Oz o‘qqa parallel yasovchilardan tashkil topgan silindrik sirt bilan chegaralangan jism *silindrik jism* deyiladi.

Agar D sohada $f(x, y) \geq 0$ bo‘lsa, u holda (2.1) integral yig‘indidagi har bir $f(x_i, y_i)\Delta\sigma_i$, qo‘shiluvchi asosi $\Delta\sigma_i$, ga va balandligi $f(x_i, y_i)$ ga teng bo‘lgan silindrik jism hajmiga teng bo‘ladi, ya’ni $\Delta V_i = f(x_i, y_i)\Delta\sigma_i$. Bunda $I_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i)\Delta\sigma_i$ integral yig‘indi ΔV , hajmlar yig‘indisini, boshqacha aytganda zinasimon silindrik jismlar hajmlari yig‘indisini aniqlaydi. U holda $f(x, y)$ funksiyadan D soha bo‘yicha olingan ikki karrali integral quyidan D soha bilan, yuqorida tenglamasi $z = f(x, y)$ bo‘lgan sirt bo‘lagi bilan chegaralangan silindrik jismning V hajmiga teng bo‘ladi, ya’ni

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy. \quad (3)$$

Bu ifoda ikki karrali integralning *geometrik ma’nosini* bildiradi.

Agar D sohada $f(x, y) = 1$ bo‘lsa, u holda ikki karrali integral D soha yuzasiga teng bo‘ladi, ya’ni



2-chizma

$$\sigma = \iint_D dxdy. \quad (4)$$

Agar integral ostidagi funksiya D yassi plastinkada massa taqsimotining zichligi $\gamma(x, y)$ bo'lsa, u holda ikki karrali integral D yassi plastinkaning massasiga teng bo'ladi, ya'ni

$$m = \iint_D \gamma(x, y) dxdy. \quad (5)$$

Bu ifoda ikki karrali integralning *mexanik ma'nosini* anglatadi.

Ikki karrali integral aniq integralning hamma xossalariiga ega bo'lib, u aniq integralning umumlashmasidir. Ikki karrali integral xossalarining isboti aniq integral xossalarining isboti kabi bajariladi. Shu sababli ikki karrali integralning quyidagi xossalari ni isbotsiz keltiramiz.

$$1^{\circ}. \iint_D kf(x, y) d\sigma = k \iint_D f(x, y) d\sigma, \quad k \in R.$$

$$2^{\circ}. \iint_D (f(x, y) \pm g(x, y)) d\sigma = \iint_D f(x, y) d\sigma \pm \iint_D g(x, y) d\sigma.$$

3°. Agar D soha umumiy ichki nuqtaga ega bo'limgan chekli sondagi

D_1, D_2, \dots, D_n sohalardan tashkil topgan bo'lsa, u holda

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma + \dots + \iint_{D_n} f(x, y) d\sigma.$$

4°. Agar D sohada $f(x, y) \geq 0$ ($f(x, y) \leq 0$) bo'lsa, u holda

$$\iint_D f(x, y) d\sigma \geq 0 \left(\iint_D f(x, y) d\sigma \leq 0 \right).$$

5°. Agar D sohada $f(x, y) \geq g(x, y)$ ($f(x, y) \leq g(x, y)$) bo'lsa, u holda

$$\iint_D f(x, y) d\sigma \geq \iint_D g(x, y) d\sigma \left(\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma \right).$$

6°. Agar D sohada $f(x, y)$ funksiya uzlucksiz bo'lsa, u holda shunday

$P_0(x_0; y_0) \in D$ nuqta topiladiki

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(x_0, y_0) \sigma.$$

Bu xossa o'rta qiymat haqidagi teorema deb yuritiladi.

$$f(x_0, y_0) = \frac{\iint_D f(x, y) d\sigma}{\sigma}$$
 qiymatga $f(x, y)$ funksiyaning D sohadagi o'rta qiymati deyiladi.

7". Agar D sohada $f(x, y)$ funksiya uzlucksiz bo'lib, m'a M funksiyaning shu sohadagi eng kichik va eng katta qiyatlari bo'lsa, u holda

$$m\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M\sigma.$$

Bu xossa *integralning chegaralanganligi haqidagi teorema* deb yuritiladi


3.2. Ikki karrali integrallar yordamida tekis figuraning yuzini va jismning hajmini hisoblash.

Ushbu mustaqil ishni bajarishdan maqsad. Ikki karrali integrallarni hisoblashga doir berilgan nazariy tushunchalardan foydalanim, shu integralning geometrik tatbiqlari bilan talabalarni tanishtirish va ikki karrali integrallar yordamida tekis figuraning yuzini va jisimning hajmini mustaqil hisoblay bilish.

Umumi tushunchalar. Bu qism bo'yicha misollar yechishga kirishishdan oldin $f(x, y)$ funksiyadan olingan ixtiyoriy D soha bo'yicha ikki karrali integralning mavjudlik shartlari va uni hisoblash usullarini takrorlang.

Ikki karrali integrallarni hisoblashda quydagi muhum shartlarga e'tibor qilish kerakligini eslatib o'tamiz:

D soha quyigicha bo'lsin:



D soha quyidan $y = \varphi_1(x)$ yuqoridan $y = \varphi_2(x)$ egri chiziqlar bilan, yon tomonlardan esa $x=a$ va $x=b$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan. Bu yerda shuni esda tutish kerakki, $y = \varphi_1(x)$ va

$y = \varphi_1(x)$ funksiyalar $[a, b]$ oraliqda aniqlangan bo‘lishi talab etiladi, bu oraliqning tashqarisida esa, ya’ni $x < a$ va $x > b$ qiymatlarda $\varphi_1(x)$ va $\varphi_2(x)$ funksiyalarning aniqlangan bo‘lishi yoki bo‘lmasligi bizni qiziqtirmaydi.

Agar x ning $[a, b]$ oraliqdagi har bir o‘zgarmas qiymati uchun

$$J(x) = \int_a^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \quad (1)$$

integral mavjud bo‘lsa, u holda takroriy integral

$$\int_a^b J(x) dx = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \quad (2)$$

ham mavjud bo‘ladi va quyidagi tenglik o‘rinli bo‘ladi:

$$\iint_D f(x, y) dD = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \quad (3)$$

Endi ikki karrali integralning geometrik ma’nosiga kelsak, (3) integral ostki asosi XOY tekisligida yotuvchi D soha bo‘lgan, ustki asosi esa $z = f(x, y)$ sirt bilan chegaralangan va yasovchilari oz o‘qiga parallel bo‘lgan silindrishimon jismning ($g’o‘laning$) hajmini aniqlaydi. Bu yerda shuni yodda tutingki, agar $f(x, y) = 1$ bo‘lsa, u holda

$$\iint_D f(x, y) dD = \iint_D dD = (D) \cdot (D) - D \text{ sohaning yuzi}$$


Agar $\varphi_1(x) = c(\text{const})$, $\varphi_2(x) = d(\text{const})$ bo‘lsa, u holda D soha $\{[a, b] \times [c, d]\}$ to‘g’ri to‘rtburchakdan iborat bo‘lib, (3) integral ustki asosi $z = f(x, y)$ sirt bilan chegaralangan, qolgan yoqlari $x = a$, $x = b$, $y = c$, $y = d$ va xOy tekisliklarda yotuvchi parallelopipedning hajmini aniqlaydi.

Endi yuqorida aytilgan mulohazalarni tipik misollar yechishga qo‘llaymiz.

Tekis figuraning yuzini hisoblash

1-misol. $xy = 4$ va $x + y = 5$ chiziqlar bilan chegaralangan sohaning yuzini toping.

Yechim. Avvalo berilgan sohani koordinatalar tekisligida tasvirlaymiz.



D sohada x ning eng katta va eng kichik qiymatlarini topish sizga 1-kurs matematik analiz kursidan ma'lum. Buning uchun har ikkala tenglamani birlashtirishda yechamiz:

$$\begin{cases} xy = 4 \\ x + y = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(5-x) = 4 \\ y = 5-x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 5x + 4 = 0 \\ y = 5-x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 4; x_2 = 1 \\ y = 5-x \end{cases}$$

Demak, x o'zgaruvchi $[1, 4]$ oraliqdagi qiymatlarni qabul qilar ekan. D sohaning chegaralari $y = \frac{4}{x}$ va $y = 5 - x$ chiziqlaridir. $a = 1$; $b = 4$ bo'ladi. (3) formulada $f(x, y) = 1$, $\varphi_1 = \frac{4}{x}$ va $\varphi_2(x) = 5 - x$ larni o'rniga qo'ysak va D sohaning yuzini S bilan belgilasak, quydagini hosil qilamiz:


$$S = \iint_D dD = \int_1^4 dx \int_{\frac{4}{x}}^{5-x} dy = \int_1^4 \left(5 - x - \frac{4}{x} \right) dx = \left[5x - \frac{x^2}{2} - 4 \ln x \right]_1^4 =$$

$$= 20 - 8 - 4 \ln 4 - 5 + \frac{1}{2} = 7,5 - 4 \ln 4 \text{ (kv birlik).}$$

2-misol. $y^2 = ax$ parabola va $y = a$ to'g'ri chiziq bilan chegaralangan sohaning yuzini toping, ($a > 0$).

Yechim. Berilgan chiziqlarning grafigini chizamiz. a ning son qiymati aniq berilmaganida uchun parabolaning formal (yuzaki) grafigini chizamiz. To'g'ri chiziq va parabolaning kesishish nuqtalarini topamiz:

$$\begin{cases} y^2 = ax \\ y = x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = ax \\ y = x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(x-a) = 0 \\ y = x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0; \quad x_2 = a \\ y = x \end{cases}$$



Demak, x ning chegaralari 0 va a sonlari ekan. Parabolaning yuqori bo‘lagida uning tenglamasi $y = \sqrt{ax}$ ko‘rinishda bo‘ladi. Yuqoridagi shakldan ko‘rinadiki, $\varphi_1(x) = x$, $\varphi_2(x) = \sqrt{ax}$. Bularni (3) formulaga qo‘ysak va $f(x, y) = 1$ ekanini hisobga olsak, quyidagini topamiz:


$$S = \iint_D dD = \int_0^a dx \int_x^{\sqrt{ax}} dy = \int_0^a (\sqrt{ax} - x) dx = \sqrt{a} \cdot \int_0^a \sqrt{x} dx -$$

$$- \int_0^a x dx = \sqrt{a} \cdot \left[\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^a - \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^a = \frac{2}{3} \sqrt{a} \cdot a \sqrt{a} - \frac{1}{2} a^2 = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right) a^2 = \frac{1}{6} a^2$$

(kv birlik).

3-misol. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ellips bilan chegaralangan sohaning yuzini toping.

Yechim. Ellipsning grafigini chizamiz.



Berilgan D sohaning yuzini hisoblash uchun uning koordinatalar tekisligi I choragida joylashgan qismi yuzini hisoblab, natijani 4 ga ko‘paytirish kifoya. Demak, $(D) = 4 \cdot (D_i)$

Ellips tenglamasini y ga nisbatan yechamiz

$$\frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{x^2}{a^2} = \frac{a^2 - x^2}{a^2} \Rightarrow y^2 = \frac{b^2}{a^2} (a^2 - x^2) \Rightarrow y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$$

Shaklidan ko‘rinadiki, D sohaning yuzi uchun $\varphi_1(x) = 0$ va

$$\varphi_2(x) = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}, x \in [0, a].$$

Bularni (3) formulada o‘rniga qo‘ysak va $f(x, y) = 1$ ekanini hisobga olsak, quyidagini topamiz:

$$S = \iint_D dD = 4 \iint_{D_i} dD_i = 4 \int_0^a dx \int_0^{b \sqrt{a^2 - x^2}} dy = 4 \int_0^a y \Big|_0^{b \sqrt{a^2 - x^2}} \cdot dx = 4 \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx,$$

bu yerda $x = a \sin t$ belgilash kiritamiz:

$$dx = a \cos t dt, x = 0 \Rightarrow t = 0, x = a \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}.$$

Bularni o‘rniga qo‘ysak,

$$\begin{aligned} S &= \frac{4b}{a} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t} \cdot a \cos t dt = 4b \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos^2 t dt = 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2t}{2} = \\ &= 2ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt = 2ab \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2ab \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin \pi \right) = 2ab \cdot \frac{\pi}{2} = \pi ab \end{aligned}$$


(kv birlik).

4-misol. $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$ lemniskata bilan chegaralangan sohaning yuzini toping.

Bu misolni yechishga kirishishdan oldin ma’ruzadan ikki karrali integrallarni hisoblashda qutb koordinatalarini qo‘llanilishi mavzusini takrorlang. Sizga ma’lumki, agar D soha konturining qutb koordinatalaridagi tenglamasi $r = r(\varphi)$ bo‘lsa, $(r -$ qutb o‘qi, $\varphi -$ qutb burchagi), bu yerda φ o‘zgaruvchi $[\alpha, \beta]$ oraliqda n qiymatlar qabul qilsa, u holda D sohaning yuzi quydagicha aniqlanadi:

$$S = \iint_D dD = \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_0^{r(\varphi)} rdr$$

Endi 4-misolni yechishga o‘tamiz. Oldin lemniskata grafigini chizamiz:



Lemniskataning qutb koordinatalardagi tenglamasiga o'tish uchun uning tenglamasidagi x, y lar o'rniga $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$ larni qo'yamiz.

$$[r^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)]^2 = 2a^2 r^2 (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r^4 = 2a^2 r^2 \cos 2\varphi \Rightarrow r^2 = 2a^2 \cos 2\varphi \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r = a\sqrt{2 \cos 2\varphi} \quad (\varphi \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}])$$

Shaklda ko'rsatilgan D_1 soha uchun $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ oraliqda qiymatlar qabul qiladi.

$S = 4 \cdot (D_1)$ ekanini hisobga olib, quyidagini topamiz:

$$\begin{aligned} S &= 4 \iint_{D_1} dD_1 = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{2 \cos 2\varphi}} r dr = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{r^2}{2} \Big|_0^{a\sqrt{2 \cos 2\varphi}} d\varphi = \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2a^2 \cos 2\varphi d\varphi = 2a^2 \sin 2\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 2a^2 (\sin \frac{\pi}{2} - 0) = 2a^2 \text{ (kv birlik)}. \end{aligned}$$

5-misol. Egri chiziqli koordinatalar kiritish yordamida quyidagi chiziqlar bilan chegaralangan sohaning yuzini hisoblang:

$$y^2 = 2px, \quad y^2 = 2qx, \quad x^2 = 2ry, \quad x^2 = 2sy.$$

Bu yerda $0 < p < q, \quad 0 < r < s$.

Yechim. Bu misolni yechishga kirishishdan oldin ma'ruzadan "ikki karrali integrallarda o'zgaruvchilarni almashtirish" mavzusini takrorlang. Bu yerda yangi ξ, η egri chiziqli koordinatalarni quyidagicha kiritamiz:

$$y^2 = 2\xi x \quad (p \leq \xi \leq q) \quad x^2 = 2\eta y \quad (r \leq \eta \leq s)$$

Bu tenglamalardagi x, y larni ξ, η lar orqali ifodalaymiz:

$$\begin{cases} x^2 = 2\eta y \\ x = \frac{y^2}{2\xi} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{y^4}{4\xi^2} = 2\eta y \\ x = \frac{y^2}{2\xi} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y^4 = 8\xi^2\eta y \\ x = \frac{y^2}{2\xi} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2\sqrt[3]{\xi^2\eta} \\ x = \frac{4\sqrt[3]{\xi^4\eta^2}}{2\xi} \end{cases} \Rightarrow x = 2\sqrt[3]{\xi\eta^2}; \quad y = 2\sqrt[3]{\xi^2\eta}$$

Endi x va y larning ξ, η lar bo'yicha xususiy hosilalarini hisoblaymiz:


$$\frac{\partial x}{\partial \xi} = \frac{2}{3}(\xi\eta^2)^{\frac{2}{3}} \cdot \eta^2; \quad \frac{\partial x}{\partial \eta} = \frac{2}{3}(\xi\eta^2)^{\frac{2}{3}} \cdot 2\xi\eta;$$

$$\frac{\partial y}{\partial \xi} = \frac{2}{3}(\xi^2\eta)^{\frac{2}{3}} \cdot 2\xi\eta; \quad \frac{\partial y}{\partial \eta} = \frac{2}{3}(\xi^2\eta)^{\frac{2}{3}} \cdot \xi^2;$$

Bularni $I(\xi, \eta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix}$ yakobianda o'rniga qo'yamiz va

determinantning xossasiga ko'ra uning satrlaridagi umumiy ko'paytuvchilarni determinant belgisidan tashqariga chiqaramiz:

$$I(\xi, \eta) = \frac{4}{9}\xi\eta(\xi\eta^2)^{\frac{2}{3}} \cdot (\xi^2\eta)^{\frac{2}{3}} \begin{vmatrix} \eta & 2\xi \\ 2\eta & \xi \end{vmatrix} = \frac{4}{9}\xi\eta(\xi\eta)^{-2} \cdot (-3\xi\eta) = -\frac{4}{3}$$



Bu yerda shuni esda tutish kerakki, yangi ξ, η o'zgaruvchilar bo'yicha integrallash sohasi $\Delta = \{(p, q] \times [r, s]\}$ to'g'ri to'rtburchak bo'ladi.

Demak,

$$S = \iint_D dD = \iint_D |I(\xi, \eta)| d\xi d\eta = \frac{4}{3} \int_p^q d\xi \int_r^s d\eta = \frac{4}{3} (q-p)(s-r).$$


Yuqorida yechilgan misollarda shunday xulosaga kelamiz: D sohaning konturi (chegarasi) silliq yopiq egri chiziq bo‘lgan hollarda qutb koordinatalari kiritish, egri chiziqli to‘rburchak bo‘lgan hollarda esa egri chiziqli koordinatalar yordamida o‘zgaruvchilarni almashtirish maqsadga muvofiqdir.

Jismning hajmini hisoblash

6-misol. Koordinatalar tekisliklari va $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ tekisligi bilan chegaralangan jismning hajmini toping.

Bu misolni yechishga kirishishdan oldin “ikki karrali integrallar yordamida jismning hajmini hisoblash” mavzusini ma’ruzadan takroran o‘qing.

Yechim.



Qaralayotgan jism uchburchakli piramida bo‘lib, uning uchta yoqlari koordinata tekisliklarida yotadi.


D sohaning chegaralari $x=0, y=0$ va $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ to‘g‘ri chiziqlardir.

Demak,

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b(1 - \frac{x}{a})\}$$

$$z = f(x, y) = c \left(1 - \frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right).$$

Bularni (3) formulaga qo‘ysak va qaralayotgan jism hajmini V bilan belgilasak, quyidagini hosil qilamiz:



$$\begin{aligned}
 V &= \iint_D f(x, y) dD = \iint_D c \left(1 - \frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) dx dy = \int_0^a dx \int_0^a dy \int_0^a c \left(1 - \frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) dy = \\
 &= c \int_0^a \left(y - \frac{xy}{a} - \frac{y^2}{2b}\right) \Big|_0^{b-x/a} \cdot dx = \int_0^a \left[b\left(1 - \frac{x}{a}\right) - \frac{bx}{a}\left(1 - \frac{x}{a}\right) - \left(\frac{b^2\left(1 - \frac{x}{a}\right)^2}{2b}\right)\right] dx = \\
 &= bc \int_0^a \frac{(1 - \frac{x}{a})^2}{2} dx = -abc \cdot \left. \frac{\left(1 - \frac{x}{a}\right)^3}{6} \right|_0^a = \frac{abc}{6} \text{ (kub birlik).}
 \end{aligned}$$

7-misol. $z = x^2 + y^2$ aylanma paraboloid, $y = x^2$ silindr va $y = 1$ tekisliklar bilan chegaralangan jismning hajmini toping.

Yechim.

D soha quyidagicha bo'ladi:

$$D = \{(x, y) : -1 \leq x \leq 1; x^2 \leq y \leq 1\}, \quad f(x, y) = x^2 + y^2.$$

Bularni (3) ga qo'yamiz:

$$\begin{aligned}
 V &\iint_D f(x, y) dD = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 (x^2 + y^2) dy = \int_{-1}^1 \left(x^2 y + \frac{y^3}{3}\right) \Big|_{x^2}^1 dx = \\
 &= \int_{-1}^1 \left(x^2 + \frac{1}{3} - x^4 - \frac{x^6}{3}\right) dx = \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x}{3} - \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{21}\right) \Big|_{-1}^1 = 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{21}\right) = \\
 &= 2 \cdot \frac{70 - 21 - 5}{105} = \frac{88}{105}; \text{ (kubbirlik).}
 \end{aligned}$$

8-misol. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ellipsoidning hajmini toping.

Yechim. Berilgan tenglamadan z ni aniqlaymiz:

$$z = \pm c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}.$$

Bu yerda D sohaning konturi $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ellips bo‘ladi.

O‘zgaruvchilarini $x = a \cos \varphi$, $y = b r \sin \varphi$ formulalar yordamida almashtiramiz.

Natijada $D' = \{(\varphi, r) : 0 \leq \varphi \leq 2\pi; 0 \leq r \leq 1\}$

$$\frac{\partial x}{\partial \varphi} = -a \sin \varphi; \quad \frac{\partial x}{\partial r} = a \cos \varphi$$

$$\frac{\partial y}{\partial \varphi} = b r \cos \varphi; \quad \frac{\partial y}{\partial r} = b \sin \varphi$$

Yakobian

$$I(\varphi, r) = abr \begin{vmatrix} -\sin \varphi & \cos \varphi \\ \cos \varphi & \sin \varphi \end{vmatrix} = abr(-\sin^2 \varphi - \cos^2 \varphi) = -abr; \quad |I(\varphi, r)| = abr.$$

Ellipsoidning XOY tekisligidan yuqorida joylashgan bo‘lagining hajmini hisoblab, natijani 2 ga ko‘paytirsak, uning hajmi kelib chiqadi.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} V &= \iint_D c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy = c \iint_D \sqrt{1 - r^2 \cos^2 \varphi - r^2 \sin^2 \varphi} \cdot |I(\varphi, r)| \cdot d\varphi dr = \\ &= c \int_0^1 dr \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - r^2} \cdot abr d\varphi = abc \cdot 2\pi \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} r \cdot dr = -\pi abc \cdot \left. \frac{(1 - r^2)^{\frac{3}{2}}}{3} \right|_0^1 = \frac{2}{3} \pi abc \end{aligned}$$


(kub birlik).

Bundan $V = \frac{4}{3} \pi abc$ kelib chiqadi.

9-misol. $xy = a^2$, $xy = 2a^2$ silindrлar, $y = \frac{x}{2}$, $z = 0$, $y = 2x$

tekisliklar hamda $z = \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q}$ paraboloid bilan chegaralangan jismning hajmini toping.

Yechim. Integrallash sohasini XOY koordinatalar tekisligida tasvirlaymiz:



Shaklda ko'rsatilgan sohalar simmetrik bo'lgani uchun va paraboloid tenglamasida

$$z = \frac{(-x)^2}{p} + \frac{(-y)^2}{q} = \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} \quad \text{tenglik o'rinli bo'lgani uchun}$$

$x > 0, y > 0$ bo'lgan sohada jism hajmini hisoblab natijani 2 ga ko'paytirsak, izlanayotgan jismning hajmi kelib chiqadi.

Egri chiziqli koordinatalarni

$$xy = ua^2, 1 \leq u \leq 2;$$

$$y = vx, \frac{1}{2} \leq v \leq 2$$

tengliklar yordamida kiritamiz. Bu tengliklardan x, y o'zgaruvchilarini aniqlaymiz: $x = a\sqrt{\frac{u}{v}}$, $y = a\sqrt{uv}$. Bundan

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{a}{2\sqrt{uv}}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{au}{2v\sqrt{uv}}$$

$$\frac{\partial y}{\partial u} = \frac{av}{2\sqrt{uv}}, \quad \frac{\partial y}{\partial v} = \frac{au}{2\sqrt{uv}}$$

xususiy hosilalarni aniqlaymiz. Bularni $I(u, v)$ yakobianda o'rniga qo'ysak va umumiy ko'paytuvchilarini determinant ishorasidan tashqariga chiqarsak, quyidagi kelib chiqadi:

$$I(u, v) = \frac{a^2}{4uv} \begin{vmatrix} 1 & -\frac{u}{v} \\ v & u \end{vmatrix} = \frac{a^2}{4uv} \cdot 2u = \frac{a^2}{2v}.$$

Natijada

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}V &= \iint_D f(x, y) dD = \iint_{uv} f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)| du dv = \\
&= \int_1^2 dv \int_1^2 \left(\frac{a^2 u}{pv} + \frac{a^2 uv}{q} \right) \frac{a^2}{2v} du = \frac{a^4}{2} \int_1^2 u du \int_1^2 \left(\frac{1}{pv} + \frac{v}{q} \right) \frac{1}{v} dv = \\
&= \frac{a^4}{4} u^2 \Big|_1^2 \cdot \int_1^2 \left(\frac{1}{pv^2} + \frac{1}{q} \right) dv = \frac{3a^4}{4} \left(-\frac{1}{pv} + \frac{v}{q} \right) \Big|_1^2 = \\
&= \frac{3a^4}{4} \left(-\frac{1}{2p} + \frac{2}{q} + \frac{2}{p} - \frac{1}{2q} \right) = \frac{3a}{4} \left(\frac{3}{2p} + \frac{3}{2q} \right) = \frac{9a^4}{8} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = \frac{9a^4(p+q)}{8pq}
\end{aligned}$$

(kub birlik).

Bundan

$$V = \frac{9a^4(p+q)}{4pq}$$

kelib chiqadi.

3.3. Ikki karrali integrallarning mexanikada qo'llanilishi

Ikki karrali integrallarni jismning massasini, o'qqa va tekislikka nisbatan statik va inersiya momentlarini, shuningdek og'irlilik markazlarini hisoblashda qo'llanilishi.

Umumiy tushunchalar. Bu qism bo'yicha misollar yechish uchun ikki karrali va uch karrali integrallarni mexanikada qo'llanilishi mavzuni mukammal takrorlab chiqing. Endi ba'zi muhum formulalar bilan tanishamiz.

Agar (P) biror tekis figura (masalan, plastinka) bo'lib, uning $M(x, y)$ nuqtalaridagi zichligi $\rho(M) = \rho(x, y)$ bo'lsa, u holda (P) figuraning (palstinkaning) massasi

$$m = \iint_P \rho(x, y) dp \tag{1}$$

formula bilan aniqlanadi. Agar (P) figura bir jinsli bo'lsa, ya'ni hamma nuqtalarida zichligi bir xil bo'lsa, u holda $\rho(x, y) = a(\text{const})$ bo'ladi, (1) formula esa,

$$m = a \iint_P dp \tag{2}$$

ko'rinishni oladi.

OX va OY koordinata o'qlariga nisbatan statik momentlar quyidagi formulalar bilan aniqlanadi.

$$M_x = \iint_P y \rho(x, y) dp, \quad M_y = \iint_P x^2 \rho(x, y) dp \quad (3)$$

Inersiya momentlari esa,

$$I_x = \iint_P y^2 \rho(x, y) dp, \quad I_y = \iint_P x^2 \rho(x, y) dp, \quad (4)$$


formulalar yordamida topiladi. Qaralayotgan jismning og'irlik markazining koordinatalari quyidagicha topiladi:

$$x_0 = \frac{\iint_P x \rho(x, y) dp}{m}; \quad y_0 = \frac{\iint_P y \rho(x, y) dp}{m} \quad (5)$$

Agar jism bir jinsli bo'lsa, ya'ni $\rho(x, y) = \text{const}$ bo'lsa, (5) formulalar soddalashadi va

$$x_0 = \frac{\iint_P x dp}{P}; \quad y_0 = \frac{\iint_P y dp}{P} \quad (6)$$

ko'rinishini oladi. Bu yerda P berilgan figuraning yuzi.



Yasovchilari Oz o'qiga parallel, ostki asosii xOy tekisligida va ustki asosi esa $z = f(x, y)$ sirt bilan chegaralangan silindrik g'o'lani qaraymiz.

G'o'la bir jinsli bo'lsin, ya'ni $\rho(x, y) = \text{const}$. Soddalik uchun $\rho(x, y) = 1$ deb olamiz. Shu g'o'lani xoy , zox va yoz koordinata tekisliklariga nisbatan statik momentlari deb quyidagi formulalar bilan aniqlanuvchi kattaliklarga aytildi:

$$M_{yy} = \frac{1}{2} \iint_P z^2 dp; \quad M_{zz} = \iint_P yz dp; \quad M_{xz} = \iint_P xz dp \quad (7)$$

Bular yordamida g'o'lanning og'irlik markazining koordinatalarini osongina aniqlay olamiz.

$$x_0 = \frac{M_{yz}}{V} = \frac{\iint_P xz dp}{V}; \quad y_0 = \frac{M_{xz}}{V} = \frac{\iint_P yz dp}{V}; \quad z_0 = \frac{M_{xy}}{V} = \frac{\frac{1}{2} \iint_P z^2 dp}{V}; \quad (8)$$

Shunga o'xshash silindrik g'o'laning koordinata tekisliklariga nisbatan inersiya momentlari quyidagicha aniqlanadi:

$$I_x = \iint_P y^2 z dp, I_{yz} = \iint_P x^2 z dp \quad (9)$$

Oz o'qiga nisbatan inersiya momenti esa


$$I_z = I_x + I_{yz} = \iint_P (x^2 + y^2) z dp \quad (10)$$

formula bilan hisoblanadi. Agar g'o'laning yasovchilari Ox yoki Oy o'qiga parallel bo'lsa, u holda (7), (8), (9) va (10) formulalarda z o'zgaruvchi x yoki y bilan almashtiriladi. Agar qaralayotgan jismning zichligi xOy tekisligiga parallel qismda yotuvchi nuqtalari uchun $\rho(x, y)$ ga ($\rho(x, y) \neq 1$) teng bo'lib, Oz o'qiga parallel ustunchalarida o'zgarmas bo'lsa, u holda (7), (8), (9) va (10) formulalarda integral ostidagi ifoda $\rho(x, y)$ ga ko'paytiriladi.

Ikki karrali integralning mexanik tatbiqlariga misollar.

1-misol. (P) tekis figura egri chiziqli trapetsiya ko'rinishida bo'lib, $x=1, x=3$ va $y=0$ to'g'ri chiziqlar, $y=\frac{3}{x}$ giperbola bilan chegaralangan bo'lsin. Uning hamma nuqtalarida zichligi $\rho(x, y)=1$ bo'lsa shu figuraning massasini va koordinata o'qlariga nisbatan statik momentlarni toping.

Yechim.



$P = \{(x, y) \in R^2 : 1 \leq x \leq 3; 0 \leq y \leq \frac{3}{x}\}$, (1) formulada $\rho(x, y)=1$ qo'ysak, figuraning massasi kelib chiqadi.

$$m = \iint_P dp = \int_1^3 dx \int_0^{3/x} dy = \int_1^3 \frac{3}{x} dx = 3 \ln x \Big|_1^3 = 3 \ln 3$$

Shunga o'xshash (3) formulalarda ham $\rho(x, y)=1$ qo'ysak

$$M_x = \iint_P y dp = \int_1^3 dx \int_0^x y dy = \int_1^3 \frac{y^2}{2} \Big|_0^x dx = \int_1^3 \frac{9}{2x^2} dx = -\frac{9}{2x} \Big|_1^3 = -\frac{9}{6} + \frac{9}{2} = \frac{9}{2} + \frac{3}{2} = 3$$

$$M_y = \iint_P x dp = \int_1^3 dx \int_0^x x dy = \int_1^3 x \cdot \frac{3}{x} dx = 3 \cdot 2 = 6$$

Ox va Oy o'qlariga nisbatan statik momentlar kelib chiqadi.

2-misol. $z=0, z=ky$ ($k > 0$) tekisliklar $x^2+y^2=a^2$ slindr bilan chegaralangan bir jinsli silindrik g'o'la kesimi og'irlilik markazining koordinatalarini toping ($y \geq 0$).

Yechim. Qaralayotgan jism bir jinsli bo'lgani uchun zichligi $\rho(x, y, z) = 1$ deb olamiz. $y \geq 0$ bo'lgani uchun $z = ky \geq 0$ bo'ladi.

Demak, $P = \{(x, y) \in R^2 : -a \leq x \leq a; 0 \leq y \leq \sqrt{a^2 - x^2}\}$ -bu silindrik g'o'laning xOy tekisligida yotuvchi asosi. (7) formulalarga ko'ra quyidagilarni topamiz:

$$M_{xy} = \frac{1}{2} \iint_P z^2 dp = \frac{1}{2} \int_{-a}^a dx \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} k^2 y^2 dy = \frac{k^2}{2} \int_{-a}^a (a^2 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{\pi}{16} k^2 a^2$$

$$M_{xz} = \iint_P yz dp = k \int_{-a}^a dx \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} y^2 dy = \frac{k}{3} \int_{-a}^a (a^2 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{\pi}{8} k a^4$$

$$M_{yz} = \iint_P xz dp = k \int_{-a}^a dx \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} xy dy = k \int_{-a}^a \frac{xy^2}{2} \Big|_0^{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \frac{k}{2} \int_{-a}^a (a^2 x - x^3) dx = 0$$

Berilgan jisimning hajmi V bo'lsa, u holda

$$V = \iint_P z dp = \int_{-a}^a dx \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} ky dy = \frac{k}{2} \int_{-a}^a (a^2 - x^2) dx = \frac{k}{2} (a^2 x - \frac{x^3}{3}) \Big|_{-a}^a = k(a^3 - \frac{a^3}{3}) = \frac{2}{3} k a^3$$


Bularni (8) formulalarga qo'ysak, og'rlilik markazining koordinatalari kelib chiqadi:

$$x_0 = \frac{M_{yz}}{V} = 0; \quad y_0 = \frac{M_{xz}}{V} = \frac{\frac{\pi}{8} k a^4}{\frac{2}{3} k a^3} = \frac{3\pi}{16} a; \quad z_0 = \frac{M_{xy}}{V} = \frac{\frac{\pi}{16} k^2 a^2}{\frac{2}{3} k a^3} = \frac{3\pi}{32} k a.$$

3-misol. Tekis figura R radusli doira shaklda bo'lsa, uning urunmasiga nisbatan inersiya momentini toping.

Yechim. Bu yerda shu narsaga e'tibor qilish kerakki, doira aylanasiga urinmalar soni cheksiz ko'p, lekin shu urinmalarga nisbatan inersiya momentlari hamma urinmalar uchun bir xil bo'ladi. Shuning uchun Ox o'qiga koordinatalar boshida urinuvchi doiraning

shu Ox o‘qiga nisbatan inersiya momentini aniqlasak, masala yechilgan bo‘ladi.



Aylana tenglamasi $x^2 + (y-R)^2 = R^2$, bundan
 $R - \sqrt{R^2 - x^2} \leq y \leq R + \sqrt{R^2 - x^2}$

$$P = \{(x, y) \in R^2 : -R \leq x \leq R; R - \sqrt{R^2 - x^2} \leq y \leq R + \sqrt{R^2 - x^2}\}$$

(4) formulaga ko‘ra quyidagini topamiz ($\rho(x, y) = 1$):

$$\begin{aligned} I_x &= \iint_P y^2 dP = \int_{-R}^R dx \int_{R - \sqrt{R^2 - x^2}}^{R + \sqrt{R^2 - x^2}} y^2 dy = \frac{1}{3} \int_{-R}^R \left[\left(R + \sqrt{R^2 - x^2} \right)^3 - \left(R - \sqrt{R^2 - x^2} \right)^3 \right] dx = \\ &= -3R(R^2 - x^2) + (R^2 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{2}{3} \int_0^R \left[6R^2 \sqrt{R^2 - x^2} + 2(R^2 - x^2)^{\frac{3}{2}} \right] dx \end{aligned}$$

$x = R \sin t$ belgilash kiritamiz.


$$dx = R \cos t dt; x = 0 \Rightarrow t = 0; x = R \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$$

Bularni o‘rniga qo‘ysak,

$$\begin{aligned} I_x &= \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3R^2 \cdot R \cos t + R^3 \cos^3 t) R \cos t dt = \frac{4}{3} R^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \cos^2 t + \cos^4 t) dt = \\ &= \frac{4}{3} R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[3 \cdot \frac{1 + \cos 2t}{2} + \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right)^2 \right] dt = \pi R^4 + \frac{1}{3} R^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 + \frac{1 + \cos 4t}{2} \right) dt = \\ &= \pi R^4 + \frac{1}{3} R^4 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \pi R^4 + \frac{\pi R^4}{4} = \frac{5}{4} \pi R^4. \end{aligned}$$

4-misol. $x^2 + y^2 \leq a^2$ doiraviy plastinkaning har bir $M(x, y)$ nuqtasidagi zichligi shu nuqtadan $A(a, 0)$ nuqtagacha bo‘lgan masofaga proporsional bo‘lib, plastinkaning markazida aga teng bo‘lsa, uning og‘irlik markazi koordinatlarini toping.

Yechim.



$$P = \{(x, y) \in R^2 : -a \leq x \leq a; -\sqrt{R^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2}\}.$$

Shartga ko‘ra $M(x, y)$ nuqtadagi zichligi $\rho(M) = |MA| \cdot k$, demak,
 $\rho(x, y) = k\sqrt{(x-a)^2 + y^2}$, $\rho(0,0) = a$ bo‘lgani uchun

$$k \cdot \sqrt{(0-a)^2 + 0^2} = a \Rightarrow ka = a \Rightarrow k = 1$$

Bundan $\rho(x, y) = k\sqrt{(x-a)^2 + y^2}$ kelib chiqadi.

Plastinkaning massasini topamiz.

$$m = \iint_P \rho(x, y) dp = \int_{-a}^a dx \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} \sqrt{(x-a)^2 + y^2} dy$$

$$\left. \begin{array}{l} x-a = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{array} \right\}$$

Bu yerda x, y larni qiymatlarini platinka aylanasining tenglamasiga qo‘ysak, r ning φ orqali ifodasi kelib chiqadi.

$$(a+r \cos \varphi)^2 + r^2 \sin^2 \varphi = a^2 \Rightarrow a^2 + 2ar \cos \varphi + r^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = a^2$$

$$\Rightarrow r = -2a \cos \varphi, \left(\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{2} \right).$$

Qutb boshi $A(a, 0)$ nuqtada yotadi (shaklga qarang).

Natijada,

$$m = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \int_0^{-2a \cos \varphi} r^2 dr = \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-8a^3) \cos^3 \varphi d\varphi = -\frac{8a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (1 - \sin^2 \varphi) d(\sin \varphi) =$$

$$= -\frac{8a}{3} \left(\sin \varphi - \frac{\sin^3 \varphi}{3} \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} = -\frac{8a^2}{3} \left(-1 - 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) = -\frac{8a^2}{3} \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{32a^2}{9}$$

Endi o'qlarga (Ox, Oy) nisbatan statik momentlarni aniqlaymiz.

$$M_y = \iint_P y \rho(x, y) dp = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \int_0^{-2a\cos\varphi} r^3 \sin \varphi dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{16a^4 \cos^4 \varphi}{4} \sin \varphi d\varphi = \\ = -4a^4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4 \varphi d(\cos \varphi) = -4a^4 \frac{\cos^5 \varphi}{5} \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} = 0$$

$$M_y = \iint_P y \rho(x, y) dp = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \int_0^{-2a\cos\varphi} (r \cos \varphi + a) r^2 dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left(\frac{r^4}{4} \cos \varphi + a \cdot \frac{r^3}{3} \right) \Big|_0^{-2a\cos\varphi} d\varphi = \\ \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left(4a^4 \cos^5 \varphi - \frac{a}{3} 8a^3 \cos^3 \varphi \right) d\varphi = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left[(4a^4(1 - \sin^2 \varphi)^2 d\varphi - \frac{8}{3} a^4(1 - \sin^2 \varphi) \right] d(\sin \varphi)$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left[4a^4(1 - 2\sin^2 \varphi + \sin^4 \varphi) - \frac{8}{3} a^4(1 - \sin^2 \varphi) \right] d(\sin \varphi) = \\ = \left[4a^4 \left(\sin \varphi - 2 \frac{\sin^3 \varphi}{3} + \frac{\sin^5 \varphi}{5} \right) - \frac{8}{3} a^4 \left(\sin \varphi - \frac{\sin^3 \varphi}{3} \right) \right] \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} = 4a^4 \left(-2 + \frac{4}{3} - \frac{2}{5} \right) - \\ - \frac{8}{3} a^4 \left(-2 + \frac{2}{3} \right) = 4a^4 \frac{-30 + 20 - 6}{15} - \frac{8}{3} a^4 \left(-\frac{4}{3} \right) = \\ = -\frac{64}{15} a^4 + \frac{32}{9} a^4 = \frac{-192 + 160}{45} a^4 = -\frac{32}{15} a^4$$

Bularni (5) formulalarga qo'yib, og'irlk markazining koordinatalarini topamiz:

$$x_0 = \frac{M_y}{m} = -\frac{32}{45} a^4 : \frac{32}{9} a^3 = -\frac{9}{5},$$

$$y_0 = \frac{M_z}{m} = \frac{0}{m} = 0, \quad \left(-\frac{a}{3}; 0 \right).$$

IV BOB. UCH KARRAL INTEGRALLAR

4.1. Uch karrali integral

Uch karrali integral ham ikki karrali integral kabi aniqlanadi. Fazoda hajmi V ga teng bo'lgan jism berilgan bo'lsin. Bu jismning (sohaning) har bir nuqtasida uzliksiz $u = f(P)$ yoki $u = f(x, y, z)$ funksiya aniqlangan bo'lsin.

Sohani ixtiyoriy ravishda umumiy ichki nuqtaga ega bo'lmagan va hajmlari $\Delta V_1, \Delta V_2, \dots, \Delta V_n$ bo'lgan nta bo'lakka bo'lamiz, bunda $V = \sum_{i=1}^n \Delta V_i$. Har bir bo'lakda ixtiyoriy $P_i(x_i, y_i, z_i)$ nuqta tanlab, bu nuqtada $f(P_i) = f(x_i, y_i, z_i)$ ni hisoblaymiz va

$f(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i$ ko'paytmani tuzamiz. Bu ko'paytmalardan

$$I_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i \quad (1)$$

yig'indisini hosil qilamiz. Bu yig'indiga $u = f(x, y, z)$ funksiya uchun V sohada integral yig'indi deyiladi. $n \rightarrow \infty$ da bo'laklar diametrlerining eng kattasi nolga intiladi, ya'ni $\max_{d_i \rightarrow 0} d_i \rightarrow 0$.

1-ta'rif. Agar (1) integral yig'indining $\max d_i \rightarrow 0$ gi chekli limiti V sohani bo'laklarga bo'lish usuliga va bu bo'laklarda $P_i(x_i, y_i, z_i)$ nuqtani tanlash usuliga bog'liq bo'lmagan holda mavjud bo'lsa, u holda bu limitga $f(x, y, z)$ funksiyadan V soha bo'yicha olingan **uch karrali integral** deyiladi va $\iiint_V f(x, y, z) dV$ kabi belgilanadi.

Demak,

$$\iiint_V f(x, y, z) dV = \lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i. \quad (2)$$

Uch karrali integral uchun ham ikki karrali integraldagidek mavjudlik teoremasi o'rini bo'ladi.

Uch karrali integralni ikki karrali integralga o'xshash quyidagicha belgilash mumkin:

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz.$$

Agar V sohada $f(x, y, z) = 1$ bo'lsa, u holda uch karrali integral bu sohaning V hajmiga teng bo'ladi, ya'ni

$$V = \iiint_V dx dy dz. \quad (3)$$

Bu ifoda uch karrali integralning *geometrik ma'nosini* anglatadi.

Agar $\gamma_i = \gamma(x, y, z)$ funksiya V sohada massa taqsimotining zichligi bo'lsa, u holda uch o'lchovli integral V hajmdagi modda massasini beradi:

$$m = \iiint_V \gamma(x, y, z) dx dy dz \quad (4)$$

Bu ifoda uch karrali integralning *mexanik ma'nosini* bildiradi.

Uch karrali integral ikki karrali integral ega bo'lgan xossalarga ega. Shu sababli ikki karrali integralda keltirilgan xossalar uch karrali integral uchun to'laligicha ko'chiriladi.

$$1^{\circ}. \iiint_V kf(x, y, z) dV = k \iiint_V f(x, y, z) dV.$$

$$2^{\circ}. \iiint_V (f(x, y, z) \pm g(x, y, z)) dV = \iiint_V f(x, y, z) dV \pm \iiint_V g(x, y, z) dV.$$

$$3^{\circ}. \iiint_V f(x, y, z) dV = \iiint_{V_1} f(x, y, z) dV_1 + \iiint_{V_2} f(x, y, z) dV_2 + \dots + \iiint_{V_n} f(x, y, z) dV_n,$$

bunda V soha V_1, V_2, \dots, V_n o'zaro kesishmaydigan sohalardan tashkil topgan.

4°. Agar V sohada $f(x, y, z) \geq 0$ ($f(x, y, z) \leq 0$) bo'lsa, u holda

$$\iiint_V f(x, y, z) dV \geq 0 \quad \left(\iiint_V f(x, y, z) dV \leq 0 \right).$$

5°. Agar V sohada $f(x, y, z) \geq \varphi(x, y, z)$ ($f(x, y, z) \leq \varphi(x, y, z)$) bo'lsa, u holda

$$\iiint_V f(x, y, z) dV \geq \iiint_V \varphi(x, y, z) dV \quad \left(\iiint_V f(x, y, z) dV \leq \iiint_V \varphi(x, y, z) dV \right).$$

6°. $\iiint_V f(x, y, z) dV = f(x_0, y_0, z_0)V$, bu yerda $P_i(x_i, y_i, z_i)$ nuqta V sohada yotadi.

7°. Agar V sohada $m \leq f(x, y, z) \leq M$ bo'lsa, u holda

$$m\bar{V} \leq \iiint_V f(x, y, z) dV \leq M\bar{V}.$$

4.2. Uch karrali integrallar yordamida jismning hajmini hisoblash

Ushbu mustaqil ishni bajarishdan maqsad. Uch karrali integrallarni hisoblashga doir berilgan nazariy tushunchalardan foydalaniib, shu integrallarni geometrik jismlarning hajmlarini hisoblashda qo'llay bilish. Uch karrali integrallar yordamida turli xil sirtlar bilan chegaralangan jismlarning hajmlarini hisoblay bilish.

Umumiy tushunchalar. Bu qism bo'yicha misollar yechishga kirishishdan oldin $f(x, y, z)$ funksiyadan V soha bo'yicha olingan uch

karrali integrallarning mayjudlik shartlari va uni hisoblash usullarini ma'ruzadan takrorlab o'qing. Bu yerda V uch o'lchovli soha (jism) bo'lib, u silliq yoki bo'lakli-silliq sirt bilan chegaralangan. Agar V soha quyidan $z = f_1(x, y)$ yuqoridan $z = f_2(x, y)$ sirtlar bilan chegaralangan bo'lsa, bundan tashqari V sohada x, y lar orasida $\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$ tengsizlik o'rinli bo'lib, x esa shu sohada $[a, b]$ oraliqda qiymatlar qabul qilsa, u holda agar $f(x, y, z)$ funksiyadan V soha bo'yicha olingan uch karrali integral mavjud va quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi:

$$\iiint_V f(x, y, z) dv = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} dy \int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} f(x, y, z) dz \quad (5)$$

agar $f(x, y, z) = 1$ bo'lsa (4) tenglik V sohaning hajmini aniqlaydi:

$$\iiint_V dv = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} dy \int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} dz \quad (6)$$

(6) tenglik o'ng tomonini z bo'yicha integrallasak,

$$\iiint_V dv = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dy$$

kelib chiqadi. Bu tenglikning o'ng tomonini bizga tanish bo'lgan ikki karrali integralning takroriy integrallar orqali ifodalanishidir. Uch karrali integrallarning geometrik tatbiqlariga doir misollar yechishda juda zarur bo'lgan quyidagi mavzularni ma'ruzadan qaytarib chiqing:


1. Uch karrali integrallarni hisoblashda sferik va silindrik koordinatalardan foydalanish.

2. Uch karrali integrallarda o'zgaruvchilarni almashtirish.

Endi tipik misollarni yechishga o'tamiz.

1-misol. $x-1=0, y-1=0, z=0$ va $x+y+z=4$ tekisliklar bilan chegaralangan jismning (piramidaning) hajmini toping.


Yechim.



$x + y + z = 4$ tenglamada $z = 0$ qo'ysak, $x + y = 4$ bo'ladi. Bu XOY tekislikda (AB) to'g'ri chiziq tenglamasidir. $x + y = 4$ tenglamada $y = 1$ qo'ysak, A nuqtaning absissasi kelib chiqadi $x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$. Demak, V sohada: $1 \leq x \leq 3; 1 \leq y \leq 4 - x; 0 \leq z \leq 4 - x - y$. Bularni (5) formulaga qo'ysak,

$$\begin{aligned}
 \iiint_V dv &= \int_1^3 dx \int_1^{4-x} dy \int_0^{4-x-y} dz \int_1^3 dx \int_1^{4-x} dy \int_1^{4-x-y} dz = \int_1^3 dx \int_1^{4-x} (4 - x - y) dy = \\
 &= \int_1^3 \left[4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_1^{4-x} dx = \int_1^3 \left[4(4-x) - x(4-x) - \frac{(4-x)^2}{2} - 4 + x + \frac{1}{2} \right] dx = \\
 &= \int_1^3 (16 - 4x - 4x + x^2 - 8 + 4x - \frac{1}{2}x^2 + x - 3,5) dx = \int_1^3 \left(\frac{1}{2}x^2 - 3x + 4,5 \right) dx = \\
 &= \left(\frac{x^3}{6} - \frac{3x^2}{2} + 4,5x \right)_1^3 = \frac{27}{6} - \frac{27}{2} + 13,5 - \frac{1}{6} + \frac{3}{2} - 4,5 = 13,5 - 12 - \frac{1}{6} = 1,5 - \frac{1}{6} = \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

kub birlik bo'ladi.




2-misol.

$$z = x^2 + y^2, z = 2(x^2 + y^2), y = x, y = x^2$$

sirtlar bilan chegaralangan jismning hajmini toping.

Yechim. Berilgan sirtlarning dastlabki ikkitasi aylanma paraboloid bo'lib, uchinchisi Oz o'qidan o'tuvchi tekislikdir, $y = x^2$ esa yasovchilari Oz o'qiga parallel bo'lgan parabolik silindr ekani bizga ma'lum.



Demak, 1-shaklda tasvirlangan jismning $z=x^2+y^2$ va $z=2(x^2+y^2)$ aylanma paraboloidlar orasiga olingan bo'lagining hajmini hisoblash talab etiladi. $\begin{cases} y = x \\ y = x^2 \end{cases}$ sistemadan x ni topamiz:

$$\begin{cases} y = x \\ y = x^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = x \\ y = x^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - x = 0 \\ y = x^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0, x_2 = 1 \\ y = x^2 \end{cases}$$

Bundan $V = \{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 1; x^2 \leq y \leq x; x^2 + y^2 \leq z \leq 2(x^2 + y^2)\}$. Bularni (6) formulaga qo'yysak, quydagi kelib chiqadi:

$$V = \iiint_V dv = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{x^2 + y^2} dy \int_{x^2 + y^2}^{2(x^2 + y^2)} dz = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{x^2 + y^2} (x^2 + y^2) dy =$$

$$= \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{x^2}^x dx = \int_0^1 \left(x^3 + \frac{x^3}{3} - x^4 - \frac{x^6}{3} \right) dx = \int_0^1 \left(\frac{4}{3}x^3 - x^4 - \frac{x^6}{3} \right) dx = \left(\frac{x^4}{3} - \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{21} \right) \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{21} = \frac{35 - 21 - 5}{105} = \frac{9}{105} = \frac{3}{55} \text{ (kub birlik)}.$$

3-misol. $(x^2 + y^2 + z^2)^3 = a^3 xyz$ sirt bilan chegaralangan jismning hajmini toping.

Yechim. Tenglikning chap tomoni kvadratlar yig'indisi bo'lgani uchun manfiy bo'la olmaydi. Demak, tenglik o'rini bo'lishi uchun xyz ko'paytma manfiy bo'lmasligi kerak. $xyz \Rightarrow$

$$\Rightarrow 1) x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0; \quad 2) x \geq 0, y \leq 0, z \leq 0$$

$$3) x \leq 0, y \geq 0, z \leq 0; \quad 4) x \leq 0, y \leq 0, z \geq 0$$

Berilgan jism kordinatalar sistemasining 4ta oktantida yotar ekan. Agar $M(x, y, z)$ qaralayotgan jismning ixtiyoriy nuqtasi bo'lsa, unga OX o'qiga nisbatan simmetrik $M_1(-x, -y, -z)$ nuqta, OY o'qiga nisbatan simmetrik $M_2(-x, y, -z)$ nuqta va OZ o'qiga nisbatan simmetrik $M_3(-x, -y, z)$ nuqtalar mavjuddir. Bundan berilgan jismning yuqorida

ko'rsatilgan 4 ta oktantdagi bo'laklarining kattaliklari bir xil ekani kelib chiqadi. Shuning uchun jismning 1 oktantdagi bo'lagining hajmini hisoblab, natijani 4 ga ko'paytirsak, berilgan jismning hajmi kelib chiqadi. Sferik koordinatalar kiritamiz:

$$x = r \sin \psi \cos \varphi; \quad y = r \sin \psi \sin \varphi; \quad z = r \cos \psi$$

1- oktantda $0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}$ va $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ bo'ladi. Yakobian $|J(r, \varphi, \psi)| = r^2 \sin \psi$ va sferik koordinatalarni berilgan tenglamaga qo'ysak, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned} [r^2 \sin^2 \psi (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + r^2 \cos^2 \psi]^3 &= a^3 r^3 \sin^2 \psi \cos \varphi \cos \psi \sin \psi \Rightarrow \\ \Rightarrow r^3 &= a^3 \sin^2 \psi \cos \varphi \cos \psi \sin \varphi \Rightarrow r = a \sqrt[3]{\sin^2 \psi \cos \varphi \cos \psi \sin \psi} \end{aligned}$$

Demak,

$$\begin{aligned} V &= \iiint dV = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\psi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a \sqrt[3]{\sin^2 \psi \cos \varphi \cos \psi \sin \varphi}} r^2 \sin \psi dr = \\ &= \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\psi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^3 \sin^3 \psi \cos \varphi \cos \psi \sin \varphi d\varphi = \frac{4}{3} a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \cdot \\ &\cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \psi \cos \psi d\psi = \frac{4}{3} a^3 \left[\frac{\sin^2 \varphi}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{\sin^4 \varphi}{4} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right] = \frac{4}{3} a^3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{a^3}{6} \text{ (kub birlik).} \end{aligned}$$

4-misol $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right)^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ sirt bilan chegaralangan jismning hajmini toping.

Yechim. Tenglikning har ikkala tomoni kvadratlar yig'indisi bo'lgani uchun berilgan jismning hamma oktantlardagi bo'laklarining kattaliklari bir hil bo'ladi.

Shuning uchun jismning 1 oktantdagi bo'lagining hajmini hisoblab, natijani 8 ga ko'paytirsak, berilgan jismning hajmi kelib chiqadi. Umumlashgan sferik koordinatalardan foydalanamiz,

$$x = ar \sin \psi \cos \varphi; \quad y = br \sin \psi \sin \varphi;$$

$$z = cr \cos \varphi \quad \left(0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}; 0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\text{Yakobian } |J(r, \varphi, \psi)| = abcr^2 \sin \varphi$$

x, y, z lar uchun sferik koordinatalarni berilgan tenglamaga qo'yib quyidagini topamiz:

$$\begin{aligned} [r^2 \sin^2 \varphi (\cos^2 \psi + \sin^2 \psi) + r^2 \cos^2 \varphi]^2 &= r^2 \sin^2 \varphi (\cos^2 \psi + \sin^2 \psi) \Rightarrow \\ \Rightarrow r^4 &= r^2 \sin^2 \varphi \Rightarrow r^2 \sin^2 \varphi \Rightarrow r = \sin \varphi \end{aligned}$$

$$\text{Bundan } V = \iiint dV = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\psi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{abc} abcr^2 \sin \varphi dr = 8abc \text{ (kub birlik).}$$

5-misol. $(x+2y+z)^2 + (y+2z)^2 + (2x+z)^2 = R^2$ ellipsoidning hajmini toping .

Yechim. O'zgaruvchilarni $\begin{cases} x+2y+z=u \\ y+2z=\vartheta \\ 2x+z=\omega \end{cases}$ formulalar yordamida

almashtiramiz . Natijada ellipsoidning tenglamasi $u^2 + v^2 + \omega^2 = R^2$ ko'rinishni oladi, bu esa u, ϑ, ω koordinatalar sistemasida sfera tenglamasidir. Yuqoridagi almashtirishlar orqali V soha (ellipsoid) V' sohaga (sharga) o'tadi .

$$V' = \{(u, \vartheta, \omega) \in R^3 : -R \leq u \leq R; -\sqrt{R^2 - u^2} \leq \vartheta \leq \sqrt{R^2 - u^2}; |\omega| \leq \sqrt{R^2 - u^2 - \vartheta^2}\}$$

Endi tenglamalar sistemasini yechib x, y, z larni aniqlaymiz:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 8 - 2 = 7;$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} u & 2 & 1 \\ \vartheta & 1 & 2 \\ \omega & 0 & 1 \end{vmatrix} = u - 2\vartheta + 3\omega;$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & u & 1 \\ 0 & \vartheta & 2 \\ 2 & \omega & 1 \end{vmatrix} = \vartheta + 4u - 2\vartheta - 2\omega = 4u - \vartheta - 2\omega;$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & u \\ 0 & 1 & \vartheta \\ 2 & 0 & \omega \end{vmatrix} = \omega + 4\vartheta - 2u.$$

Bundan

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{1}{7}(u - 2\vartheta + 3\omega),$$

$$y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{1}{7}(4u - \vartheta - 2\omega),$$

$$z = \frac{\Delta z}{\Delta} = \frac{1}{7}(\omega + 4\vartheta - 2u),$$

kelib chqadi.

$$\begin{aligned}\frac{\partial x}{\partial u} &= \frac{1}{7}; & \frac{\partial x}{\partial \vartheta} &= -\frac{2}{7}; & \frac{\partial x}{\partial \omega} &= \frac{3}{7}; \\ \frac{\partial y}{\partial u} &= \frac{4}{7}; & \frac{\partial y}{\partial \vartheta} &= -\frac{1}{7}; & \frac{\partial y}{\partial \omega} &= -\frac{2}{7}; \\ \frac{\partial z}{\partial u} &= -\frac{2}{7}; & \frac{\partial z}{\partial \vartheta} &= \frac{4}{7}; & \frac{\partial z}{\partial \omega} &= \frac{1}{7}.\end{aligned}$$

Yakobian

$$I(u, \vartheta, \omega) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial \vartheta} & \frac{\partial x}{\partial \omega} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial \vartheta} & \frac{\partial y}{\partial \omega} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial \vartheta} & \frac{\partial z}{\partial \omega} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{7} & -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{4}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} \\ -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} & \frac{1}{7} \end{vmatrix} = \frac{1}{7^3} \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & -1 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\frac{1}{7^3} (-1 - 8 + 48 - 6 + 8 + 8) = \frac{1}{7^3} \cdot 49 = \frac{1}{7}$$

$$V = \iiint_V dV = \iiint_V |I(u, \vartheta, \omega)| du d\vartheta d\omega = \frac{8}{7} \int_0^R du \int_0^{\sqrt{R^2 - u^2}} dv \int_0^{\sqrt{R^2 - u^2 - v^2}} d\omega = \frac{8}{7} \int_0^R du \int_0^{\sqrt{R^2 - u^2}} \sqrt{R^2 - u^2 - v^2} d\vartheta;$$

Lekin $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{\pi a^2}{4}$ ekani bizga ma'lum .

Bu erda a ni $\sqrt{a^2 - u^2}$ ga almashtirsak,

$$\int_0^{\sqrt{R^2 - u^2}} \sqrt{R^2 - u^2 - \vartheta^2} d\vartheta = \frac{\pi}{4} (R^2 - u^2) \text{ kelib chaqdi} .$$

Natijada

$$V = \frac{8}{7} \int_0^R \frac{\pi}{4} (R^2 - u^2) du = \frac{2\pi}{7} \left(R^2 u - \frac{u^3}{3} \right) \Big|_0^R = \frac{2\pi}{7} \left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) = \frac{2\pi}{7} \cdot \frac{2R^3}{3} = \frac{4\pi R^3}{21} \text{ (kub birlik)}.$$

Bu yerda ellipsoidning hajmini hisoblashda uning birinchi oktantdagi bo'lagining hajmini hisoblab, natijani 8 ga ko'paytirdik.

4.3. Uch karrali integrallarning mexanikaga tatbiqlari.

Jismning hajmi V bo'lib, ixtiyoriy $M(x, y, z)$ nuqtaning zinchligi $\rho(M) = \rho(x, y, z)$ bo'lsa, uning massasi

$$m = \iiint_V \rho(x, y, z) dV \quad (7)$$

formula bilan aniqlanadi.

Koordinata tekisliklariga nisbatan statik momentlari

$$M_{xy} = \iiint_V z\rho(x, y, z) dV; \quad M_{xz} = \iiint_V y\rho(x, y, z) dV; \quad M_{yz} = \iiint_V x\rho(x, y, z) dV; \quad (8)$$

Og'irlik markazining koordinatalari

$$x_0 = \frac{\iiint_V x\rho(x, y, z) dV}{m}; \quad y_0 = \frac{\iiint_V y\rho(x, y, z) dV}{m}; \quad z_0 = \frac{\iiint_V z\rho(x, y, z) dV}{m}$$

(9)

Koordinata o'qlariga nisbatan inersiya momentlari

$$I_x = \iiint_V (y^2 + z^2)\rho(x, y, z) dV; \quad I_y = \iiint_V (z^2 + x^2)\rho(x, y, z) dV; \quad I_z = \iiint_V (x^2 + y^2)\rho(x, y, z) dV; \quad (10)$$

formula bilan aniqlanadi.

Koordinata tekisliklariga nisbatan inersiya momentlari esa quyidagicha topiladi:

$$I_{xy} = \iiint_V z^2 \rho(x, y, z) dV; \quad I_{xz} = \iiint_V y^2 \rho(x, y, z) dV; \quad I_{yz} = \iiint_V x^2 \rho(x, y, z) dV;$$

Qaralayotgan jism massasi $A(\xi, \eta, \zeta)$ nuqtani Nyuton qonuni bo'yicha tortish kuchini \bar{F} bilan belgilasak, \bar{F} ning o'qlardagi proyeksiyalari quyidagi formula bilan aniqlanadi: (A nuqta massasi m ga teng bo'lsa)

$$F_x = k \iiint_V m \frac{x - \xi}{r^3} \rho(x, y, z) dV; \quad F_y = k \iiint_V m \frac{y - \eta}{r^3} \rho(x, y, z) dV; \quad F_z = k \iiint_V m \frac{z - \zeta}{r^3} \rho(x, y, z) dV; \quad (11)$$

Bu yerda

$$r = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}; \quad \bar{F} = \{F_x, F_y, F_z\}$$

k- Nyuton koeffitsenti (gravitatsion doimiylik).

Sunga o'xshash berilgan jismning A nuqtaga potensialini aniqlaymiz:

$$W = \iiint_V \frac{\rho(x, y, z) dV}{r} \quad (12)$$

Bu yerda ikkita holga e'tibor berish kerak:

1) Agar $A(\xi, \eta, \zeta)$ nuqta berilgan jismdan tashqarida yotsa, u holda (11), (12) integrallar xosmas integrallar hisoblanadi, lekin bu holda ham (11), (12) integrallar mavjuddir. Endi tipik misollar yechishga o'tamiz.

1-misol. *Birlik kub ($0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 1; 0 \leq z \leq 1$) har bir $m(x, y, z)$ nuqtasidagi zichligi $\rho(x, y, z) = x + y + z$ formula bilan berilgan Massasini hisoblang.*

Yechim. (22) formulaga ko'ra

$$\begin{aligned} m &= \iiint_V \rho(x, y, z) dV = \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^1 (x + y + z) dz = \int_0^1 dx \int_0^1 \left(xz + yz + \frac{z^2}{2} \right) \Big|_0^1 dy = \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 \left(x + y + \frac{1}{2} \right) dy = \int_0^1 \left(xy + \frac{y^2}{2} + \frac{1}{2} y \right) \Big|_0^1 dx = \int_0^1 (x + 1) dx = \left(\frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} + 1 = 1,5 \end{aligned}$$


2-misol. $z = x^2 + y^2$ paraboloid $x + y = a, x = 0, y = 0, z = 0$; tekisliklar bilan chegaralangan bir jinsli og'irlik markazining koordinatalarini topining.

Yechim. Berilgan jism bir jinsli bo'lgani uchun $\rho = (x, y, z) = 1$ deb olamiz. Bu holda jism massasi son jihatdan uning hajmiga teng, ya'ni $m = V$ bo'ladi V soha quyidagicha bo'ladi:

$$V = \{(x, y, z) \in R^3 : 0 \leq x \leq a; 0 \leq y \leq a - x, 0 \leq z \leq x^2 + y^2\}$$

jism massasi

$$\begin{aligned} m &= \iiint_V dV = \int_0^a dx \int_0^{a-x} dy \int_0^{x^2+y^2} dz = \int_0^a dx \int_0^{a-x} (x^2 + y^2) dy = \int_0^a dx \int_0^{a-x} (x^2 + y^2) dy = \\ &= \int_0^a \left(x^2 y + \frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^{a-x} dx = \int_0^a \left(ax^2 - x^3 + \frac{(a-x)^3}{3} \right) dx = \\ &= \left(a \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{(a-x)^4}{12} \right) \Big|_0^a = \frac{a^4}{3} - \frac{a^4}{4} + \frac{a^4}{12} = \frac{a^4}{6} \end{aligned}$$



Endi (12) formulalar yordamida koordinata tekisliklariga nisbatan statik momentlerini topamiz:

$$\begin{aligned}
 M_{xy} &= \iiint_V z dV = \int_0^a dx \int_0^{a-x} dy \int_0^{x^2+y^2} zdz = \int_0^a dx \int_0^{a-x} \frac{(x^2+y^2)^2}{2} dy = \\
 &= \int_0^a dx \int_0^{a-x} \frac{1}{2}(x^4 + 2x^2y^2 + y^4) dy = \frac{1}{2} \int_0^a \left(x^4 y + 2x^2 \cdot \frac{y^3}{3} + \frac{y^5}{5} \right) \Big|_0^{a-x} dx = \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^a \left[ax^4 - x^5 + \frac{2}{3}x^2(a^3 - 3a^2x + 3ax^2 - x^3) + \frac{1}{5}(a-x)^5 \right] dx = \frac{1}{2} \int_0^a \left[ax^4 - x^5 + \frac{2}{3}a^3x^2 - \right. \\
 &\quad \left. - 2a^2x^3 + 2ax^4 - \frac{2}{3}x^5 + \frac{1}{5}(a-x)^5 \right] dx = \frac{1}{2} \left[a \cdot \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{6} + \frac{2}{3}a^3 - \frac{x^3}{3} - 2a^2 \cdot \frac{x^4}{4} + 2a \cdot \frac{x^5}{5} - \frac{2}{3} \cdot \frac{x^6}{6} - \right. \\
 &\quad \left. - \frac{1}{5} \cdot \frac{(a-x)^6}{6} \right] \Big|_0^a = \frac{1}{2} a^6 \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{2}{9} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{9} + \frac{1}{30} \right) = \frac{1}{2} a^3 \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} \right) = \frac{7}{180} a^6. \\
 M_{xz} &= \iiint_V y dV = \int_0^a dx \int_0^{a-x} dy \int_0^{x^2+y^2} y dz = \int_0^a dx \int_0^{a-x} (x^2 y + y^3) dy = \int_0^a \left(\frac{x^2 y^2}{2} + \frac{y^4}{4} \right) \Big|_0^{a-x} dx = \\
 &= \int_0^a \left[\frac{1}{2} a^2 x^2 - a x^3 + \frac{1}{2} x^4 (a-x)^4 \right] dx = \left(\frac{a^2}{2} \cdot \frac{x^3}{3} - a \cdot \frac{x^4}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^5}{5} - \frac{1}{4} \cdot \frac{(a-x)^5}{5} \right) \Big|_0^a = \\
 &= a^5 \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) = a^5 \left(\frac{3}{20} - \frac{1}{12} \right) = \frac{9-5}{60} a^5 = \frac{1}{15} a^5; \\
 M_{yz} &= \iiint_V x dV = \int_0^a dx \int_0^{a-x} dy \int_0^{x^2+y^2} x dz = \int_0^a x dx \int_0^{a-x} (x^2 + y^2) dy = \int_0^a x \left(x^2 y + \frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^{a-x} dx = \\
 &= \int_0^a \left[a x^3 - x^4 + \frac{1}{3} (a^3 x - 3a^2 x^2 + 3ax^3 - x^4) \right] dx = \left(a \cdot \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} + \frac{1}{3} a^3 \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{1}{3} a^2 x^3 + a \cdot \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{15} \right) \Big|_0^a =
 \end{aligned}$$

$$= a^5 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{15} \right) = a^5 \left(\frac{1}{2} - \frac{4}{15} - \frac{1}{6} \right) = a^5 \left(\frac{1}{3} - \frac{4}{15} \right) = \frac{1}{15} a^5;$$

$$\text{Demak, } M_{xx} = M_{yy} = \frac{1}{15} a^5, \quad M_{xy} = \frac{7}{180} a^6$$


Bularni (13) formulaga qo'ysak, og'irlik markazining koordinatalari kelib chiqadi:

$$x_0 = y_0 = \frac{a^5}{15} : \frac{a^4}{6} = \frac{2}{5} a; \quad z_0 = \frac{7a^6}{180} : \frac{a^4}{6} = \frac{7}{30} a^2.$$

3-misol. $\left(\frac{z}{c}\right)^2 = \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2$ konusning har bir $M(x, y, z)$

nuqtasidagi zichligi shu nuqtadan xOy tekisligigacha bo'lgan masofaga proporsional bo'lib, proporsionallik koeffitsienti k ga teng. Shu konusning $z=c$ ($c > 0$) tekislik bilan kesilgan bo'lagining massaasi va og'irlik markazining koordinatalarini toping.

Yechim.



Masalani yechishda umumlashgan silindrik koordinatalardan foydalanamiz: $x = ar \cos \varphi$, $y = br \sin \varphi$, $z = z$.

Bularni yuqoridagi tenglamaga qo'ysak, $z = cz$ kelib chiqadi. Natijada yangi koordinatalar uchun integrallash sohasi quyidagicha bo'ladi:

$$V' = \{(\varphi, r, z) : 0 \leq \varphi \leq 2\pi; 0 \leq r \leq 1; cr \leq z \leq c\}, \quad I(\varphi, r, z) = abr$$

jism massasi

$$m = \iiint_V kz dV = k \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_{cr}^c z |I(\varphi, r, z)| dz = abk \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \int_0^1 dr \int_{cr}^c rz dz =$$

$$= \frac{abk}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r(c^2 - c^2 r^2) dr = \frac{abc^2 k}{2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^1 d\varphi = \frac{abc^2 k}{2 \cdot 4} \cdot 2\pi = \frac{\pi k abc^2}{4};$$

(12) formulalarga ko'ra quyidagini topamiz:


$$M_{xy} = \iiint_V z\rho(\varphi, r, z) dV = k \iiint_V z^2 dV = k \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^c dr \int_{cr}^c abc z^2 dz = kab \cdot 2\pi \int_0^c r \left(\frac{c^3}{3} - \frac{c^3 r^3}{3} \right) dr = \\ = \frac{2\pi kabc^3}{3} \int_0^c (r - r^4) dr = \frac{2\pi kabc^3}{3} \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^5}{5} \right) \Big|_0^c = \frac{2\pi kabc^3}{3} \cdot \frac{3}{10} = \frac{1}{5} \pi kabc^2.$$

Berilgan jismning zinchligi x, y larga bog'liq emas, demak y gorizontal kesimda o'zgarmasdir, bundan tashqari Oz jismning simmetriya o'qidir, shuning uchun og'rlik markazi Oz o'qida yotadi, demak $x_0 = y_0 = 0$ bo'ladi.

$$z_0 = \frac{M_{xy}}{m} = \frac{4}{5}c; \quad \left(0, 0, \frac{4}{5}c\right)$$

4-misol. Radiusi R va massasi M ga teng bo'lgan sharning har bir nuqtasidagi zinchligi shu nuqtadan shar markazigacha bo'lgan masofaga proporsional bo'lsa, shu sharning diametriga nisbatan inersiya momentini toping.

Yechim



Bu yerda shu narsaga e'tibor qilish kerakki, sharning diametrlari cheksiz ko'p, lekin ularning hammasiga nisbatan inertsiya momentlari bir xil, ya'ni o'zgarmas- bo'ladi. Sharni koordinatalar sistemasida shunday joylashtiramizki, uning markazi koordinatalar boshi bo'lsin. Agar sharning koordinata o'qlaridan biriga (masalan Oz ga) nisbatan inertsiya momentini topsak, masala yechilgan bo'ladi. Shartga ko'ra ixtiyoriy $Q(x, y, z)$ nuqtasidagi zinchligi $\rho(Q) = \rho(x, y, z) = k\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ bo'ladi. Bu yerda proporsionallik koefisienti k ni quydagicha shartdan aniqlaymiz:

$$M = \iiint_V \rho(x, y, z) dV = k \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV$$

$$\left. \begin{array}{l} x = r \sin \psi \cos \varphi \\ y = r \sin \psi \sin \varphi \\ z = r \cos \psi \end{array} \right\} \text{sferik koordinatalarga o'tamiz}$$

Yakobian $|I(\varphi, \psi, r)| = r^2 \sin \psi$ ekanib bizga ma'lum. Bizning masalamizda

$$V' = \{(\varphi, \psi, r) : 0 \leq \varphi \leq \pi; 0 \leq \psi \leq 2\pi; 0 \leq r \leq R\}$$

Bularni o'rniga qo'yib, yuqorida integralni hisoblaymiz.

$$M = k \int_0^\pi d\psi \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R r^3 \sin \psi dr = k \cdot 2\pi \int_0^\pi \frac{R^4}{4} \sin \psi d\psi = \frac{k\pi R^4}{2} \cdot (-\cos \psi) \Big|_0^\pi = k\pi R^4.$$

Bundan $k = \frac{M}{\pi R^4}$ kelib chiqadi. (14) formulaga ko'ra, quydagiga teng bo'ladi:

$$\begin{aligned} I_z &= \iiint_V (x^2 + y^2) \cdot \rho(x, y, z) dV = \iiint_V r^2 \sin^2 \psi \cdot k \cdot r |I(\varphi, \psi, r)| dV = \\ &= k \cdot \int_0^\pi d\psi \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R r^5 \sin^3 \psi dr = \\ &= -2\pi k \cdot \frac{R^2}{6} \int_0^\pi (1 - \cos^2 \psi) d\cos \psi = -\frac{\pi k R^2}{3} \left(\cos \psi - \frac{\cos^3 \psi}{3} \right) \Big|_0^\pi = -\frac{\pi k R^6}{3} \left(-2 + \frac{2}{3} \right) = \frac{4\pi k R^6}{9}; \end{aligned}$$

Bu yerda k o'rniga yuqorida topilgan qiymatini qo'ysak, diametrga yoki baribir Oz o'qiga nisbatan inertsiya momenti kelib chqadi.

$$I_z = \frac{4\pi R^6}{9} \cdot \frac{M}{\pi R^4} = \frac{4}{9} MR^2$$

5-misol. Zichligi o'zgarmas ρ_0 ga, asosining radiusi a ga va balandligi h ga teng bo'lgan bir jinsli silindr bilan asosining markazining massasi m ga teng.

Yechim. Silindrni koordinatalar sistemasida shunday joylashtiramizki, uning asosi xOy tekisligida, o'qi esa Oz o'qi bilan ustma-ust tushsin. Natijada asosining markazi $O(0,0,0)$ nuqtada bo'ladi.

TESTLAR

1. Funksiya hosilasi

1. $y=f(x)$ funksiyaning Δx argument orttirmasiga mos keladigan Δf funksiya orttirmasi qayerda to‘g‘ri ifodalangan ?

A) $\Delta f=f(x)-f(\Delta x)$. B) $\Delta f=f(x+\Delta x)-f(\Delta x)$. C) $\Delta f=f(x)\Delta x$.

D) $\Delta f=f(x+\Delta x)-f(x-\Delta x)$. E) $\Delta f=f(x+\Delta x)-f(x)$.

2. $y=20$ o‘zgarmas funksiyaning Δy orttirmasi qayerda to‘g‘ri ko‘rsatilgan ?

A) Δx . B) $-\Delta x$. C) 1. D) 0 E) 5 .

3. $y=x^3$ funksiyaning Δy orttirmasi qayerda to‘g‘ri ko‘rsatilgan ? .

A) $3x^2\Delta x + (\Delta x)^3$. B) $3x^2\Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$. C) $3x^2\Delta x + 3x(\Delta x)^2$.

D) $3x(x+3\Delta x)\Delta x$. E) $3x(x+\Delta x)(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$.

4. $y=x^3$ funksiya uchun $\Delta y/\Delta x$ orttirmalar nisbatini toping .

A) $3x^2 + (\Delta x)^2$. B) $3x(x+3\Delta x)$. C) $3x^2 + 3x\Delta x$.

D) $3x^2 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2$. E) $3x\Delta x(x+\Delta x) + (\Delta x)^3$.

5. $y=f(x)$ funksiya hosilasini ta’rif bo‘yicha hisoblashda quyidagi amallardan qaysi biri bajariladi ?

A) x argumentga Δx orttirma beriladi.

B) funksiya orttirmasi Δf hisoblanadi.

C) orttirmalar nisbati $\Delta f/\Delta x$ hisoblanadi.

D) $\Delta f/\Delta x$ nisbatning $\Delta x \rightarrow 0$ bo‘lganligi limiti hisoblanadi.

E) ko‘rsatilgan amallarning barchasi bajariladi.

6. $y=f(x)$ funksiya hosilasining ta’rifi qayerda to‘g‘ri ko‘rsatilgan ?

A) $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow \infty} \frac{\Delta f}{\Delta x}$. B) $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta f}$. C) $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$.

D) $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow \infty} \frac{\Delta x}{\Delta f}$. E) $f'(x) = \lim_{\Delta f \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta f}$.

7. Hosilaning mexanik ma’nosi qayerda to‘g‘ri ko‘rsatilgan ?

A) harakatda bosib o‘tilgan masoфа.

B) harakatda sarflangan vaqt.

C) harakatda oniy tezlik.

D) harakatda to‘xtash holati.

E) harakatni boshlash holati.

8. Hosilaning geometrik ma’nosi qayerla to‘g‘ri ko‘rsatilgan ?

A) chiziqqa o‘tkazilgan kesuvchining burchak koeffitsenti.

- B) chiziqqa o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsenti.
 C) chiziqqa o'tkazilgan normalning burchak koeffitsenti.
 D) chiziqqa o'tkazilgan urinma va OX o'q orasidagi burchak tangensi.

E) chiziqqa o'tkazilgan urinma va OY o'q orasidagi burchak tangensi.

9. Quyidagilardan qaysi biri $y=f(x)$ funksiya grafigiga (x_0, y_0) nuqtada o'tkazilgan urinma tenglamasini ifodalaydi ?

A) $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$. B) $y - y_0 = f'(x_0)x$.

C) $y - y_0 = f'(x_0)x_0$. D) $x - x_0 = f'(x_0)(y - y_0)$.

E) $y - y_0 = \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$.

10. Quyidagilardan qaysi biri $y=f(x)$ funksiya grafigiga (x_0, y_0) nuqtada o'tkazilgan urinma tenglamasini ifodalamaydi ?

A) $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$. B) $\frac{y - y_0}{x - x_0} = f'(x_0)$.

C) $y = y_0 + f'(x_0)(x - x_0)$. D) $x - x_0 = f'(x_0)(y - y_0)$.

E) $\frac{x - x_0}{y - y_0} = \frac{1}{f'(x_0)}$.

11. $y=x^2$ parabolaning $x_0=2$ abssissali nuqtasiga o'tkazilgan urinma tenglamasini aniqlang .

A) $y=x+2$. B) $y=2x+2$. C) $y=3x-2$. D) $y=4x-4$. E) $y=2x$.

12. $y=x^2$ parabolaning $x_0=-2$ abssissali nuqtasiga o'tkazilgan urinma tenglamasini aniqlang .

A) $y=x-2$. B) $y=2x-2$. C) $y=3x-2$. D) $y=-4x-4$. E) $y=2x$.

13. $y=x^3$ kubik parabolaning $x_0=-1$ abssissali nuqtasiga o'tkazilgan urinma tenglamasini aniqlang .

A) $y=3x+2$. B) $y=3x+4$. C) $y=3x-2$. D) $y=3x-4$. E) $y=3x$.

14. $y=x^3$ kubik parabolaning $x_0=1$ abssissali nuqtasiga o'tkazilgan urinma tenglamasini aniqlang .

A) $y=3x+2$. B) $y=3x+4$. C) $y=3x-2$. D) $y=3x-4$. E) $y=3x$.

15. $y=e^x$ ko'rsatkichli funksiya grafigining $x_0=0$ abssissali nuqtasiga o'tkazilgan urinma tenglamasini yozing .

A) $y=2x+1$. B) $y=x+2$. C) $y=2x-1$. D) $y=x-2$. E) $y=x+1$.

16. $y=\sin x$ funksiya grafigining $x_0=0$ abssissali nuqtasiga o'tkazilgan urinma tenglamasini yozing .

A) $y=x+1$. B) $y=x-1$. C) $y=x$. D) $y=-x$. E) $y=1$.

17. $y=\cos x$ funksiya grafigining $x_0=0$ abssissali nuqtasiga o'tkazilgan urinma tenglamasini yozing .

A) $y=x+1$. B) $y=x-1$. C) $y=x$. D) $y=-x$. E) $y=1$.

18. $S(t)=t^2$ harakat tenglamasiga ega bo'lgan moddiy nuqtaning $t=1$ vaqtdagi oniy tezligini toping .

A) 0. B) 1. C) -1. D) 2. E) -2.

19. **Ta'rifni to'ldiring:** Berilgan $y=f(x)$ funksiya berilgan x_0 nuqtada differensiallanuvchi deyiladi, agar u bu nuqtadaqiymatli hosilaga ega bo'lsa ?

A) musbat. B) manfiy. C) noldan farqli. D) chekli. E) nolga teng.

20. $y=|x|$ funksiya uchun $(0,1)$ oraliqda qaysi tasdiq o'rinni?

A) funksiya differensiallanuvchi va uning hosilasi $y'=1$.

B) funksiya differensiallanuvchi va uning hosilasi $y'=0$.

C) funksiya differensiallanuvchi va uning hosilasi $y'=-1$.

D) funksiya differensiallanuvchi emas.

E) barcha tasdiqlar o'rinni emas.

2. Funksiyani differensiallash.

1. Differensiallash qoidasi qayerda xato ko'rsatilgan ?

A) $(Cu)'=Cu'$ (C-const.). B) $(u \pm v)'=u' \pm v'$. C) $(u \cdot v)'=u'v+uv'$.

D) $\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v+uv'}{v^2}$. E) $(f(u))'=f'(u)u'$.

2. Differentsiallanuvchi u va v funksiyalar u/v nisbatining hosilasini hisoblash formulasi to'g'ri yozilgan javobni ko'rsating.

A) $\frac{u'v+uv'}{v}$. B) $\frac{u'v+uv'}{v^2}$. C) $\frac{u'v-uv'}{v^2}$.

D) $\frac{u'v-uv'}{v}$ E) $\frac{u'v'-uv}{v^2}$.

3. $y=x^2/\sin x$ funksiyaning y' hosilasini hisoblang.

A) $y'=x^2/\cos x$. B) $y'=2x/\sin x$. C) $y'=2x/\cos x$.

D) $y'=x(2\sin x+x\cos x)/\sin^2 x$. E) $y'=x(2\sin x-x\cos x)/\sin^2 x$.

4. Differentsiallanuvchi u va v funksiyalar $u \cdot v$ ko'paytnasining hosilasini hisoblash formulasi qayerda to'g'ri yozilgan ?

A) $u'v'$. B) $u'v'+uv$. C) $u'v+uv'$. D) $u'v-uv'$. E) $u'v'-uv$.

5. $y=x^2\sin x$ funksiyaning y' hosilasini hisoblang.

A) $y'=x^2\cos x$. B) $y'=x(x\sin x-2\cos x)$. C) $y'=2x\sin x$.

D) $y'=x(x\cos x+2\sin x)$. E) $y'=x(x\cos x-2\sin x)$.

6. Agar $y=f(x)$, $u=u(x)$ differensiallanuvchi funksiyalar bo'lsa, $y=f(u)$ murakkab funksiya hosilasini hisoblash formulasini ko'rsating.

A) $y'=f'(u)$. B) $y'=f(u')$. C) $y'=f'(u)$.

D) $y'=f'(u)u'$. E) $y'=f(u')u'$.

7. $f(x)=\sin x$, $u(x)=\ln x$ funksiyalar bo'yicha tuzilgan $y=f(u)=\sin \ln x$ murakkab funksiya hosilasini hisoblang.

A) $y'=\cos \ln x$. B) $y'=\sin(1/x)$. C) $y'=(\sin \ln x)/x$.

D) $y'=(\cos \ln x)/\ln x$. E) $y'=(\cos \ln x)/x$.

8. $y=\sin \operatorname{arcsin} x$ ($-1 \leq x \leq 1$) murakkab funksiya hosilasini hisoblang.

A) $y'=\cos \operatorname{arcsin} x$. B) $y'=1$. C) $y'=\sin \operatorname{arccos} x$.

D) $y'=\cos \operatorname{arccos} x$. E) $y'=x$.

9. $y=\cos(x^2+1)$ funksiyaning y' hosilasini hisoblang.

A) $y'=\sin(x^2+1)$. B) $y'=-\sin(x^2+1)$. C) $y'=\sin 2x$.

D) $y'=2x \sin(x^2+1)$. E) $y'=-2x \sin(x^2+1)$.

10. $y=e^{x^4}$ funksiyaning hosilasi to'g'ri yozilgan javobni toping.

A) $x^4 \cdot e^{x^4-1}$. B) $4x^3 \cdot e^{x^4}$. C) $4x^3 \cdot e^{x^4} \cdot \lg e$.

D) $4x^3 \cdot e^{x^4-1} \cdot \lg e$. E) e^{x^4} .

11. $y=f(x)$ differensiallanuvchi va qat'iy monoton funksiya bo'lsa, unga teskari $y=f^{-1}(x)$ funksiya hosilasini qanday shartda topib bo'lmaydi?

A) $f'(x)>0$. B) $f'(x)<0$. C) $f'(x)\neq 0$. D) $f'(x)=0$.

E) keltirilgan barcha shartlarda topib bo'ladi.

12. $y=2x+5$ funksiyaga teskari funksiya hosilasini toping.

A) 2. B) 5. C) 1/2. D) 1/5. E) 0.

13. Giperbolik sinus deb ataladigan $\operatorname{sh} x = (e^x - e^{-x})/2$ funksiyaga teskari $\operatorname{arcsh} x$ funksiyaning hosilasini toping.

A) $(\operatorname{arcsh} x)' = (e^x + e^{-x})/2$. B) $(\operatorname{arcsh} x)' = 2/(e^x + e^{-x})$. C) $(\operatorname{arcsh} x)' = \sqrt{1+x^2}$.

D) $(\operatorname{arcsh} x)' = 1/\sqrt{1+x^2}$. E) $(\operatorname{arcsh} x)' = 1/\sqrt{1-x^2}$.

14. Giperbolik cosinus deb ataladigan $\operatorname{ch} x = (e^x + e^{-x})/2$ funksiyaga teskari $\operatorname{arcch} x$ funksiyaning hosilasini toping.

A) $(\operatorname{arcch} x)' = (e^x - e^{-x})/2$. B) $(\operatorname{arcch} x)' = 2/(e^x - e^{-x})$. C) $(\operatorname{arcch} x)' = \sqrt{x^2 + 1}$.

$$D) (\operatorname{arcch}x)' = 1/\sqrt{x^2 + 1}. \quad E) (\operatorname{arcch}x)' = 1/\sqrt{x^2 - 1}.$$

15. $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$ differensillanuvchi funksiyalar orqali parametrik ko'rinishda berilgan $y=y(x)$ funksiyaning $y'=y'(x)$ hosilasini hisoblash formulasini toping.

$$A) y' = \left(\frac{\varphi(t)}{\psi(t)}\right)' . \quad B) y' = \left(\frac{\psi(t)}{\varphi(t)}\right)' . \quad C) y' = \frac{\varphi'(t)}{\psi'(t)} . \quad D) y' = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} .$$

E) to'g'ri javob keltirilmagan.

16. $x=\sin t$, $y=\cos t$ funksiyalar orqali parametrik ko'rinishda berilgan $y=y(x)$ funksiyaning $y'=y'(x)$ hosilasini toping.

$$A) y' = -\operatorname{ctgt} t. \quad B) y' = -\operatorname{tgt} t. \quad C) y' = 1/\cos^2 t.$$

$$D) y' = -1/\sin^2 t. \quad E) \text{to'g'ri javob keltirilmagan.}$$

17. $y=a^x$ ko'rsatkichli funksiya hosilasini toping.

$$A) y' = a^x. \quad B) y' = x a^{x-1}. \quad C) y' = a^x \ln a. \quad D) y' = a^x \log_a e.$$

E) to'g'ri javob ko'rsatilmagan.

18. $y=\log_a x$ funksiya hosilasini toping.

$$A) y' = \frac{1}{x}. \quad B) y' = \frac{1}{x} \ln a. \quad C) y' = \frac{1}{x} a. \quad D) y' = \frac{1}{x \ln a}.$$

E) to'g'ri javob ko'rsatilmagan.

19. Qaysi trigonometrik funksiya hosilasi xato ko'rsatilgan ?

$$A) (\sin x)' = \cos x. \quad B) (\cos x)' = \sin x. \quad C) (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

$$D) (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}. \quad E) \text{barcha hosilalar to'g'ri ko'rsatilgan.}$$

20. Qaysi teskari trigonometrik funksiyaning hosilasi to'g'ri ko'rsatilgan ?

$$A) (\arcsin x)' = 1/(1-x^2). \quad B) (\arccos x)' = 1/\sqrt{x^2-1}.$$

$$C) (\operatorname{arctg} x)' = 1/\sqrt{x^2+1}. \quad D) (\operatorname{arcctg} x)' = -1/\sqrt{x^2+1}.$$

E) barcha hosilalar xato ko'rsatilgan.

3. Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral.

1. Quyidagi shartlarning qaysi birida $F(x)$ berilgan $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi deyiladi ?

$$A) F(x) = f(x) + C \text{ (C-const).} \quad B) \lim_{t \rightarrow x} F(t) = f(x).$$

$$C) F'(x) = f(x). \quad D) F''(x) = f(x). \quad E) F(x) = f'(x).$$

2. Quyidagilardan qaysi biri $f(x)=\ln x$ uchun boshlang'ich funksiya bo'ladi?

A) $\frac{1}{x}$. B) $x \ln x$. C) $x \ln x + x$. D) $x \ln x - x$. E) $\frac{1}{x} \ln x - x$.

3. Quyidagilardan qaysi birining boshlang'ich funksiyasi $F(x)=x \cos x$ bo'ladi?

A) $x^2 \sin x$. B) $-\sin x$. C) $\cos x - x \sin x$.
D) $\sin x + x \cos x$. E) $x(\sin x + \cos x)$.

4. *Teoremani to'ldiring:* Agar $F(x)$ biror $f(x)$ funksiya uchun boshlang'ich funksiya bo'lsa, unda ixtiyoriy C o'zgarmas soni uchun ... funksiya ham $f(x)$ uchun boshlang'ich funksiya bo'ladi.

A) $C \cdot F(x)$. B) $C - F(x)$. C) $C + F(x)$. D) $C/F(x)$. E) $F(x+C)$.

5. Agar $F_1(x)$ va $F_2(x)$ berilgan $f(x)$ funksiya uchun boshlang'ich funksiyalar bo'lsa, unda biror C o'zgarmas soni uchun quyidagi tengliklardan qaysi biri o'rinni bo'ladi?

A) $F_1(x)F_2(x)=C$. B) $F_1(x)/F_2(x)=C$. C) $F_1(x)+F_2(x)=C$.
D) $F_1(x)-F_2(x)=C$. E) $F_1(x) \pm F_2(x)=C$.

6. Agar $F(x)$ biror $f(x)$ funksiya uchun boshlang'ich funksiya bo'lsa, unda ta'rif bo'yicha $\int f(x)dx$ aniqmas integral qanday aniqlanadi ?

A) $C \cdot F(x)$. B) $C - F(x)$. C) $C + F(x)$. D) $C/F(x)$. E) $F(x+C)$.

7. Aniqmas integralning geometrik ma'nosi qayerda to'g'ri va to'liq ko'rsatilgan?

- A) Qandaydir to'g'ri chiziq.
B) Qandaydir egri chiziq.
C) Qandaydir chiziqlar sinfi.
D) OX o'qi bo'yicha o'zaro parallel chiziqlar sinfi.
E) OY o'qi bo'yicha o'zaro parallel chiziqlar sinfi.

8. Qayerda aniqmas integralning xossasi xato ko'rsatilgan ?

A) $\left(\int f(x)dx \right)' = f(x)$. B) $d\left(\int f(x)dx \right) = f(x)dx$.

C) $\int dF(x) = F(x) + C$. D) $\int F'(x)dx = F(x) + C$.

E) Barcha xossalari to'g'ri ko'rsatilgan.

9. Aniqmas integral uchun qaysi tenglik bajarilmaydi ?

A) $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$.

B) $\int f(x)g(x)dx = \int f(x)dx \cdot \int g(x)dx$.

C) $\int [f(x) - g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$.

D) $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ ($k - const$).

E) keltirilgan barcha tengliklар бajariladi.

10. Agarda $F(x)$ va $G(x)$ mos ravishda $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar uchun boshlang'ich funksiyalar, a va b ixtiyoriy o'zgarmas sonlar bo'sha, $\int [af(x) + bg(x)]dx$ aniqmas integral javobi qayerda to'g'ri ko'rsatilgan?

A) $(a+C)F(x)+(b+C)G(x)$. B) $aF(x)+bG(x)+C$.

C) $aF(x)-bG(x)+C$. D) $F(ax)+G(bx)+C$.

E) $(a+C)F(x)-(b+C)G(x)$.

11. Quyidagi tengliklardan qaysi biri integralning chiziqlilik xossasini ifodalamaydi ?

A) $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$.

B) $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ ($k - const$).

C) $\int [f(x) - g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$.

D) $\int [A \cdot f(x) + B \cdot g(x)]dx = A \int f(x)dx + B \int g(x)dx$.

E) Barcha tengliklар integralni chiziqlilik xossasini ifodalaydi.

12. Qaysi darajali funksiyaning aniqmas integrali noto'g'ri yozilgan ?

A) $\int \sqrt{x}dx = \frac{2x\sqrt{x}}{3} + C$. B) $\int \frac{1}{x^2}dx = -\frac{1}{x} + C$. C) $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx = 2\sqrt{x} + C$.

D) $\int \sqrt[3]{x}dx = \frac{3x^{\frac{4}{3}}}{4} + C$. E) $\int \frac{1}{x}dx = -\frac{1}{x^2} + C$.

13. Integrallar jadvalidan keltirilgan quyidagi tengliklardan qaysi biri xato yozilgan ?

A) $\int \cos xdx = \sin x + C$. B) $\int \sin xdx = -\cos x + C$.

C) $\int a^x dx = a^x + C$. D) $\int \operatorname{tg} xdx = -\ln|\cos x| + C$. E) $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$.

14. Integrallar jadvalidan keltirilgan quyidagi tengliklardan qaysi biri to'g'ri yozilgan?

A) $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{ctgx} x + C$. B) $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{tg} x + C$. C) $\int e^x dx = \frac{e^x}{\lg e} + C$.

D) $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arcsin x + C$. E) $\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$.

15. Qaysi trigonometrik funksiya aniqmas integralining javobi noto'g'ri ko'rsatilgan?

A) $\int \cos x dx = \sin x + C$. B) $\int \sin x dx = -\cos x + C$.

C) $\int \operatorname{tg} x dx = \ln|\cos x| + C$. D) $\int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$.

E) barcha aniqmas integrallarning javobi to‘g‘ri ko‘rsatilgan.

16. Teskari trigonometrik funksiyalar bilan bog‘liq qaysi aniqmas integral javobi xato ifodalangan?

A) $\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C$. B) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$.

C) $\int \frac{dx}{1+x^2} = -\operatorname{arcctg} x + C$. D) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\arccos x + C$.

E) barcha aniqmas integrallar to‘g‘ri ifodalangan.

17. $\int (3\cos x - 2\sin x) dx$ aniqmas integralni hisoblang.

A) $-3\sin x - 2\cos x + C$. B) $3\sin x - 2\cos x + C$. C) $3\sin x + 2\cos x + C$.

D) $-3\sin x + 2\cos x + C$. E) $-\sin 3x + \cos 2x + C$.

18. $\int (\frac{5}{x} - 2x + 1) dx$ aniqmas integralni hisoblang.

A) $\frac{5}{x^2} - 2x + C$. B) $5x - x^2 + C$. C) $-5x - 2x^2 + x + C$.

D) $5\ln|x| - x^2 + x + C$. E) $5\ln|x| - x^2 + C$.

19. Agar $f(x)$ funksiya uchun $F(x)$ boshlang‘ich funksiya bo‘lsa, unda $f(ax+b)$ uchun quyidagilardan qaysi biri boshlang‘ich funksiya bo‘ladi?

A) $F(ax+b)$. B) $aF(ax+b)$. C) $(a+b)F(ax+b)$.

D) $\frac{1}{a+b}F(ax+b)$. E) $\frac{1}{a}F(ax+b)$.

20. $\int \cos(10x+7) dx$ aniqmas integral javobi qayerda to‘g‘ri ifodalangan?

A) $\sin(10x+7)+C$. B) $10\sin(10x+7)+C$. C) $7\sin(10x+7)+C$.

D) $10^{-1}\sin(10x+7)+C$. E) $7^{-1}\sin(10x+7)+C$.

4. Aniqmas integralni hisoblash

1. Aniqmas integralni hisoblashning qaysi usuli mavjud emas?

A) ko‘paytirish usuli. B) o‘zgaruvchini almashtirish usuli.

C) differensial ostiga kiritish usuli. D) yoyish usuli.

E) bo‘laklab integrallash usuli.

2. Qaysi tenglik aniqmas integralni yoyish usulida hisoblashni ifodalaydi?

A) $\int f(x)dx = \int u dv = uv - \int v du$. B) $\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$.

C) $\int f(x)dx = \sum_{k=1}^n a_k f_k(x)dx = \sum_{k=1}^n a_k \int f_k(x)dx$.

D) $\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$. E) $\int f(x)dx = \int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$.

3. $\int \frac{2x^2 - 3x + 5}{x^2} dx$ integralni yoyish usulida hisoblang.

A) $2 - \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} + C$. B) $2x - 3 \ln|x| + \frac{5}{x^2} + C$. C) $2x - \frac{3}{x} - \frac{5}{3x^3} + C$.

D) $2x - 3 \ln|x| - \frac{5}{x} + C$. E) $2x + \frac{3}{x^2} - \frac{5}{x} + C$.

4. Quyidagi integrallardan qaysi biriga differensial ostiga kiritish usulini qo'llab bo'lmaydi?

A) $\int f(x)f'(x)dx$. B) $\int \frac{f'(x)dx}{f(x)}$. C) $\int [f(x) \pm f'(x)]dx$. D) $\int \sqrt{f(x)}f'(x)dx$.

E) barcha integrallarga differensial ostiga kiritish usulini qo'llab bo'ladi.

5. Quyidagi integrallardan qaysi biri differensial ostiga kiritish usulida xato hisoblangan?

A) $\int f(x)f'(x)dx = \frac{1}{2} f^2(x) + C$. B) $\int \cos[f(x)]f'(x)dx = \sin[f(x)] + C$.

C) $\int \sin[f(x)]f'(x)dx = \cos[f(x)] + C$. D) $\int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C$.

E) keltirilgan barcha integrallar to'g'ri hisoblangan.

6. Qaysi tenglik aniqmas integralni o'zgaruvchilarni almashtirish usulida hisoblashni ifodalaydi?

A) $\int f(x)dx = \int u dv = uv - \int v du$. B) $\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$.

C) $\int f(x)dx = \sum_{k=1}^n a_k f_k(x)dx = \sum_{k=1}^n a_k \int f_k(x)dx$.

D) $\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$. E) $\int f(x)dx = \int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$.

7. $\int f(x)dx$ aniqmas integralda $x=\varphi(t)$ almashtirma bajarilganda u qanday ko'rinishga keladi?

A) $\int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$. B) $\int f[\varphi'(t)]\varphi'(t)dt$. C) $\int f[\varphi(t)]dt$.

D) $\int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$. E) $\int f[\varphi'(t)]\varphi(t)dt$.

8. $\int \frac{x^4 dx}{\sqrt{x^{10} - 1}}$ integral qaysi almashtirma orqali jadval integraliga keltiriladi ?

A) $t=x^2$. B) $t=x^3$. C) $t=x^4$. D) $t=x^5$. E) $t=x^6$.

9. $\int \frac{\sin x dx}{\sqrt{\cos x}}$ integral qaysi almashtirma orqali jadval integraliga keltiriladi ?

A) $t=\sin x$. B) $t=\cos x$. C) $t=\sqrt{\cos x}$. D) $t=\operatorname{tg} x$. E) $t=\operatorname{ctg} x$.

10. $\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{\sin x}}$ integral qaysi almashtirma orqali jadval integraliga keltiriladi ?

A) $t=\sin x$. B) $t=\cos x$. C) $t=\sqrt{\sin x}$. D) $t=\operatorname{tg} x$. E) $t=\operatorname{ctg} x$.

11. Qaysi tenglik bo'laklab integrallash usulini ifodalaydi ?

A) $\int f(x)dx = \int udv = uv - \int vdu$. B) $\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$.

C) $\int f(x)dx = \int \sum_{k=1}^n a_k f_k(x)dx = \sum_{k=1}^n a_k \int f_k(x)dx$.

D) $\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$. E) $\int f(x)dx = \int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$.

12. Aniqmas integralni bo'laklab integrallash formulasini ko'rsating.

A) $\int u dv = \int v du$. B) $\int u dv = u - \int v du$. C) $\int u dv = uv - \int v du$.

D) $\int u dv = uv + \int v du$. E) $\int u dv = u + \int v du$.

13. $\int x^2 \ln x dx$ integralni hisoblash uchun integral ostidagi ifodani qanday bo'laklash maqsadga muvofiq bo'ladi?

A) $u=x$, $dv=x \ln x dx$. B) $u=x^2$, $dv=\ln x dx$. C) $u=\ln x$, $dv=x^2 dx$.

D) $u=x \ln x$, $dv=x dx$. E) $u=x^2 \ln x$, $dv=dx$.

14. $\int x e^x dx$ integralni hisoblash uchun integral ostidagi ifodani qanday bo'laklash kerak ?

A) $u=x$, $dv=e^x dx$. B) $u=e^x$, $dv=x dx$. C) $u=x e^x$, $dv=dx$.

D) $u=1$, $dv=x e^x dx$. E) $u=\sqrt{x}$, $dv=\sqrt{x} e^x dx$.

15. Ushbu integrallardan qaysi birini bo'laklab integrallash usulida hisoblab bo'lmaydi ?

A) $\int x^n a^x dx$. B) $\int x^n \ln x dx$. C) $\int x^n \sin x dx$. D) $\int x^n \cos x dx$.

E) keltirilgan barcha integrallarni bo'laklab integrallash mumkin.

16. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + bx + c}}$ ($b, c \neq 0$) kvadrat uchhadli integral qaysi almashtirma orqali jadval integraliga keltiriladi?

A) $t=x+c/2$. B) $t=x+b/2$. C) $t=x-c/2$. D) $t=x-b/2$. E) $t=x^2+bx+c$.

17. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4x - 5}}$ integralni hisoblang.

A) $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+5} \right| + C$. B) $\ln \left| x+2+\sqrt{x^2+4x-5} \right| + C$. C) $\arcsin \frac{x+2}{3} + C$.

D) $\arccos \frac{x+2}{3} + C$. E) $2\sqrt{x^2+4x-5} + C$.

18. $\int \frac{dx}{x^2 + bx + c}$ ($b, c \neq 0$) kvadrat uchhadli integral qaysi almashtirma orqali jadval integraliga keltiriladi?

A) $t=x+c/2$. B) $t=x+b/2$. C) $t=x-c/2$. D) $t=x-b/2$. E) $t=x^2+bx+c$.

19. $\int \frac{dx}{x^2 + 4x - 5}$ integralni hisoblang.

A) $\frac{1}{6} \ln \left| \frac{x-1}{x+5} \right| + C$. B) $\frac{1}{6} \ln \left| \frac{x+5}{x-1} \right| + C$. C) $\frac{1}{6} \ln \left| \frac{x+5}{x+1} \right| + C$.

D) $\frac{1}{6} \ln \left| \frac{x-5}{x-1} \right| + C$. E) $\ln |x^2 + 4x - 5| + C$.

20. Quyidagi integrallardan qaysi biri elementar funksiyalar orqali ifodalanmaydi?

A) $\int \frac{\ln x}{x} dx$. B) $\int \frac{\sin \ln x}{x} dx$. C) $\int \frac{\cos \ln x}{x} dx$. D) $\int \frac{\sin x}{x} dx$;

E) keltirilgan barcha integrallar elementar funksiyalar orqali ifodalanadi .

5. Ratsional funksiyalar va ularni integrallash

1. Quyidagi yig‘indilardan qaysi biri ko‘phadni ifodalaydi ?

A) $\sum_{k=0}^n a_k \sin kx$. B) $\sum_{k=0}^n a_k \sin^k x$. C) $\sum_{k=0}^n a_k x^k$. D) $\sum_{k=0}^n a_k x^{-k}$. E) $\sum_{k=0}^n a_k x_k$.

2. $P(x)=(x^2+2x-10)^2(3x+5)$ ko‘phadning darajasini aniqlang:

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

3. Agar $P_n(x)$ va $Q_m(x)$ ko‘phadlar bo‘lsa, unda quyidagi funksiyalardan qaysi biri ratsional funksiya deyiladi ?

A) $P_n(x)+Q_m(x)$. B) $P_n(x)-Q_m(x)$. C) $P_n(x)/Q_m(x)$.
D) $P_n(x)\cdot Q_m(x)$. E) $P_n[Q_m(x)]$.

4. Qaysi shartda $R(x)=P_n(x)/Q_m(x)$ to‘g‘ri ratsional funksiya deyiladi ?

- A) $m \geq n$. B) $m \leq n$. C) $m > n$; D) $m < n$. E) $m \neq n$.

5. Qaysi holda $R(x)=P_n(x)/Q_m(x)$ noto‘g‘ri ratsional funksiya bo‘lmaydi?

- A) $m \geq n$. B) $m \leq n$. C) $m = n$. D) $m > n$. E) $m = n - 1$.

6. Quyidagilardan qaysi biri to‘g‘ri ratsional funksiya bo‘ladi ?

A) $\frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$. B) $\frac{(x + 1)^3}{x^2 + x + 1}$. C) $\frac{x^2 + x + 1}{x^3 + 1}$.

D) $\frac{x^2 + x + 1}{(x + 1)^2}$. E) $\frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1}$.

7. I tur eng sodda ratsional funksiyani ko‘rsating.

A) $\frac{Ax + B}{x - a}$. B) $\frac{Ax + B}{(x - a)^k}$. C) $\frac{A}{(x - a)^k}, k \geq 2$. D) $\frac{A}{x - a}$. E) $\frac{x + b}{x - a}$.

8. II tur eng sodda ratsional funksiyani ko‘rsating.

A) $\frac{Ax + B}{x^2 + px + q}$. B) $\frac{Ax + B}{(x - a)^k}$. C) $\frac{A}{x - a}$.

D) $\frac{A}{x^2 + px + q}$. E) $\frac{A}{(x - a)^k}, k \geq 2$.

9. III tur eng sodda ratsional funksiyani ko‘rsating.

A) $\frac{Ax + B}{x^2 + px + q}$. B) $\frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^k}, k \geq 2$. C) $\frac{Ax + B}{(x - a)^k}, k \geq 3$.

D) $\frac{Ax^2 + Bx + C}{x^2 + px + q}$. E) $\frac{Ax^2 + Bx + C}{(x^2 + px + q)^k}$.

10. IV tur eng sodda ratsional funksiyani ko‘rsating.

A) $\frac{Ax + B}{x^2 + px + q}$. B) $\frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^k}, k \geq 2$. C) $\frac{Ax + B}{(x - a)^k}, k \geq 3$.

D) $\frac{Ax^2 + Bx + C}{x^2 + px + q}$. E) $\frac{Ax^2 + Bx + C}{(x^2 + px + q)^k}$.

11. I tur eng sodda ratsional funksiya integrali qaysi elementar funksiyalar orqali ifodalanadi ?

A) faqat logarifmik funksiya. B) logarifmik va arktangens funksiyalar.

C) faqat ratsional funksiya. D) ratsional va arktangens funksiyalar.

E) faqat arktangens funksiyalar.

12. II tur eng sodda ratsional funksiya integrali qaysi elementar funksiyalar orqali ifodalanadi ?

A) faqat logarifmik funksiya. B) logarifmik va arktangens funksiyalar.

C) faqat ratsional funksiya. D) ratsional va arktangens funksiyalar.

E) logarifmik va ratsional funksiyalar.

13. III tur eng sodda ratsional funksiya integrali qaysi elementar funksiyalar orqali ifodalanadi ?

A) faqat logarifmik funksiya. B) logarifmik va arktangens funksiyalar.

C) faqat ratsional funksiya. D) ratsional va arktangens funksiyalar.

E) logarifmik va ratsional funksiyalar.

14. IV tur eng sodda ratsional funksiya integrali qaysi elementar funksiyalar orqali ifodalanadi ?

A) faqat logarifmik funksiya. B) logarifmik va arktangens funksiyalar.

C) faqat ratsional funksiya. D) ratsional va arktangens funksiyalar.

E) logarifmik va ratsional funksiyalar.

15. Agar $R(x)=Q_m(x)/P_n(x)$ to‘g‘ri ratsional funksiya maxraji $P_n(x)$ faqat oddiy haqiqiy ildizlarga ega bo‘lsa, uning yoyilmasi qaysi turdag'i eng sodda funksiyalardan iborat bo‘ladi ?

A) faqat I va II turdag'i. B) faqat I turdag'i.

C) faqat II turdag'i. D) I, II, III turdag'i. E) barcha turdag'i.

16. $R(x)=\frac{3x^2+5x-1}{(x-5)(x-3)(x+1)}$ ratsional funksiyaning yoyilmasi qanday ko‘rinishda bo‘ladi ?

A) $\frac{A_1x+B_1}{x-5} + \frac{A_2x+B_2}{x-3} + \frac{A_3x+B_3}{x+1}$. B) $\frac{A_1}{x-5} + \frac{A_2}{x-3} + \frac{A_3}{x+1}$.

C) $\frac{A_1}{(x-5)(x-3)} + \frac{A_2}{(x-5)(x+1)} + \frac{A_3}{(x-3)(x+1)}$.

D) $\frac{A_1x+B_1}{(x-5)(x-3)} + \frac{A_2x+B_2}{(x-5)(x+1)} + \frac{A_3x+B_3}{(x-3)(x+1)}$.

E) to‘g‘ri javob keltirilmagan.

17. $\int \frac{3x+5}{x^2+2x-3} dx$ integralni hisoblang.

A) $\frac{2}{x-1} + \frac{1}{x+3} + C$. B) $\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x+3} + C$. C) $2 \ln \left| \frac{x+3}{x-1} \right| + C$.

D) $2 \ln|x-1| + \ln|x+3| + C$. E) $\ln|x-1| - 2 \ln|x+3| + C$.

18. Agar $R(x)=Q_m(x)/P_n(x)$ to‘g‘ri ratsional funksiya maxraji $P_n(x)$ faqat karrali haqiqiy ildizlarga ega bo‘lsa, uning yoyilmasi qaysi turdag'i eng sodda funksiyalardan iborat bo‘ladi ?

- A) faqat I va II turdag'i . B) faqat I turdag'i.
C) faqat II turdag'i. D) I, II, III turdag'i. E) barcha turdag'i.

19. Agar $R(x)=Q_m(x)/P_n(x)$ to‘g‘ri ratsional funksiya maxraji $P_n(x)$ faqat oddiy kompleks ildizlarga ega bo‘lsa, uning yoyilmasi qaysi turdag'i eng sodda funksiyalardan iborat bo‘ladi ?

- A) faqat I turdag'i. B) faqat II turdag'i. C) faqat III turdag'i.
D) faqat IV turdag'i. E) faqat III va IV turdag'i.

20. $R(x)=\frac{3x^3+2x^2+5x-1}{(x^2+x+1)(x^2+2x+5)}$ ratsional funksiyaning yoyilmasi qanday ko‘rinishda bo‘ladi ?

- A) $\frac{A_1}{x^2+x+1} + \frac{A_2}{x^2+2x+5}$. B) $\frac{A_1x}{x^2+x+1} + \frac{A_2x}{x^2+2x+5}$.
C) $\frac{A_1x+B_1}{x^2+x+1} + \frac{A_2x+B_2}{x^2+2x+5}$. D) $\frac{A_1x^2+B_1x+C_1}{x^2+x+1} + \frac{A_2x^2+B_2x+C_2}{x^2+2x+5}$.
E) to‘g‘ri javob keltirilmagan.

6. Ayrim irratsional ifodalari integrallarni hisoblash

1. Bihomial integralning umumiy ko‘rinishi qayerda to‘g‘ri ifodalangan ?

- A) $\int x(a+bx)^p dx$. B) $\int x^r(a+bx)^p dx$. C) $\int x^r(a+bx^s)^p dx$.
D) $\int x^r(a+bx^s)dx$. E) $\int x^r(ax'+bx^s)^p dx$.

2. Qaysi shartda $\int x^r(a+bx^s)^p dx$ binomial integral albatta elementar funksiyalar orqali ifodalananadi ?

- A) p -butun son. B) r -butun son. C) s -butun son.
D) $r+s$ -butun son. E) keltirilgan barcha hollarda.

3. Qaysi shartda $\int x^r(a+bx^s)^p dx$ binomial integral elementar funksiyalarda integrallanuvchi bo‘lmashligi mumkin ?

- A) $\frac{r+1}{s} + p$ -butun son. B) $\frac{r+1}{s}$ -butun son. C) s -butun son.
D) p -butun son. E) keltirilgan barcha hollarda integrallanuvchi bo‘ladi.

4. $\int x^r(a+bx^s)^p dx$ binomial integralda $(r+1)/s$ - butun son, $p=k/m$ bo'lsa, qaysi almashtirma orqali undan ratsional funksiyali integralga o'tiladi?

- A) $a+bx^s=t$. B) $a+bx^s=t^k$. C) $a+bx^s=t^m$.
 D) $a+bx=t^m$. E) $ax^{-s}+b=t^m$.

5. $\int x^r(a+bx^s)^p dx$ binomial integralda p - butun son, $r=k/m$ va $s=q/m$ bo'lsa, qaysi almashtirma orqali undan ratsional funksiyali integralga o'tiladi?

- A) $x=t^p$. B) $x=t^m$. C) $x=t^k$. D) $x=t^q$. E) $x=t^{kq}$.

6. $\int x^r(a+bx^s)^p dx$ binomial integralda $p+(r+1)/s$ - butun son, $p=k/m$ bo'lsa, qaysi almashtirma orqali undan ratsional funksiyali integralga o'tiladi?

- A) $a+bx^s=t$. B) $a+bx^s=t^k$. C) $a+bx^s=t^m$.
 D) $a+bx=t^m$. E) $ax^{-s}+b=t^m$.

7. $\int x^{2/3}(a+bx^{3/4})^2 dx$ binomial integraldan ratsional funksiyali integralga qaysi almashtirma orqali o'tiladi?

- A) $a+bx^{3/4}=t$. B) $a+bx^{3/4}=t^3$. C) $x=t^{12}$. D) $x=t^3$. E) $x=t^4$.

8. $\int x^{2/3}(a+bx^{5/6})^{1/2} dx$ binomial integraldan ratsional funksiyali integralga qaysi almashtirma orqali o'tiladi?

- A) $a+bx^{5/6}=t$. B) $a+bx^{5/6}=t^2$. C) $ax^{-5/6}+b=t$.
 D) $ax^{-5/6}+b=t^2$. E) $x=t^6$.

9. $\int x^{2/3}(a+bx^{3/4})^{7/9} dx$ binomial integraldan ratsional funksiyali integralga qaysi almashtirma orqali o'tiladi?

- A) $a+bx^{3/4}=t$. B) $a+bx^{3/4}=t^9$. C) $ax^{-3/4}+b=t$.
 D) $ax^{-3/4}+b=t^9$. E) $x=t^{12}$.

10. $\int R(x, x^{m/n}, \dots, x^{r/s}) dx$ irratsional funksiyali integral qanday almashtirma orqali ratsional funksiyali integralga keltiriladi?

- A) $x=t^n$. B) $x=t^s$. C) $x=t^k, k=EKUK(n, \dots, s)$.
 D) $x=t^k, k=EKUB(n, \dots, s)$. E) $x=t^{ns}$.

11. $\int R(x, x^{2/3}, x^{3/4}, x^{1/6}) dx$ integral qanday almashtirma orqali ratsional funksiyali integralga keltiriladi ?

A) $x=t^3$. B) $x=t^4$. C) $x=t^6$. D) $x=t^{12}$. E) $x=t^{13}$.

12. $\int \frac{1+\sqrt[4]{x}}{1+\sqrt[3]{x}} dx$ integralni hisoblash qaysi ko‘rinishdagi ratsional funksiyali integralga keltiriladi?

A) $\int \frac{1+t^3}{1+t^4} t^{12} dt$. B) $\int \frac{1+t^4}{1+t^3} t^{12} dt$. C) $\int \frac{1+t^3}{1+t^4} t^{11} dt$. D) $\int \frac{1+t^4}{1+t^3} t^{11} dt$.

E) to‘g‘ri javob keltirilmagan.

13. $\int R\left[x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m}{n}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{r}{s}}\right] dx$ irratsional funksiyali integral

qanday almashtirma orqali ratsional funksiyali integralga keltiriladi ?

A) $\frac{ax+b}{cx+d}=t^n$. B) $\frac{ax+b}{cx+d}=t^s$. C) $\frac{ax+b}{cx+d}=t^{ns}$.

D) $\frac{ax+b}{cx+d}=t^k$, $k=EKUK(n, \dots, s)$. E) $\frac{ax+b}{cx+d}=t^k$, $k=EKUB(n, \dots, s)$.

14. $\int R\left(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}, \sqrt[3]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$ irratsional funksiyali integral qanday

almashtirma orqali ratsional funksiyali integralga keltiriladi ?

A) $\frac{ax+b}{cx+d}=t^2$. B) $\frac{ax+b}{cx+d}=t^3$. C) $\frac{ax+b}{cx+d}=t^6$. D) $\frac{ax+b}{cx+d}=t^5$. E) $x=t^6$.

15. $\int \frac{1+\sqrt{6x+1}}{1+\sqrt[3]{6x+1}} dx$ integralni hisoblash qaysi ratsional funksiyali

integralga keltiriladi?

A) $\int \frac{1+t^2}{1+t^3} t^5 dt$. B) $\int \frac{1+t^3}{1+t^2} t^5 dt$. C) $\int \frac{1+t^2}{1+t^3} dt$. D) $\int \frac{1+t^3}{1+t^2} dt$.

E) to‘g‘ri javob keltirilmagan.

16. $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$, $a > 0$, irratsional funksiyali integralni ratsional funksiyali integralga keltiruvchi Eylerning I almashtirmsasini ko‘rsating.

A) $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t$. B) $\sqrt{ax^2 + bx + c} = x\sqrt{a} - t$.

C) $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + a$. D) $\sqrt{ax^2 + bx + c} = (x - a)t$.

E) to‘g‘ri javob keltirilmagan.

17. $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$, $c > 0$, irratsional funksiyali integralni ratsional funksiyali integralga keltiruvchi Eylerning II almashtirmasini ko‘rsating.

A) $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t + c$. B) $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{c}x + t$.

C) $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}$. D) $\sqrt{ax^2 + bx + c} = (x - c)t$.

E) $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{ax^2 + bc} + ct$.

18. $ax^2 + bx + c$ kvadrat uchxad α va β haqiqiy ildizlarga ega bo‘lsa, $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$ irratsional funksiyali integralni ratsional funksiyali integralga keltiruvchi Eylerning III almashtirmasini ko‘rsating.

A) $\sqrt{ax^2 + \alpha x + c} = xt - \alpha$. B) $\sqrt{ax^2 + \alpha x + c} = xt - \beta$.

C) $\sqrt{ax^2 + \alpha x + c} = xt - \alpha\beta$. D) $\sqrt{ax^2 + \alpha x + c} = (x - \alpha)t$.

E) $\sqrt{ax^2 + \alpha x + c} = (x - \alpha - \beta)t$.

19. $\int R(x, \sqrt{x^2 + 3x - 5}) dx$ irratsional funksiyali integralni ratsional funksiyali integralga keltiruvchi Eylerning I almashtirmasini ko‘rsating.

A) $\sqrt{x^2 + 3x - 5} = t$. B) $\sqrt{x^2 + 3x - 5} = x - t$. C) $\sqrt{x^2 + 3x - 5} = xt + 1$.

D) $\sqrt{x^2 + 3x - 5} = (x - 1)t$. E) to‘g‘ri javob keltirilmagan.

20. $\int R(x, \sqrt{9 - 2x^2 + 3x}) dx$ irratsional funksiyali integralni ratsional funksiyali integralga keltiruvchi Eylerning I almashtirmasini ko‘rsating.

A) $\sqrt{9 - 2x^2 + 3x} = t$. B) $\sqrt{9 - 2x^2 + 3x} = x - t$.

C) $\sqrt{9 - 2x^2 + 3x} = xt + 3$. D) $\sqrt{9 - 2x^2 + 3x} = (x - 3)t$.

E) to‘g‘ri javob keltirilmagan.

7. Ayrim trigonometrik ifodali integrallarni hisoblash

1. Trigonometrik funksiyali ifodalarni ratsional funksiyaga ketiruvchi universal almashtirmani ko'rsating.

- A) $\sin x = t$. B) $\cos x = t$. C) $\operatorname{tg} x = t$. D) $\operatorname{ctg} x = t$. E) $\operatorname{tg}(x/2) = t$.

2. $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ universal almashtirma qatnashgan quyidagi tengliklardan qaysi biri noto'g'ri ?

- A) $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$. B) $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$. C) $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$. D) $x = 2\arctg t$.
E) keltirilgan barcha tengliklar to'g'ri.

3. $\int R(\cos x) \sin x dx$ ko'rinishdagi integrallarni hisoblash uchun qaysi almashtirmadan foydalilanadi?

- A) $\cos x = t$. B) $\sin x = t$. C) $\operatorname{tg} x = t$. D) $\operatorname{ctg} x = t$. E) $\operatorname{tg} 2x = t$.

4. Trigonometrik ifodali $\int (1 - \cos^4 x) \sin x dx$ integralni hisoblang.

- A) $\cos x - \sin^4 x + C$. B) $\sin x - \frac{\cos^5 x}{5} + C$. C) $-\cos x + \frac{\cos^5 x}{5} + C$.
D) $\sin x - \frac{\sin^5 x}{5} + C$. E) $-\cos x + \frac{\sin^5 x}{5} + C$.

5. $\int R(\sin x) \cos x dx$ ko'rinishdagi integral qanday almashtirma yordamida hisoblanishi mumkin ?

- A) $\cos x = t$. B) $\sin x = t$. C) $\operatorname{tg} x = t$. D) $\operatorname{ctg} x = t$. E) $\operatorname{tg} 2x = t$.

6. $\int \frac{\cos x}{1 - \sin x} dx$ integral javobi qayerda to'g'ri ko'rsatilgan ?

- A) $\frac{\sin x}{1 - \cos x} + C$. B) $\frac{\sin x}{1 - \sin x} + C$. C) $\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} + C$.
D) $-\ln|1 - \sin x| + C$. E) $\ln|1 - \cos x| + C$.

7. Quyidagi almashtirmalarning qaysi biridan $\int R(\operatorname{tg} x) dx$ ko'rinishdagi integralni ratsional funksiyali integralga keltirishda foydalanim bo'lmaydi?

A) $t=\operatorname{tg}x$. B) $t=\sin x$. C) $t=\operatorname{ctgx}$. D) $t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}$.

E) ko'rsatilgan barcha almashtirmalardan foydalanib bo'ladi .

8. $\int \sin^{2m+1} x \cos^n x dx$ integralni hisoblash uchun qaysi almashtirmadan foydalanish qulay ?

A) $\sin x=t$. B) $\cos x=t$. C) $\operatorname{tg}x=t$. D) $\operatorname{ctgx}=t$. E) $\sin^2 x=t$.

9. $\int \sin^3 x \cos^5 x dx$ integralni hisoblang.

A) $\frac{\cos^8 x}{8} - \frac{\cos^6 x}{6} + C$. B) $\frac{\sin^8 x}{8} - \frac{\cos^6 x}{6} + C$. C) $\frac{\cos^8 x}{8} - \frac{\sin^6 x}{6} + C$.
 D) $\frac{\sin^8 x}{8} - \frac{\sin^6 x}{6} + C$. E) $\frac{\sin^8 x}{8} + \frac{\sin^6 x}{6} + C$.

10. $\int \sin^m x \cos^{2n+1} x dx$ integralni hisoblash uchun qaysi almashtirmadan foydalanish qulay ?

A) $\sin x=t$. B) $\cos x=t$. C) $\operatorname{tg}x=t$. D) $\operatorname{ctgx}=t$. E) $\cos^2 x=t$.

11. $\int \sin^5 x \cos^3 x dx$ integralni hisoblang.

A) $\frac{\cos^6 x}{6} - \frac{\cos^8 x}{8} + C$. B) $\frac{\sin^6 x}{6} - \frac{\cos^8 x}{8} + C$. C) $\frac{\cos^6 x}{6} - \frac{\sin^8 x}{8} + C$.
 D) $\frac{\sin^6 x}{6} - \frac{\sin^8 x}{8} + C$. E) $\frac{\cos^6 x}{6} + \frac{\cos^8 x}{8} + C$.

12. $\int \sin^{-2m} x \cos^{2n} x dx$ integralni hisoblash uchun qaysi almashtirmadan foydalanish qulay ?

A) $\sin x=t$. B) $\cos x=t$. C) $\operatorname{tg}x=t$. D) $\cos^2 x=t$. E) $\sin^2 x=t$.

13. $\int \frac{\cos^2 x dx}{\sin^4 x}$ integralni hisoblang.

A) $-\frac{\sin^3 x}{3} + C$. B) $-\frac{\cos^3 x}{3} + C$. C) $-\frac{\operatorname{ctg}^3 x}{3} + C$.
 D) $-\frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} + C$. E) $-\frac{5 \cos^3 x}{3 \sin^5 x} + C$.

14. $\int \sin^{2m} x \cos^{-2n} x dx$ integralni hisoblash uchun qaysi almashtirmadan foydalanish qulay ?

- A) $\sin x = t$. B) $\cos x = t$. C) $\operatorname{tg} x = t$. D) $\cos^2 x = t$. E) $\sin^2 x = t$.

15. $\int \frac{\sin^2 x dx}{\cos^4 x}$ integralni hisoblang.

- A) $\frac{\sin^3 x}{3} + C$. B) $\frac{\cos^3 x}{3} + C$. C) $\frac{\operatorname{ctg}^3 x}{3} + C$.
D) $\frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} + C$. E) $\frac{5 \sin^3 x}{3 \cos^5 x} + C$.

16. $\int \sin^{-2m} x \cos^{-2n} x dx$ integralni hisoblash uchun qaysi almashtirmadan foydalanish qulay ?

- A) $\sin x = t$. B) $\cos x = t$. C) $\operatorname{tg} x = t$. D) $\cos^2 x = t$. E) $\sin^2 x = t$.

17. $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$ integralni hisoblang.

- A) $\frac{1}{\sin x \cos x} + C$. B) $-\frac{1}{\sin x \cos x} + C$. C) $\frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\cos x} + C$.
D) $\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x + C$. E) $\operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + C$.

18. $\int \sin mx \cos nx dx$, $m \neq n$, integral qaysi usulda hisoblanadi ?

- A) o'zgaruvchilarni almashtirish. B) bo'laklab integrallash.
C) yoyish. D) universal almashtirmadan foydalanish.
E) aniq bir usulni ko'rsatib bo'lmaydi.

19. $-10 \int \sin 3x \cos 2x dx$ integralni hisoblang.

- A) $\cos 5x + 5 \cos x + C$. B) $\sin 5x + 5 \cos x + C$. C) $\cos 5x + 5 \sin x + C$.
D) $\sin 5x + 5 \sin x + C$. E) $-\cos 3x \cdot \sin 2x + C$.

20. $\int \cos mx \cos nx dx$, $m \neq n$, integral qaysi usulda hisoblanadi ?

- A) o'zgaruvchilarni almashtirish. B) bo'laklab integrallash.
C) yoyish. D) universal almashtirmadan foydalanish.
E) aniq bir usulni ko'rsatib bo'lmaydi.

8. Ikki karrali integral va uning xossalari

1. Ikki o‘zgaruvchili $z=f(x,y)$ funksiyadan yopiq D soha bo‘yicha integral yig‘indini tuzishda quyidagilardan qaysi biri bajarilmaydi ?

A) D sohada $z=f(x,y)$ funksiyaning eng katta va eng kichik qiymati aniqlanadi .

B) D soha qandaydir chiziqlar bilan ΔD_i ($i=1,2, \dots, n$) kichik sohachalarga ajratiladi .

C) har bir ΔD_i ($i=1,2, \dots, n$) sohachadan ixtiyoriy bir $M(x_i, y_i)$ nuqta tanlanadi va unda funksiya qiymati $f(x_i, y_i)$ hisoblanadi .

D) funksiyaning hisoblangan $f(x_i, y_i)$, $i=1,2, \dots, n$, qiymatlari ΔD_i sohacha yuzasi ΔS_i ga ko‘paytirilib, $f(x_i, y_i)\Delta S_i$ ko‘paytmalar yig‘indisi topiladi .

E) ko‘rsatilgan barcha amallar bajariladi .

2. $V_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta S_i$ integral yig‘indi orqali $I = \iint_D f(x, y) dx dy$ ikki karrali integral qanday aniqlanadi ?

A) $I = \max V_n$. B) $I = \min V_n$. C) $I = \lim_{n \rightarrow \infty} V_n$.

D) $I = \sum_{k=1}^n V_k$. E) $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n V_k$.

3. **Teoremaning shartini ko‘rsating:** Agar D yopiq sohada $z=f(x,y)$ funksiya ... bo‘lsa , unda $I = \iint_D f(x, y) dx dy$ ikki karrali integral mavjud bo‘ladi .

A) monoton . B) uzlusiz . C) chegaralangan . D) davriy .

E) to‘g‘ri javob keltirilmagan .

4. Ikki karrali integralning geometrik ma’nosini qayerda to‘g‘ri ko‘rsatilgan ?

A) tekis shakl yuzi . B) egri chiziq yoyi uzunligi . C) silindrik jism hajmi . D) aylanma jism hajmi . E) aylanma jism sirti .

5. Agar integrallash sohasi D tomonlari $a=4$ va $b=5$ bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak bo‘lsa, ikki karrali $I = \iint_D dx dy$ integral qiymati nimaga teng ?

- A) $I=8$. B) $I=9$. C) $I=10$. D) $I=18$. E) $I=20$.

6. Agar integrallash sohasi D radiusi $R=4$ bo‘lgan doira bo‘lsa, ikki karrali $I = \iint_D 2dx dy$ integral qiymati nimaga teng ?

- A) $I=8\pi^2$. B) $I=16\pi^2$. C) $I=32\pi^2$. D) $I=20\pi$. E) $I=16\pi$.

7. Ikki karrali integralning mexanik ma’nosi qayerda to‘g‘ri ko‘rsatilgan ?

- A) notekis harakatda bosib o‘tilgan masofa .
- B) bir jinsli bo‘lмаган sterjen massasi .
- C) bir jinsli bo‘lмаган plastinka massasi .
- D) o‘zgaruvchi kuch bajargan ish .
- E) bir jinsli bo‘lмаган jism massasi .

8. Ikki karrali integral xossasi qayerda xato ko‘rsatilgan ?

- A) $\iint_D f_1(x, y) \cdot f_2(x, y) dx dy = \iint_D f_1(x, y) dx dy \cdot \iint_D f_2(x, y) dx dy$.
- B) $\iint_D (f_1(x, y) + f_2(x, y)) dx dy = \iint_D f_1(x, y) dx dy + \iint_D f_2(x, y) dx dy$.
- C) $\iint_D (f_1(x, y) - f_2(x, y)) dx dy = \iint_D f_1(x, y) dx dy - \iint_D f_2(x, y) dx dy$.
- D) $\iint_D Cf(x, y) dx dy = C \iint_D f(x, y) dx dy$, $C - const$.
- E) barcha xossalat to‘g‘ri ifodalangan .

9. Agar $\iint_D f(x, y) dx dy = 5$ bo‘lsa, $\iint_D (-3)f(x, y) dx dy$ integral qiymatini toping.

- A) -3 . B) 15 . C) -15 . D) 0 .
- E) bu integral qiymatini aniq ko‘rsatib bo‘lmaydi .

10. Agar $\iint_D f(x, y) dx dy = 5$, $\iint_D g(x, y) dx dy = -2$ bo‘lsa, $\iint_D f(x, y)g(x, y) dx dy$ integral qiymati nimaga teng ?

- A) -10 . B) 10 . C) -2 . D) 5 .
- E) bu integral qiymatini aniq ko‘rsatib bo‘lmaydi .

11. $\iint_D f(x,y)dx dy = 5$, $\iint_D g(x,y)dx dy = -2$ bo'lsa,
 $\iint_D [f(x,y) + g(x,y)]dx dy$ integral qiymati nimaga teng ?

A) -7 . B) 7 . C) -3 . D) 3

E) bu integral qiymatini aniq ko'rsatib bo'lmaydi .

12. $\iint_D f(x,y)dx dy = 5$, $\iint_D [f(x,y) + g(x,y)]dx dy = 4$ bo'lsa,
 $\iint_D g(x,y)dx dy$ integral qiymati nimaga teng ?

A) -1 . B) 1 . C) -9 . D) 9 .

E) bu integral qiymatini aniq ko'rsatib bo'lmaydi .

13. $\iint_D [f(x,y) - g(x,y)]dx dy = 2$, $\iint_D [f(x,y) + g(x,y)]dx dy = 4$ bo'lsa,
 $\iint_D f(x,y)dx dy$ integral qiymati nimaga teng ?

A) 1 . B) 2 . C) 3 . D) 4 .

E) bu integral qiymatini aniq ko'rsatib bo'lmaydi .

14. $\iint_D [f(x,y) - g(x,y)]dx dy = 2$, $\iint_D [f(x,y) + g(x,y)]dx dy = 4$ bo'lsa,
 $\iint_D g(x,y)dx dy$ integral qiymati nimaga teng ?

A) 1 . B) 2 . C) 3 . D) 4 .

E) bu integral qiymatini aniq ko'rsatib bo'lmaydi .

15. $\iint_D [f(x,y) - g(x,y)]dx dy = 2$, $\iint_D [f(x,y) + g(x,y)]dx dy = 4$ bo'lsa,
 $\iint_D [2f(x,y) + 3g(x,y)]dx dy$ integral qiymati nimaga teng ?

A) 5 . B) 7 . C) 9 . D) 11 .

E) bu integral qiymatini aniq ko'rsatib bo'lmaydi .

16. Integrallash sohasi $D=\{(x,y):1\leq x\leq 3, 2\leq y\leq 5\}$ to'g'ri
 to'rtburchakdan iborat bo'lib, unda $z=f(x,y)$ funksiya uzliksiz va $2\leq f(x,y)\leq 4$ shart bajarilsin. Bu holda $\iint_D f(x,y)dx dy$ ikki karrali integral
 qiymati qaysi kesmada joylashgan?

A) [6 , 12] . B) [8 , 16] . C) [10 , 20] .

D) [12 , 24] . E) [14 , 28] .

17. Integrallash sohasi D radiusi $R=2$ bo‘lgan yopiq doiradan iborat bo‘lib, unda $z=f(x,y)$ funksiya uzlucksiz va $3 \leq f(x,y) \leq 4$ shart bajarilsin. Bu holda $\iint_D f(x,y) dx dy$ ikki karrali integral qiymati qaysi kesmada joylashgan?

- A) $[6\pi^2, 10\pi^2]$. B) $[8\pi^2, 12\pi^2]$. C) $[10\pi^2, 14\pi^2]$.
 D) $[12\pi^2, 16\pi^2]$. E) $[14\pi^2, 18\pi^2]$.

18. Qayerda ikki karrali integralning additivlik xossasi ifodalangan?

- A) $\iint_D [f(x,y) + g(x,y)] dx dy = \iint_D f(x,y) dx dy + \iint_D g(x,y) dx dy$.
 B) $\iint_D [f(x,y) \pm g(x,y)] dx dy = \iint_D f(x,y) dx dy \pm \iint_D g(x,y) dx dy$.
 C) $\iint_{D_1+D_2} f(x,y) dx dy = \iint_{D_1} f(x,y) dx dy + \iint_{D_2} f(x,y) dx dy$.
 D) $\iint_D f(x,y) dx dy = f(x_0, y_0) \cdot S(D)$.
 E) Bu yerda integralning additivlik xossasi keltirilmagan.

19. Agar D_1 va D_2 o‘zaro kesishmaydigan, radiuslari $R_1=2$ va $R_2=3$ bo‘lgan doiralardan iborat va $D=D_1+D_2$ bo‘lsa, ikki karrali $I = \iint_D f(x,y) dx dy$ integral qiymatini toping.

- A) $I=4\pi^2$. B) $I=9\pi^2$. C) $I=13\pi^2$. D) $I=16\pi^2$. E)
 $I=20\pi^2$.

20. Qayerda ikki karrali integralning o‘rta qiymati haqidagi teoremaning tasdig‘i ko‘rsatilgan?

- A) $\iint_D [f(x,y) + g(x,y)] dx dy = \iint_D f(x,y) dx dy + \iint_D g(x,y) dx dy$.
 B) $\iint_D [f(x,y) \pm g(x,y)] dx dy = \iint_D f(x,y) dx dy \pm \iint_D g(x,y) dx dy$.
 C) $\iint_{D_1+D_2} f(x,y) dx dy = \iint_{D_1} f(x,y) dx dy + \iint_{D_2} f(x,y) dx dy$.
 D) $\iint_D f(x,y) dx dy = f(x_0, y_0) \cdot S$.

E) Bu yerda o‘rta qiymat haqidagi teoremaning tasdig‘i keltirilmagan.

9. Ikki karrali integralni hisoblash. Ikki karrali integrallar

1. Tekislikdagi D soha OY koordinata o'qi bo'yicha to'g'ri soha bo'lishi uchun quyidagi shartlardan qaysi biri talab etilmaydi ?

A) D soha chap tomonidan $x=a$ va o'ng tomonidan $x=b$ ($a < b$) vertikal to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan .

B) D soha $[a,b]$ kesmada uzluksiz bo'lgan $y=\varphi_1(x)$ va $y=\varphi_2(x)$ $[\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)]$ funksiyalarning grafiklari bilan chegaralangan .

C) D sohaning ichki nuqtasidan o'tuvchi va OY o'qiga parallel har qanday to'g'ri chiziq soha chegarasini faqat ikkita huqtada kesib o'tadi .

D) D sohani ichki nuqtasidan o'tuvchi va OX koordinata o'qiga parallel bo'lgan har qanday L to'g'ri chiziq soha chegarasini faqat ikkita huqtada kesib o'tadi .

E) keltirilgan barcha shartlar talab etiladi .

2. Tekislikdagi D soha OX koordinata o'qi bo'yicha to'g'ri soha bo'lishi uchun quyidagi shartlardan qaysi biri talab etilmaydi ?

A) D soha quyidan $y=c$ va yuqoridna $y=d$ ($c < d$) gorizontal to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan .

B) D soha $[a,b]$ kesmada uzluksiz bo'lgan $x=\psi_1(y)$ va $x=\psi_2(y)$ $[\psi_1(y) \leq \psi_2(y)]$ funksiyalarning grafiklari bilan chegaralangan .

C) D sohaning ichki nuqtasidan o'tuvchi va OY o'qiga parallel har qanday to'g'ri chiziq soha chegarasini faqat ikkita huqtada kesib o'tadi .

D) D sohani ichki nuqtasidan o'tuvchi va OX koordinata o'qiga parallel bo'lgan har qanday L to'g'ri chiziq soha chegarasini faqat ikkita huqtada kesib o'tadi .

E) keltirilgan barcha shartlar talab etiladi .

3. Quyidagi sohalardan qaysi biri OY o'qi bo'yicha to'g'ri soha bo'lmaydi ?

A) aylana bilan chegaralangan soha . B) ellips bilan chegaralangan soha .

C) to'g'ri to'rtburchak bilan chegaralangan soha .

D) ikkita konsentrik aylana bilan chegaralangan soha .

E) keltirilgan barcha sohalar OY o'qi bo'yicha to'g'ri soha bo'ladi .

4. Quyidagi sohalardan qaysi biri OX o‘qi bo‘yicha to‘g‘ri soha bo‘lmaydi ?

- A) aylana bilan chegaralangan soha . B) ellips bilan chegaralangan soha .
- C) to‘g‘ri to‘rtburchak bilan chegaralangan soha .
- D) ikkita konsentrik aylana bilan chegaralangan soha .
- E) keltirilgan barcha sohalar OX o‘qi bo‘yicha to‘g‘ri soha bo‘ladi .

5. Quyidagidan qaysi biri ikki karrali integral bo‘lmaydi ?

- A) $I = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \int f(x, y) dy \right) dx$.
- B) $I = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} \int f(x, y) dx \right) dy$.
- C) $\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$.
- D) $\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$.

E) keltirilgan integrallarning hammasi ikki karrali integral bo‘ladi

6. $\int_0^1 \left(\int_0^x (x+y) dy \right) dx$ ikki karrali integral qiymatini toping.

- A) 0 .
- B) 0.5 .
- C) 1 .
- D) -1 .
- E) -0.5 .

7. $\int_0^1 \left(\int_0^y (x-y) dx \right) dy$ ikki karrali integral qiymatini toping.

- A) 0 .
- B) 1 .
- C) 1/6 .
- D) -1 .
- E) -1/6 .

8. $\int_0^1 \left(\int_1^2 (x+y) dy \right) dx$ ikki karrali integral qiymatini toping.

- A) 2 .
- B) 1.5 .
- C) 1 .
- D) 0.5 .
- E) 0 .

9. $\int_0^1 \left(\int_1^2 (x-y) dx \right) dy$ ikki karrali integral qiymatini toping.

- A) 2 .
- B) 1.5 .
- C) 1 .
- D) 0.5 .
- E) 0 .

10. OX koordinata o‘qi bo‘yicha to‘g‘ri D soha uchun $\iint_D f(x,y)dx dy$ ikki karrali integralni hisoblash formulasi qayerda to‘g‘ri ko‘rsatilgan ?

$$A) \iint_D f(x,y)dx dy = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)dx \right) dy . \quad B)$$

$$D) \iint_D f(x,y)dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)dy \right) dx .$$

$$C) \iint_D f(x,y)dx dy = \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} \left(\int_a^b f(x,y)dx \right) dy . \quad D)$$

$$D) \iint_D f(x,y)dx dy = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \left(\int_c^d f(x,y)dy \right) dx .$$

$$E) \iint_D f(x,y)dx dy = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)dx \right) dy .$$

11. OX koordinata o‘qi bo‘yicha to‘g‘ri D soha uchun $\iint_D f(x,y)dx dy$ ikki karrali integralni hisoblash formulasi qayerda to‘g‘ri ko‘rsatilgan ?

$$A) \iint_D f(x,y)dx dy = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)dx \right) dy .$$

$$B) \iint_D f(x,y)dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)dy \right) dx .$$

$$C) \iint_D f(x,y)dx dy = \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} \left(\int_a^b f(x,y)dx \right) dy .$$

$$D) \iint_D f(x,y)dx dy = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \left(\int_c^d f(x,y)dy \right) dx .$$

$$E) \iint_D f(x,y)dx dy = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)dx \right) dy .$$

12. $x=0$ va $x=1$ vertikal to‘g‘ri chiziqlar, $y=x^3$ va $y=x^2$ egri chiziqlar bilan chegaralangan D soha bo‘yicha

$$\iint_D xy dx dy$$
 ikki karrali integral qiymatini hisoblang .

- A) 1/8 . B) 1/18 . C) 1/28 . D) 1/38 . E) 1/48 .

13. $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 1$ to‘g‘ri to‘rtburchakdan iborat D soha bo‘yicha $\iint_D (x+y) dx dy$ ikki karrali integral qiymatini hisoblang.

- A) 1 . B) 2 . C) 3 . D) 4 . E) 5 .

14. $0 \leq x \leq \pi/2$, $0 \leq y \leq \pi/2$ kvadratdan iborat D soha bo‘yicha $\iint_D (\sin x + \cos y) dx dy$ ikki karrali integral qiymatini hisoblang.

- A) $\pi/4$. B) $\pi/2$. C) $3\pi/4$. D) π . E) $5\pi/4$.

15. $0 \leq x \leq \pi/2$, $0 \leq y \leq \pi/2$ kvadratdan iborat D soha bo‘yicha $\iint_D \sin x \cos y dx dy$ ikki karrali integral qiymatini hisoblang.

- A) π . B) 0 . C) 1 . D) $-\pi$. E) -1 .

16. $\varphi(u,v)$ va $\psi(u,v)$ funksiyalarning yakobiani $I(u,v)$ qanday aniqlanadi ?

- A) $I(u,v) = \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v} - \frac{\partial \psi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial v}$. B) $I(u,v) = \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial v} - \frac{\partial \varphi}{\partial v} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial u}$.
 C) $I(u,v) = \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial u} - \frac{\partial \varphi}{\partial v} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial v}$. D) $I(u,v) = \frac{\partial \varphi}{\partial v} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial v} - \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial u}$.
 E) $I(u,v) = \frac{\partial \psi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial v} - \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v}$.

17. Quyidagi deferminantlarning qaysi biri $\varphi(u,v)$ va $\psi(u,v)$ funksiyalarning $I(u,v)$ yakobianini ifodalamaydi ?

A) $\begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{vmatrix}$	B) $-\begin{vmatrix} \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial v} & \frac{\partial \varphi}{\partial u} \end{vmatrix}$	C) $\begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{vmatrix}$
D)	$\begin{vmatrix} \frac{\partial \psi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \varphi}{\partial u} \end{vmatrix}$	

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \psi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \varphi}{\partial u} \end{vmatrix}.$$

E) barcha deferminantlar $I(u,v)$ yakobianni ifodalaydi .

18. $\varphi(u,v)=u+v$ va $\psi(u,v)=u-v$ funksiyalarning $I(u,v)$ yakobianini toping.

- A) $I(u,v)=uv$. B) $I(u,v)=u^2v$. C) $I(u,v)=uv^2$. D) -2 . E) 1 .

19. $\varphi(u,v)=u^2-v^2$ va $\psi(u,v)=u^2+v^2$ funksiyalarning $I(u,v)$ yakobianini toping.

A) $I(u,v)=4uv$. B) $I(u,v)=4u^2v$. C) $I(u,v)=4uv^2$. D) -4 . E) 4 .

20. $x=\rho\cos\theta$, $y=\rho\sin\theta$ qutb koordinatalarining $I(\rho,\theta)$ yakobianini toping.

A) $I(\rho,\theta)=\rho\theta$. B) $I(\rho,\theta)=-\rho\theta$. C) $I(\rho,\theta)=-\theta$.
D) $I(\rho,\theta)=\rho$. E) $I(\rho,\theta)=\theta$.

10. Ikki karrali integralning amaliy tatbiqlari

1. $z=f(x,y)>0$ funksiya bilan aniqlangan σ sirtning XOY koordinata tekisligidagi proyeksiyasi chegarasi L chiziqdan iborat D yopiq soha bo'lsin. Unda σ sirt bilan chegaralangan va yasovchisi L bo'lgan to'g'ri silindrik jism hajmi V qaysi formula bilan hisoblanadi?

A) $V = \iint_D f''_{xy}(x,y) dx dy$. B) $V = \iint_D f(x,y) dx dy$. C) $V = \pi \iint_D f^2(x,y) dx dy$.
D) $V = \pi \iint_D [f''_{xy}(x,y)]^2 dx dy$. E) to'g'ri javob keltirilmagan.

2. Jism $z=f(x,y)$ va $z=g(x,y)$ [$f(x,y)\leq g(x,y)$] funksiyalar bilan aniqlangan $\sigma(f)$ va $\sigma(g)$ sirtlar bilan chegaralangan, $\sigma(f)$ va $\sigma(g)$ sirtlarning XOY koordinata tekisligidagi proyeksiyalari ustma-ust tushib, biror yopiq D sohadan iborat bo'lsa, jism hajmi V qaysi formula bilan hisoblanadi?

A) $V = 2\pi \iint_D [g^2(x,y) - f^2(x,y)] dx dy$. B) $V = 2\pi \iint_D [g(x,y) - f(x,y)] dx dy$

C) $V = 2\pi \iint_D [g(x,y) + f(x,y)] dx dy$. D)

$V = \iint_D [g(x,y) - f(x,y)] dx dy$.

E) $V = \iint_D [g(x,y) + f(x,y)] dx dy$.

3. XOY koordinata tekisligida yotuvchi yopiq D soha ko'rinishidagi yassi geometrik shakl yuzasi S qaysi formula bilan hisoblanadi?

A) $S = \iint_D x dx dy$. B) $S = \iint_D y dx dy$. C) $S = \iint_D xy dx dy$.

$$D) S = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy . \quad E) S = \iint_D dx dy .$$

4. $y=\varphi(x)$, $y=\psi(x)$ [$\varphi(x) \leq \psi(x)$] va $x=a$, $x=b$ chiziqlar bilan chegaralangan D yopiq sohaning S yuzasi hisoblash formulasi qayerda to‘g‘ri ifodalangan?

$$A) S = \int_a^b \left\{ \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} dy \right\} dx . \quad B) S = \int_a^b \left\{ \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} dx \right\} dy . \quad C) S = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \left\{ \int_a^b dx \right\} dy .$$

$$D) S = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \left\{ \int_a^b dy \right\} dx . \quad E) \text{to‘g‘ri javob keltirilmagan .}$$

5. Quyidagi ikki karrali integrallardan qaysi biri $y=\varphi(x)$, $y=\psi(x)$ [$\varphi(x) \leq \psi(x)$] va $x=a$, $x=b$ chiziqlar bilan chegaralangan D yopiq sohaning yuzasini ifodalamaydi?

$$A) \int_a^b \left\{ \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} dy \right\} dx . \quad B) - \int_a^b \left\{ \int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} dy \right\} dx . \quad C) - \int_b^a \left\{ \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} dy \right\} dx . \quad D) \int_a^b \left\{ \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} dy \right\} dx .$$

E) keltirilgan barcha integrallar D yopiq sohaning yuzasini ifodalaydi .

6. $x=\varphi(y)$, $x=\psi(y)$ [$\varphi(y) \leq \psi(y)$] va $y=a$, $y=b$ chiziqlar bilan chegaralaangan D yopiq sohaning S yuzasi hisoblash formulasi qayerda to‘g‘ri ifodalangan?

$$A) S = \int_a^b \left\{ \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} dx \right\} dy . \quad B) S = \int_a^b \left\{ \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} dy \right\} dx . \quad C) S = \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} \left\{ \int_a^b dx \right\} dy .$$

$$D) S = \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} \left\{ \int_a^b dx \right\} dy . \quad E) \text{to‘g‘ri javob keltirilmagan .}$$

7. Quyidagi ikki karrali integrallardan qaysi biri $x=\varphi(y)$, $x=\psi(y)$ [$\varphi(y) \leq \psi(y)$] va $y=a$, $y=b$ chiziqlar bilan chegaralangan D yopiq sohaning S yuzasi hisoblash formulasi qayerda to‘g‘ri ifodalangan?

$$A) \int_a^b \left\{ \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} dx \right\} dy . \quad B) - \int_a^b \left\{ \int_{\psi(y)}^{\varphi(y)} dx \right\} dy . \quad C) - \int_b^a \left\{ \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} dx \right\} dy . \quad D) \int_a^b \left\{ \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} dx \right\} dy .$$

E) keltirilgan barcha integrallar D yopiq sohaning yuzasini ifodalaydi .

8. $y=x^3$, $y=x$ va $x=0$, $x=1$ chiziqlar bilan chegaralangan D yopiq sohaning S yuzasini toping.

A) $S=1/2$. B) $S=1/3$. C) $S=1/4$. D) $S=1/5$. E) $S=1/6$.

9. $x=y^4$, $x=y^2$ va $y=0$, $y=1$ chiziqlar bilan chegaralangan D yopiq sohaning S yuzasini toping.

A) $S=1/3$. B) $S=4/15$. C) $S=1/5$. D) $S=2/15$.
E) $S=1/6$.

10. $z=f(x,y)$ funksiya bilan aniqlangan fazodagi σ sirtning XOY koordinata tekisligidagi proyeksiyasi D yopiq sohadan iborat bo'lsa, σ sirtning S yuzasi hisoblanadigan formula qayerda to'g'ri ifodalangan?

A) $S = \iint_D \sqrt{1 + f^2(x,y)} dx dy$. B) $S = \iint_D \sqrt{1 + [f'_x(x,y)]^2} dx dy$.
C) $S = \iint_D \sqrt{1 + [f'_y(x,y)]^2} dx dy$. D) $S = \iint_D \sqrt{1 + [f'_x(x,y)]^2 + [f'_y(x,y)]^2} dx dy$.
E) $S = \iint_D \sqrt{1 + [f''_{xy}(x,y)]^2} dx dy$.

11. Sirt zichligi $\rho=\rho(x,y)$ funksiya bilan berilgan va yopiq D soha ko'rinishida bo'lган moddiy yassi shaklning massasi m qaysi formula bilan aniqlnadi?

A) $m = \iint_D \sqrt{\rho(x,y)} dx dy$. B) $m = \iint_D \rho^2(x,y) dx dy$. C) $m = \iint_D \rho(x,y) dx dy$.
D) $m = \iint_D [1/\rho(x,y)] dx dy$. E) to'g'ri javob keltirilmagan.

12. Markazi O(0,0) nuqtada joylashgan va tomoni $2a$ bo'lган kvadratdan iborat yassi shaklning sirt zichligi $\rho(x,y)=(3xy)^2$ funksiya bilan berilgan bo'lsa, uning m massasi nimaga teng?

A) $m=4a^2$. B) $m=4a^3$. C) $m=4a^4$. D) $m=4a^5$.
E) $m=4a^6$.

13. Sirt zichligi $\rho=\rho(x,y)$ funksiya bilan berilgan va yopiq D soha ko'rinishida bo'lган moddiy yassi shaklning koordinata boshiga nisbatan inertsiya momenti I_0 formulasini ko'rsating.

A) $I_0 = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \rho(x,y) dx dy$. B) $I_0 = \iint_D (x^2 + y^2)^2 \rho(x,y) dx dy$.

- C) $I_0 = \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y) dx dy$. D) $I_0 = \iint_D \frac{\rho(x, y)}{x^2 + y^2} dx dy$.
- E) $I_0 = \iint_D \frac{x^2 + y^2}{\rho(x, y)} dx dy$.

14. Sirt zichligi $\rho=\rho(x,y)$ funksiya bilan berilgan va yopiq D soha ko‘rinishida bo‘lgan moddiy yassi shaklning OX koordinata o‘qiga nisbatan inersiya momenti I_x qaysi formula bilan topiladi?

- A) $I_x = \iint_D x^2 \rho(x, y) dx dy$. B) $I_x = \iint_D x \rho(x, y) dx dy$.
- C) $I_x = \iint_D x^2 \rho(x, y) dx dy$.
- D) $I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) dx dy$. E) $I_x = \iint_D xy \rho(x, y) dx dy$.

15. Sirt zichligi $\rho=\rho(x,y)$ funksiya bilan berilgan va yopiq D soha ko‘rinishida bo‘lgan moddiy yassi shaklning OY koordinata o‘qiga nisbatan inersiya momenti I_y qaysi formula bilan topiladi?

- A) $I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) dx dy$. B) $I_y = \iint_D x \rho(x, y) dx dy$.
- C) $I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) dx dy$.
- D) $I_y = \iint_D y^2 \rho(x, y) dx dy$. E) $I_y = \iint_D xy \rho(x, y) dx dy$.

16. Sirt zichligi $\rho=\rho(x,y)$ funksiya bilan berilgan va yopiq D soha ko‘rinishida bo‘lgan moddiy yassi shaklning OX koordinata o‘qiga nisbatan statik momenti M_x qaysi formula bilan hisoblanadi?

- A) $M_x = \iint_D xy \rho(x, y) dx dy$. B) $M_x = \iint_D x \rho(x, y) dx dy$.
- C) $M_x = \iint_D y \rho(x, y) dx dy$.
- D) $M_x = \iint_D (x + y) \rho(x, y) dx dy$. E) $M_x = \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y) dx dy$.

17. Sirt zichligi $\rho=\rho(x,y)$ funksiya bilan berilgan va yopiq D soha ko‘rinishida bo‘lgan moddiy yassi shaklning OY koordinata o‘qiga nisbatan statik momenti M_y qaysi formula bilan hisoblanadi?

- A) $M_y = \iint_D xy \rho(x, y) dx dy$. B) $M_y = \iint_D x \rho(x, y) dx dy$.

C) $M_Y = \iint_D y\rho(x,y)dxdy$.

D) $M_Y = \iint_D (x+y)\rho(x,y)dxdy$. E) $M_Y = \iint_D (x^2 + y^2)\rho(x,y)dxdy$.

18. Sirt zichligi $\rho=\rho(x,y)$ funksiya bilan berilgan va yopiq D soha ko‘rinishida bo‘lgan moddiy yassi shaklning $M(x_0,y_0)$ og‘irlik markazining x_0 abssissasining formulasini ko‘rsating.

A) $x_0 = \frac{\iint_D xy\rho(x,y)dxdy}{\iint_D \rho(x,y)dxdy}$. B) $x_0 = \frac{\iint_D y\rho(x,y)dxdy}{\iint_D \rho(x,y)dxdy}$.

C) $x_0 = \frac{\iint_D x\rho(x,y)dxdy}{\iint_D \rho(x,y)dxdy}$.

D) $x_0 = \frac{\iint_D (x+y)\rho(x,y)dxdy}{\iint_D \rho(x,y)dxdy}$. E) $x_0 = \frac{\iint_D (x^2 + y^2)\rho(x,y)dxdy}{\iint_D \rho(x,y)dxdy}$.

19. Sirt zichligi $\rho=\rho(x,y)$ funksiya bilan berilgan va yopiq D soha ko‘rinishida bo‘lgan moddiy yassi shaklning $M(x_0,y_0)$ og‘irlik markazining y_0 ordinatasining formulasini ko‘rsating.

A) $y_0 = \frac{\iint_D xy\rho(x,y)dxdy}{\iint_D \rho(x,y)dxdy}$. B) $y_0 = \frac{\iint_D y\rho(x,y)dxdy}{\iint_D \rho(x,y)dxdy}$.

C) $y_0 = \frac{\iint_D x\rho(x,y)dxdy}{\iint_D \rho(x,y)dxdy}$.

D) $y_0 = \frac{\iint_D (x+y)\rho(x,y)dxdy}{\iint_D \rho(x,y)dxdy}$. E) $y_0 = \frac{\iint_D (x^2 + y^2)\rho(x,y)dxdy}{\iint_D \rho(x,y)dxdy}$.

20. Quyidagi masalalardan qaysi biri ikki karrali integral yordamida yechilmaydi?

A) σ sirt bilan chegaralangan to‘g‘ri silindrik jism hajmini hisoblash .

B) bir jinsli bo‘limgan sterjen massasini topish .

C) fazodagi sirt yuzasini aniqlash .

- D) yassi figuraning og'irlik markazini topish .
 E) barcha masalalar yechimi ikki karrali integral orqali ifodalanadi .

11. Uch karrali integral va uning xossalari

1. Uch o'zgaruvchili $w=f(x,y,z)$ funksiyadan fazodagi yopiq V soha bo'yicha integral yig'indini tuzishda quyidagilardan qaysi biri bajarilmaydi ?

- A) V soha ixtiyoriy bir usulda ΔV_i ($i=1,2, \dots, n$) kichik sohachalarga ajratiladi .
 B) har bir ΔV_i ($i=1,2, \dots, n$) sohachadan ixtiyoriy bir $M(x_i, y_i, z_i)$ nuqta tanlanadi va unda funksiya qiymati $f(x_i, y_i, z_i)$ hisoblanadi .

C) funksianing hisoblangan $f(x_i, y_i, z_i)$, $i=1,2, \dots, n$, qiymatlari ΔV_i sohacha hajmi Δv_i ga ko'paytirilib, bu ko'paytmalar yig'indisi S_n topiladi .

- D) S_n integral yig'indining absolut qiymati baholanadi .
 E) ko'rsatilgan barcha amallar bajariladi .

2. $S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta v_i$ integral yig'indi orqali

$I = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$ uch karrali integral qanday aniqlanadi ?

- A) $I = \max V_n$. B) $I = \min V_n$. C) $I = \lim_{n \rightarrow \infty} V_n$. D) $I = V_n$.
 E) to'g'ri javob keltirilmagan .

3. **Teoremaning shartini ko'rsating:** Agar fazodagi V yopiq sohada $w=f(x,y,z)$ funksiya ... bo'lsa , unda $I = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$ uch karrali integral mavjud bo'ladi .

- A) monoton . B) uzuksiz . C) chegaralangan . D) davriy .
 E) to'g'ri javob keltirilmagan .

4. Uch karrali integralning geometrik ma'nosi qayerda to'g'ri ko'rsatilgan ?

- A) tekis shakl yuzasii . B) egri chiziq yoyi uzunligi . C) silindrik jism sirti . D) fazodagi jism hajmi . E) aylanma jism yon sirti .

5. Integrallash sohasi $V = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 9\}$ yopiq shar bo'lgan uch karrali

$\iiint_V dx dy dz$ integral qiymati nimaga teng?

- A) 27π . B) 30π . C) 33π . D) 36π . E) 39π .

6. Integrallash sohasi $V = \{(x, y, z) : |x| \leq 2, |y| \leq 3, |z| \leq 1\}$ yopiq to'g'ri burchakli parallelepiped bo'lgan uch karrali $\iiint_V dx dy dz$ integral qiymati nimaga teng?

- A) 6π . B) 36 . C) 48 . D) 24 . E) 36π .

7. Uch karrali integralning mexanik ma'nosi qayerda to'g'ri ko'rsatilgan ?

A) notekis harakatda bosib o'tilgan masofa .

B) bir jinsli bo'lмаган sterjen massasi . C) bir jinsli bo'lмаган plastinka massasi .

D) o'zgaruvchi kuch bajargan ish . E) bir jinsli bo'lмаган jism massasi .

8. Uch karrali integral xossasi qayerda xato ko'rsatilgan ?

A) $\iiint_V f_1(x, y, z) \cdot f_2(x, y, z) dx dy dz =$

$$= \iiint_V f_1(x, y, z) dx dy dz \cdot \iiint_V f_2(x, y, z) dx dy dz .$$

B) $\iiint_V [f_1(x, y, z) + f_2(x, y, z)] dx dy dz =$

$$= \iiint_V f_1(x, y, z) dx dy dz + \iiint_V f_2(x, y, z) dx dy dz .$$

S) $\iiint_V [f_1(x, y, z) - f_2(x, y, z)] dx dy dz =$

$$= \iiint_V f_1(x, y, z) dx dy dz - \iiint_V f_2(x, y, z) dx dy dz .$$

D) $\iiint_V Cf(x, y, z) dx dy dz = C \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$ (C – const.).

E) barcha xossalat to'g'ri ifodalangan .

9. Agar $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = 6$ bo'lsa, $\iiint_V (-4)f(x, y, z) dx dy dz$

integral qiymatini toping.

- A) -6 . B) 12 . C) -24 . D) 0 .

E) bu integral qiymatini aniq ko'rsatib bo'lmaydi .

10. Agar $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = 6$, $\iiint_V g(x, y, z) dx dy dz = -2$ bo'lsa,
 $\iiint_V f(x, y, z)g(x, y, z) dx dy dz$ integral qiymati nimaga teng ?

A) -12 . B) 12 . C) -4 . D) 4 .

E) bu integral qiymatini aniq ko'rsatib bo'lmaydi .

11. Agar $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = 6$, $\iiint_V g(x, y, z) dx dy dz = -2$ bo'lsa,
 $\iiint_V [f(x, y, z) + g(x, y, z)] dx dy dz$ integral qiymati nimaga teng ?

A) -8 . B) 8 . C) -4 . D) 4 .

E) bu integral qiymatini aniq ko'rsatib bo'lmaydi .

12. Agar $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = 6$, $\iiint_V g(x, y, z) dx dy dz = -2$ bo'lsa,
 $\iiint_V [f(x, y, z) - g(x, y, z)] dx dy dz$ integral qiymati nimaga teng ?

A) -8 . B) 8 . C) -4 . D) 4 .

E) bu integral qiymatini aniq ko'rsatib bo'lmaydi .

13. Agar $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = 6$, $\iiint_V [f(x, y, z) + g(x, y, z)] dx dy dz = -2$

bo'lsa,

$\iiint_V g(x, y, z) dx dy dz$ integral qiymati nimaga teng ?

A) -8 . B) 8 . C) -4 . D) 4 .

E) bu integral qiymatini aniq ko'rsatib bo'lmaydi .

14. Agar $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = 6$, $\iiint_V [f(x, y, z) - g(x, y, z)] dx dy dz = -2$

bo'lsa,

$\iiint_V g(x, y, z) dx dy dz$ integral qiymati nimaga teng ?

A) -8 . B) 8 . C) -4 . D) 4 .

E) bu integral qiymatini aniq ko'rsatib bo'lmaydi .

15. Agar $\iiint_V [f(x, y, z) + g(x, y, z)] dx dy dz = 6$ va

$\iiint_V [f(x, y, z) - g(x, y, z)] dx dy dz = -2$ bo'lsa, $\iiint_V g(x, y, z) dx dy dz$ integral qiymati nimaga teng ?

- A) -8 . B) 8 . C) -4 . D) 4 .
E) bu integral qiymatini aniq ko'rsatib bo'lmaydi .

16. Agar $\iiint_V [f(x, y, z) + g(x, y, z)] dx dy dz = 8$ va
 $\iiint_V [f(x, y, z) - g(x, y, z)] dx dy dz = -2$ bo'lsa, $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$ integral qiymati nimaga teng ?

- A) -3 . B) 3 . C) -4 . D) 4 .
E) bu integral qiymatini aniq ko'rsatib bo'lmaydi .

17. Agar $\iiint_V [f(x, y, z) + g(x, y, z)] dx dy dz = 8$ va
 $\iiint_V [f(x, y, z) - g(x, y, z)] dx dy dz = -2$ bo'lsa,
 $\iiint_V [2f(x, y, z) + 3g(x, y, z)] dx dy dz$ integral qiymati nimaga teng ?

- A) 21 . B) 23 . C) 25 . D) 27 .
E) bu integral qiymatini aniq ko'rsatib bo'lmaydi .

18. Uch karrali integralning additivlik xossasi qayerda ifodalangan ?

A) $\iiint_V [f(x, y, z) + g(x, y, z)] dx dy dz =$
 $= \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz + \iiint_V g(x, y, z) dx dy dz .$

B) $\iiint_V [f(x, y, z) \pm g(x, y, z)] dx dy dz =$
 $= \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz \pm \iiint_V g(x, y, z) dx dy dz .$

C) $\iiint_{V_1+V_2} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{V_1} f(x, y, z) dx dy dz + \iiint_{V_2} f(x, y, z) dx dy dz .$

D) $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = f(x_0, y_0, z_0) \cdot v .$

E) Bu yerda integralning additivlik xossasi keltirilmagan .

19. Agar $\iiint_{V_1} f(x, y, z) dx dy dz = 5$, $\iiint_{V_2} f(x, y, z) dx dy dz = -3$ bo'lsa,

$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$ qiymati nimaga teng?

- A) 8 . B) -8 . C) 2 . D) -2 .
 E) bu integral qiymatini aniq ko'rsatib bo'lmaydi.

20. Agar integrallash sohasi V markazi koordinata boshida joylashgan va $R=3$ radiusili shardan iborat bo'lib, unda $f(x,y,z) \leq 2$ shartni qanoatlantirsa, $I = \iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$ integral uchun qaysi tengsizlik o'rinni bo'ladi?

- A) $I \leq 18\pi$. B) $I \leq 36\pi$. C) $I \leq 54\pi$. D) $I \leq 72\pi$. E) $I \leq 90\pi$.

12. Uch karrali integrallarni hisoblash.

1. Fazodagi V soha to'g'ri soha bo'lishi uchun quyidagi shartlardan qaysi biri talab etilmaydi ?

- A) V soha S yopiq sirt bilan chegaralangan .
 B) V sohaning ixtiyoriy ichki nuqtasidan OZ koordinata o'qiga parallel qilib o'tkazilgan har qanday to'g'ri chiziq bu sohaning S chegarasini faqat ikkita nuqtada kesib o'tadi .
 C) V sohaning XOY koordinata tekisligidagi D proyeksiyasi to'g'ri sohadan iborat .
 D) V sohaning chegaraviy nuqtalari bir bog'lamli to'plamni tashkil etadi .
 E) keltirilgan barcha shartlar talab etiladi .

2. Fazodagi quyidagi sohalardan qaysi biri uch karrali to'g'ri soha bo'lmaydi ?

- A) shar . B) piramida . C) parallelepiped . D) tor . E) aylanma ellipsoid .

3. Uch karrali integral qayerda to'g'ri ifodalangan?

- A) $\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \left\{ \int_a^b \left[\int_{\psi_1(x,y)}^{\psi_2(x,y)} f(x,y,z) dz \right] dx \right\} dy .$
 B) $\int_a^b \left\{ \int_{\psi_1(x,y)}^{\psi_2(x,y)} \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y,z) dz \right] dy \right\} dx .$

- C) $\int_{\psi_1(x,y)}^{\varphi_2(x)} \left\{ \int_a^b [\int f(x,y,z)dz]dy \right\} dx .$ D) $\int_a^b \left\{ \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \left[\int_{\psi_1(x,y)}^{\psi_2(x,y)} f(x,y,z)dz \right] dy \right\} dx .$
- E) $\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \left\{ \int_a^{\psi_2(x,y)} [\int f(x,y,z)dz]dy \right\} dx .$

4. $\int_0^1 \left\{ \int_0^1 \left[\int_0^1 (x+y+z)dz \right] dy \right\} dx$ uch karrali integral qiymatini toping.
- A) 0 . B) 0.5 . C) 1.0 . D) 1.5 . E) -0.5 .

5. $\int_0^1 \left\{ \int_0^x \left[\int_0^{xy} (x+z)dz \right] dy \right\} dx$ uch karrali integral qiymatini toping.
- A) 0 . B) 5/18 . C) 13/36 . D) 19/144 . E) 23/180 .

6. $\int_0^1 \left\{ \int_0^x \left[\int_0^{xy} (x+y+z)dz \right] dy \right\} dx$ uch karrali integral qiymatini toping.
- A) 0 . B) 5/16 . C) 7/36 . D) -3/26 . E) -11/46 .

7. Fazodagi V to‘g‘ri soha quyidan va yuqoridan $z=\psi_1(x,y)$ va $z=\psi_2(x,y)$ sirtlar bilan, uning XOY koordinata tekisligidagi proyeksiyasini ifodalovchi yassi D yopiq soha esa $y=\varphi_1(x)$, $y=\varphi_2(x)$ va $x=a$, $x=b$ chiziqlar bilan chegaralangan bo‘lsin. Bu holda uch karrali $I = \iiint_V f(x,y,z)dx dy dz$ integralni uch karrali integral orqali hisoblash formulasi qayerda to‘g‘ri ko‘rsatilgan ?

- A) $I = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \left\{ \int_a^b \left[\int_{\psi_1(x,y)}^{\psi_2(x,y)} f(x,y,z)dz \right] dx \right\} dy .$
- B) $I = \int_a^b \left\{ \int_{\psi_1(x,y)}^{\psi_2(x,y)} \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y,z)dz \right] dy \right\} dx .$
- C) $I = \int_{\psi_1(x,y)}^{\psi_2(x,y)} \left\{ \int_{\varphi_1(x)}^b \left[\int f(x,y,z)dz \right] dy \right\} dx .$
- D) $I = \int_a^b \left\{ \int_{\varphi_1(x)}^b \left[\int_{\psi_1(x,y)}^{\psi_2(x,y)} f(x,y,z)dz \right] dy \right\} dx .$
- E) $I = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \left\{ \int_{\psi_1(x,y)}^{\psi_2(x,y)} \left[\int f(x,y,z)dz \right] dy \right\} dx .$

8. Fazodagi V to‘g‘ri soha quyidan va yuqoridan $z=0$ va $z=xy$ sirtlar bilan, uning XOY koordinata tekisligidagi proyeksiyasini ifodalovchi yassi D yopiq soha esa $y=0$, $y=x$ va $x=0$, $x=1$ chiziqlar bilan chegaralangan bo‘lsin. Uch karrali $I = \iiint_V (x+z) dx dy dz$ integral qiymatini toping.

- A) 0 . B) 5/36 . C) 23/180 . D) 21/216 . E) 1 .

9. Fazodagi V to‘g‘ri soha quyidan va yuqoridan $z=0$ va $z=xy$ sirtlar bilan, uning XOY koordinata tekisligidagi proyeksiyasini ifodalovchi yassi D yopiq soha esa $y=0$, $y=x$ va $x=0$, $x=1$ chiziqlar bilan chegaralangan bo‘lsin. Uch karrali $I = \iiint_V (x+y+z) dx dy dz$ integral qiymatini toping.

- A) 7/36 . B) 5/46 . C) 3/56 . D) 1 . E) 0 .

10. Fazodagi V to‘g‘ri soha quyidan va yuqoridan $z=0$ va $z=xy$ sirtlar bilan, uning XOY koordinata tekisligidagi proyeksiyasini ifodalovchi yassi D yopiq soha esa $y=0$, $y=x$ va $x=0$, $x=1$ chiziqlar bilan chegaralangan bo‘lsin. Uch karrali $I = \iiint_V xyz dx dy dz$ integral qiymatini toping.

- A) 1/16 . B) 1/32 . C) 1/48 . D) 1/64 . E) 1/80 .

11. Agar V soha $x=a_1$ va $x=b_1$, $y=a_2$ va $y=b_2$, $z=a_3$ va $z=b_3$ tekisliklar bilan chegaralangan parallelepipeddan iborat bo‘lsa, unda uch karrali $I = \iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$ integralni uch karrali integral orqali

hisoblash formularasi qayerda noto‘g‘ri ko‘rsatilgan ?

$$A) I = \int_{a_1}^{b_1} \left\{ \int_{a_2}^{b_2} \left[\int_{a_3}^{b_3} f(x,y,z) dz \right] dy \right\} dx . \quad B) I = \int_{a_2}^{b_2} \left\{ \int_{a_3}^{b_3} \left[\int_{a_1}^{b_1} f(x,y,z) dy \right] dz \right\} dx .$$

$$C) I = \int_{a_3}^{b_3} \left\{ \int_{a_1}^{b_1} \left[\int_{a_2}^{b_2} f(x,y,z) dx \right] dy \right\} dz . \quad D) I = \int_{a_2}^{b_2} \left\{ \int_{a_1}^{b_1} \left[\int_{a_3}^{b_3} f(x,y,z) dz \right] dx \right\} dy .$$

E) keltirilgan barcha formulalar to‘g‘ri ko‘rsatilgan .

12. Integrallash sohasi V $x=0$ va $x=1$, $y=0$ va $y=1$, $z=0$ va $z=1$ tekisliklar bilan chegaralangan parallelepipeddan iborat bo‘lgan uch karrali $I = \iiint_V (x+y+z) dx dy dz$ integralni hisoblang.

- A) 0.5 . B) 1.0 . C) 1.5 . D) 2.0 . E) 2.5 .

13. Integrallash sohasi V $x=0$ va $x=1$, $y=0$ va $y=1$, $z=0$ va $z=1$ tekisliklar bilan chegaralangan parallelepipeddan iborat bo‘lgan uch karrali $I = \iiint_V xyz dx dy dz$ integral qiymatini toping.

- A) 1/2 . B) 3/2 . C) 1/4 . D) 3/4 . E) 1/8 .

14. Uch o‘zgaruvchili $\varphi(u,v,t)$, $\psi(u,v,t)$ va $w(u,v,t)$ funksiyalarning jakobiani $I(u,v,t)$ qayerda to‘g‘ri ifodalangan?

$$A) I(u,v,t) = \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \varphi}{\partial t} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial t} \\ \frac{\partial w}{\partial u} & \frac{\partial w}{\partial v} & \frac{\partial w}{\partial t} \end{vmatrix} . \quad B) I(u,v,t) = \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial w}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial v} & \frac{\partial w}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial t} & \frac{\partial \psi}{\partial t} & \frac{\partial w}{\partial t} \end{vmatrix} .$$

$$C) I(u,v,t) = \begin{vmatrix} \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial t} \\ \frac{\partial w}{\partial u} & \frac{\partial w}{\partial v} & \frac{\partial w}{\partial t} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \varphi}{\partial t} \end{vmatrix} . \quad D) I(u,v,t) = - \begin{vmatrix} \frac{\partial w}{\partial u} & \frac{\partial w}{\partial v} & \frac{\partial w}{\partial t} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial t} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \varphi}{\partial t} \end{vmatrix} .$$

E) keltirilgan barcha formulalar $I(u,v,t)$ yakobianni to‘g‘ri ifodalaydi .

15. $\varphi(u,v,t)=u-v+t$, $\psi(u,v,t)=u+v-t$ va $w(u,v,t)=-u+v+t$ funksiyalarning $I(u,v,t)$ jakobianini hisoblang.

- a. $I(u,v,t)=uvt$. B) $I(u,v,t)=u+v+t$. C) $I(u,v,t)=1$.
D) $I(u,v,t)=0$. E) to‘g‘ri javob keltirilmagan .

16. x, y, z dekart va θ, ρ, z silindrik koordinatalar orasidagi bog‘lanish qayerda to‘g‘ri ifodalangan?

- A) $x=\rho \sin \theta, y=\rho \cos \theta, z=\rho$. B) $x=\rho \cos \theta \sin \theta, y=\rho \cos \theta, z=\rho$.
C) $x=\rho \cos \theta \sin \theta, y=\rho \cos \theta, z=\rho \sin \theta$. D) $x=\rho \sin \theta, y=\rho \sin \theta \cos \theta, z=z$.
E) $x=\rho \cos \theta, y=\rho \sin \theta, z=z$.

17. $x=\rho \cos \theta, y=\rho \sin \theta, z=z$ silindrik koordinatalarning I yakobianini toping.

- A) $I=\theta$. B) $I=\rho\theta$. C) $I=\rho$. D) $I=\rho/\theta$. E) $I=\rho\tg\theta$.

18. Dekart koordinatalaridagi uch karrali $I = \iiint_V (x^2 + y^2) z dx dy dz$

integral silindriki koordinatalarda qanday ifodalanadi?

A) $I = \iiint_V \rho z d\rho d\theta dz$. B) $I = \iiint_V \rho^2 z d\rho d\theta dz$.

C) $I = \iiint_V \rho^3 z d\rho d\theta dz$.

D) $I = \iiint_V \rho^2 \sin\theta \cos\theta z d\rho d\theta dz$. E) to'g'ri javob

keltirilmagan.

19. $x=\rho\sin\varphi\cos\theta$, $y=\rho\sin\varphi\sin\theta$, $z=\rho\cos\varphi$ tengliklar orqali ρ , φ va θ sferik koordinatalarga o'tish $I(\rho, \varphi, \theta)$ yakobianini hisoblang.

A) $I(\rho, \varphi, \theta) = \rho^2 \sin\varphi$. B) $I(\rho, \varphi, \theta) = \rho^2 \sin\theta$. C) $I(\rho, \varphi, \theta) = \rho^2 \cos\varphi$.

D) $I(\rho, \varphi, \theta) = \rho^2 \cos\theta$. E) $I(\rho, \varphi, \theta) = \rho^2 \sin\varphi \sin\theta$.

20. Dekart koordinatalaridagi uch karrali $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$ integral sferik koordinatalarda qanday ifodalanadi?

A) $I = \iiint_V \rho \sin\varphi d\rho d\varphi d\theta$. B) $I = \iiint_V \rho^2 \sin\varphi d\rho d\varphi d\theta$.

C) $I = \iiint_V \rho^3 \sin\varphi d\rho d\varphi d\theta$. D) $I = \iiint_V \rho^4 \sin\varphi d\rho d\varphi d\theta$.

E) $I = \iiint_V \rho^5 \sin\varphi d\rho d\varphi d\theta$.

13. Uch karrali integralning amaliy tatbiqlari

1. Fazoda to'g'ri sohani tashkil etuvchi T jismning V hajmi uch karrali integral orqali qaysi formula bilan hisoblanadi?

A) $V = \iiint_T xyz dx dy dz$. B) $V = \iiint_T (x + y + z) dx dy dz$. C) $V = \iiint_T dx dy dz$.

D) $V = \iiint_T \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$. E) $V = \iiint_T (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$.

2. $z=x^2+y^2$, $z=a^2(x^2+y^2)$, $y=x$, $y=x^2$ sirtlar bilan chegaralangan jismning V hajmini toping.

A) $V=a^3$. B) $V=3(a^3-1)/35$. C) $V=a^2$. D) $V=3(a^2-1)/35$.

E) $8a\sqrt{2a}$.

3. $z=x+y$, $z=axy$, $y+x=1$, $y=0$, $x=0$ sirtlar bilan chegaralangan jismning V hajmini toping.

- A) $V=(1-a)/8$. B) $V=(2-a)/12$. C) $V=(4-a)/16$.
 D) $V=(6-a)/20$. E) $V=(8-a)/24$.

4. Fazoda to‘g‘ri sohani tashkil etuvchi va har bir $M(x,y,z)$ nuqtasidagi zichligi $\rho=\rho(x,y,z)$ funksiya bilan aniqlanadigan bir jinsli bo‘limgan T jismning m massasi qaysi formula bilan topiladi ?

- A) $m = \iiint_T xyz\rho(x,y,z)dx dy dz$. B) $m = \iiint_T (x+y+z)\rho(x,y,z)dx dy dz$.
 C) $m = \iiint_T (x^2 + y^2 + z^2)\rho(x,y,z)dx dy dz$.
 D) $m = \iiint_T \rho(x,y,z)dx dy dz$.
 E) $m = \iiint_T \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \rho(x,y,z)dx dy dz$.

5. Har bir $M(x,y,z)$ nuqtasidagi zichligi $\rho(x,y,z)=a(x+y+z)$ funksiya bilan aniqlanadigan $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ kubning m massasini toping.

- A) $a/2$. B) $a/3$. C) $3a/2$. D) $2a/3$. E) $3a^2$.

6. Har bir $M(x,y,z)$ nuqtasidagi zichligi $\rho(x,y,z)=x+y+z$ funksiya bilan aniqlanadigan $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq a$, $0 \leq z \leq a$ kubning m massasini toping.

- A) $3a/2$. B) $3a^2/2$. C) $3a^3/2$. D) $3a^4/2$. E) $3a^5/2$.

7. Har bir $M(x,y,z)$ nuqtasidagi zichligi $\rho(x,y,z)=x+y+z$ funksiya bilan aniqlanadigan $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$, $0 \leq z \leq c$ parallelepipedning m massasini toping.

- A) $abc/2$. B) $(a+b+c)/2$. C) $abc(a+b+c)/2$.
 D) $abc/2(a+b+c)$. E) $(a+b+c)/2abc$.

8. Zichligi $\rho=\rho(x,y,z)$ funksiya bilan aniqlanadigan bir jinsli bo‘limgan T jismning XOY koordinata tekisligiga nisbatan M_{xy} statik momenti qaysi uch karrali integral orqali ifodalanadi?

- A) $\iiint_T y\rho(x,y,z)dx dy dz$. B) $\iiint_T x\rho(x,y,z)dx dy dz$.

C) $\iiint_T z\rho(x, y, z) dx dy dz$.

D) $\iiint_T xy\rho(x, y, z) dx dy dz$. E) to‘g‘ri javob keltirilmagan.

9. Zichligi $\rho=\rho(x, y, z)$ funksiya bilan aniqlanadigan bir jinsli bo‘limgan T jismning XOZ koordinata tekisligiga nisbatan M_{xz} statik momenti qaysi uch karrali integral orqali ifodalanadi?

A) $\iiint_T y\rho(x, y, z) dx dy dz$. B) $\iiint_T x\rho(x, y, z) dx dy dz$.

C) $\iiint_T z\rho(x, y, z) dx dy dz$.

D) $\iiint_T xz\rho(x, y, z) dx dy dz$. E) to‘g‘ri javob keltirilmagan.

10. Zichligi $\rho=\rho(x, y, z)$ funksiya bilan aniqlanadigan bir jinsli bo‘limgan T jismning YOZ koordinata tekisligiga nisbatan M_{yz} statik momenti qaysi uch karrali integral orqali ifodalanadi?

A) $\iiint_T y\rho(x, y, z) dx dy dz$. B) $\iiint_T x\rho(x, y, z) dx dy dz$.

C) $\iiint_T z\rho(x, y, z) dx dy dz$.

D) $\iiint_T yz\rho(x, y, z) dx dy dz$. E) to‘g‘ri javob keltirilmagan.

11. Har bir $M(x, y, z)$ nuqtasidagi zichligi $\rho(x, y, z)=x+y+z$ funksiya bilan aniqlanadigan $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ kubning YOZ koordinata tekisligiga nisbatan S_{yz} statik momenti nimaga teng?

A) $S_{yz}=2/3$. B) $S_{yz}=3/4$. C) $S_{yz}=4/5$. D) $S_{yz}=5/6$. E) $S_{yz}=6/7$.

12. Har bir $M(x, y, z)$ nuqtasidagi zichligi $\rho(x, y, z)=x+y+z$ funksiya bilan aniqlanadigan $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ kubning XOZ koordinata tekisligiga nisbatan S_{xz} statik momenti nimaga teng?

A) $S_{xz}=13/12$. B) $S_{xz}=11/9$. C) $S_{xz}=9/7$. D) $S_{xz}=7/5$.

E) $S_{xz}=5/3$.

13. Bir jinsli bo‘limgan, m massali T jism og‘irlilik markazining x_0 abssissasini hisoblash formulasi qayerda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A) $x_0 = \iiint_T z\rho(x, y, z) dx dy dz / m$. B) $x_0 = \iiint_T y\rho(x, y, z) dx dy dz / m$.

C) $x_0 = \iiint_T x\rho(x, y, z) dx dy dz / m$. D) $x_0 = \iiint_T zy\rho(x, y, z) dx dy dz / m$.

E) $x_0 = \iiint_T (z + y) \rho(x, y, z) dx dy dz / m$.

14. Bir jinsli bo'lmagan, m massali T jism og'irlik markazining y_0 ordinatasini hisoblash formulasi qayerda to'g'ri ko'rsatilgan?

A) $y_0 = \iiint_T z \rho(x, y, z) dx dy dz / m$. B) $y_0 = \iiint_T y \rho(x, y, z) dx dy dz / m$.

C) $y_0 = \iiint_T x \rho(x, y, z) dx dy dz / m$. D) $y_0 = \iiint_T x z \rho(x, y, z) dx dy dz / m$.

E) $y_0 = \iiint_T (x + z) \rho(x, y, z) dx dy dz / m$.

15. Bir jinsli bo'lmagan, m massali T jism og'irlik markazining z_0 aplikatasini hisoblash formulasi qayerda to'g'ri ko'rsatilgan?

A) $z_0 = \iiint_T z \rho(x, y, z) dx dy dz / m$. B) $z_0 = \iiint_T y \rho(x, y, z) dx dy dz / m$.

C) $z_0 = \iiint_T x \rho(x, y, z) dx dy dz / m$. D) $z_0 = \iiint_T x y \rho(x, y, z) dx dy dz / m$.

E) $z_0 = \iiint_T (x + y) \rho(x, y, z) dx dy dz / m$.

16. Har bir $M(x, y, z)$ nuqtasidagi zichligi $\rho(x, y, z) = \rho$ o'zgarmas bo'lgan va $x+y+z=8$, $x=0$, $x=2$, $y=0$, $z=0$, $y=4$ sirtlar bilan chegaralangan bir jinsli kesik parallelepiped og'irlik markazining x_0 abssissasini toping.

A) $x_0 = 8/3$. B) $x_0 = 26/15$. C) $x_0 = 14/15$. D) $x_0 = 14/3$. E) $x_0 = 12/5$

17. Har bir $M(x, y, z)$ nuqtasidagi zichligi $\rho(x, y, z) = \rho$ o'zgarmas bo'lgan va $x+y+z=8$, $x=0$, $x=2$, $y=0$, $z=0$, $y=4$ sirtlar bilan chegaralangan bir jinsli kesik parallelepiped og'irlik markazining y_0 ordinatasini toping.

A) $y_0 = 8/3$. B) $y_0 = 26/15$. C) $y_0 = 14/15$. D) $y_0 = 14/3$. E) $y_0 = 12/5$

18. Har bir $M(x, y, z)$ nuqtasidagi zichligi $\rho(x, y, z) = \rho$ o'zgarmas bo'lgan va $x+y+z=8$, $x=0$, $x=2$, $y=0$, $z=0$, $y=4$ sirtlar bilan chegaralangan bir jinsli kesik parallelepiped og'irlik markazining z_0 aplikatasini toping.

A) $z_0 = 8/3$. B) $z_0 = 26/15$. C) $z_0 = 14/15$. D) $z_0 = 14/3$. E) $z_0 = 12/5$.

19. Bir jinsli bo'limgan T jismning XOY koordinata tekisligiga nisbatan inersiya momenti I_{xy} qaysi formula bilan hisoblanadi?

A) $I_{xy} = \iiint_T x^2 \rho(x, y, z) dx dy dz$. B) $I_{xy} = \iiint_T z^2 \rho(x, y, z) dx dy dz$.

C) $I_{xy} = \iiint_T y^2 \rho(x, y, z) dx dy dz$. D) $I_{xy} = \iiint_T xy \rho(x, y, z) dx dy dz$.

E) to'g'ri javob keltirilmagan.

20. Bir jinsli bo'limgan T jismning XOZ koordinata tekisligiga nisbatan inersiya momenti I_{xz} qaysi formula bilan hisoblanadi?

A) $I_{xz} = \iiint_T x^2 \rho(x, y, z) dx dy dz$. B) $I_{xz} = \iiint_T z^2 \rho(x, y, z) dx dy dz$.

C) $I_{xz} = \iiint_T y^2 \rho(x, y, z) dx dy dz$. D) $I_{xz} = \iiint_T xz \rho(x, y, z) dx dy dz$.

E) to'g'ri javob keltirilmagan.

TESTLAR KALITI

1. Funksiya hosilasi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	D	B	D	E	C	C	B	A	D	D	D	A	C	E	C
17	18	19	20												
E	D	D	A												

2. Funksiyani differensiallash.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	E	C	D	D	E	B	E	B	D	C	D	E	C	A
17	18	19	20												
C	D	B	E												

3. Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	D	C	C	D	C	E	E	B	B	E	E	C	E	C	E
17	18	19	20												
C	D	E	D												

4. Aniqmas integralni hisoblash .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	C	D	C	C	E	D	D	B	A	A	C	C	A	C	B
17	18	19	20												
B	B	A	D												

5. Ratsional funksiyalar va ularni integrallash

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	E	C	C	D	C	D	E	A	B	A	C	B	D	B	B
17	18	19	20												
D	A	C	C												

6. Ayrim irratsional ifodali integrallarni hisoblash

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	A	C	C	B	E	C	B	D	C	D	C	D	C	B	B
17	18	19	20												
C	D	B	C												

7. Ayrim trigonometrik ifodali integrallarni hisoblash

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	E	A	C	B	D	B	B	A	A	D	C	C	C	D	C
17	18	19	20												
E	C	A	C												

8. Ikki karrali integral va uning xossalari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	C	B	C	E	C	C	A	C	E	D	A	C	A	C	D
17	18	19	20												
D	C	C	D												

9. Aniq integralni hisoblash usullari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	D	D	E	B	E	A	C	B	A	E	C	D	C	B
17	18	19	20												
E	D	A	D												

10. Ikki karralı integralning amaliy tətbiqləri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	D	E	B	E	A	E	C	D	D	C	E	C	D	A	C
17	18	19	20												
B	C	B	B												

11. Uch karralı integral va uning xossalari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	B	D	D	C	E	A	C	E	D	B	A	B	D	B
17	18	19	20												
A	C	C	D												

12. Uch karralı integrallarnı hisoblash.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	D	D	D	E	C	D	C	A	D	B	C	E	A	E	E
17	18	19	20												
C	C	A	D												

13. Uch karralı integralning amaliy tətbiqləri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	D	E.	D	C	D	C	C	A	B	D	A	C	B	A	C
17	18	19	20												
B	A	B	C												

ADABIYOTLAR RO'XATI

Asosiy adabiyotlar

1.	Claudio Canuto, Anita Tabacco "Mathematical Analysis", Italy, Springer, I-part, 2008, II-part, 2010.
2.	W W L Chen "Introduction to Fourier Series", London, Chapter 1-8, 2004, 2013.
3.	W W L Chen "Fundamentals of Analysis", London, Chapter 1-10, 1983, 2008.
4.	SH.R.Xurramov "Oliy matematika". 1-2 jild, Toshkent, Tafakkur, 2018.
5.	Soatov Yo.U. Oliy matematika. T., O'qituvchi, 1995. 1- 2 qismlar.
6.	N.M.Jabborov, E. «Oliy matematika». 1-2 qism. Qarshi, 2010.

Qo'shimcha adabiyotlar

7.	Mirziyoev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -T.: O'zbekiston, 2017. - 488 bet.
8.	Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birqalikda barpo etamiz. T.: O'zbekiston, 2017. - 32 bet
9.	Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qa'tiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // Xalq so'zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, '11.
10.	Raxmatov R., Tadjibayeva Sh.E., Shoyimardonov S.K. Oliy matematika. 1 jild. 2017.
11.	Azlarov T., Mansurov X. Matematik analiz, - Toshkent, O'qituvchi, 1-qism, 1989.
12.	Piskunov N.S. Differensialnoe i integralnoe ischislenie dlya VTUZov. -M.: Nauka, v 2x chastyax, 2001.
13.	Bugrov Ya.S., Nikolskiy S.M. Differensialnûe uravneniya. Kratnûe integralû. Ryadû. Funksii kompleksnogo peremennogo. -

	Nauka, 1997.
14.	Danko P.S., Popov A.G., Kojevnikova T.Ya. Vüsshaya matematika v uprajneniyax i zadachax. Sedmoe izdanie. -M.: Vüsshaya shkola, 2015.
15.	Semyonova T.V. Vüsshaya matematika: uchebnoe posobie dlya studentov texnicheskix vuzov. Chast 1. - Penza: Penzenskiy gos. un-t, 2008. - 190 s.
16.	Makarov E. V., Lungu K. N. Vüsshaya matematika: rukovodstvo k resheniyu zadach. Uchebnoe posobie, Ch. 1, Fiz.mat. lit. 2013 g. 217 str.
17.	Minorskiy V.P. Sbornik zadach po vüsshey matematike. M: Nauka, 1987.
18.	Bugrov Ya.S., Nikolskiy S.M. Sbornik zadach po vüsshey matematike. Uchebnoe posobie dlya injenerno-texnicheskix spesialnostey vuzov. - M.: Nauka. 1997.

Elektron manbalar

19.	www.gov.uz – O'zbekiston Respublikasi hukumat portali.
20.	www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
21.	www.Ziyonet.uz
22.	www.tuit.uz
23.	www.Math.uz
24.	www.bilim.uz

MUNDARIJA

KIRISH.....	3
I BOB. ANIQMAS INTEGRAL	4
1.1. Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral.....	4
1.2. Aniqmas integralning xossalari.....	6
1.3. Asosiy elementar funksiyalarning integrallar jadvali	7
1.4. Aniqmas integralda integrallash usullari.....	9
1.5. Sodda ratsional kasrlarni integrallash.....	15
1.6. Ratsional kasr funksiyalarni integrallash	18
1.7. Trigonometrik funksiyalarni integrallash	20
1.8. Giperbolik funksiyalarni integrallash	26
1.9. Irratsional ifodalarni integrallash	27
1.10. Boshlangich funktsiyasi elementar funksiyalarning chekli yigindisi ko'rinishida tasvirlanmaydigan funksiyalar	35
II BOB. ANIQ INTEGRAL	37
2.1.Aniq integral tushunchasiga olib keluvchi masalalar. Egri chiziqli trapetsiyaning yuzasni hisoblash masalasi	37
2.2. Integral yig'indi va aniq interal	39
2.3.Aniq integralning geometrik va mexanik ma'nolari.....	42
2.4.Aniq integralning xossalari	43
2.5. Yuqori chegarasi o'zgaruvchi aniq integral	49
2.6. Nyuton-Leybnis formulasi	50
2.7. Aniq integralda o'zgaruvchini almashtirish	52
2.8. Aniq integralni bo'laklab integrallash	54
2.9. Aniq integralning geometrik masalalarga tadbiqlari	55
2.10. Aniq integralning mexanika masalalariga tadbiqlari.....	70
2.11. Xosmas integrallar	79
III BOB. IKKI KARRALI INTEGRALLAR	86
3.1. Ikki karrali integral va uning xossalari	86
3.2. Ikki karrali integrallar yordamida tekis figuraning yuzini va jismning hajmini hisoblash.	89
3.3. Ikki karrali itegrallarning mexanikada qo'llanilishi	100
IV BOB. UCH KARRAL INTEGRALLAR	107
4.1.Uch karrali integral	107
4.2. Uch karrali integrallar yordamida jismning hajmini hisoblash.....	108
4.3. Uch karrali integrallarning mexanikaga tadbiqlari.....	115
TESTLAR KALITI	167
ADABIYOTLAR RO'YXATI.....	169

**R.M. MADRAXIMOV
D.S.YAXSHIBAYEV**

HISOB (CALCULUS) INTEGRALLAR

O'QUV QO'LLANMA

Muharrir	<i>M.Alimov</i>
Musahhih	<i>X.Zokirova</i>
Texnik muharir	<i>A.Yuldasheva</i>
Sahifalovchi	<i>T.Shonazarov</i>

“ELNUR-PRINT” – 2024

Nashriyot litsenziysi: 247, 02.10.2013.
Bosishga ruhsat 16.09.2024. Format 60x84 1/16.
Garnitura «Times New Roman».
Shartli bocma tabog‘i 11,0. Nashr tabog‘i 10,5.
Adadi 100 dona. Buyurtma 30.

**«ELNUR-PRINT» MCHJ bosmaxonasida chop etildi,
Toshkent sh., Navoiy 30.**